氣管枝 擴張症의 臨床的 考察

延世醫大 胸廓內科

咸 聖 淑 · 金 炯 德

緒 論

우리나라에서는 人口 1,000에 約 25 名の 活動性 肺結核 患者를 볼 수 있으며^{1,2)} 이러한 高率에 比해 氣管枝 擴張症같은 人口 1,000에 1.3 名³⁾의 低率을 차지하고 있는 呼吸器 疾患의 診斷을 놓치고 마는 수가 있다. 特히 氣管枝 擴張症은 症狀이 肺結核과 恰似한 點이 있어 正確한 診斷과 治療가 如意치 못하여 患者는 物論 臨床醫로 하여금 隘路를 주는 境遇가 적지 않다. 氣管枝 擴張症의 主原因은 氣管枝의 狹窄과 感染^{4,5)}에 依하여 온다고 하며 그 內科的 治療에 依한 終局의 結果는 觀察하지 못했고 條件이 맞는 患者에서 外科的 處置가 適合한 것⁶⁾은 既知의 事實임에 그 內譯도 分類하여 보았다.

氣管枝 擴張症이 肺結核 또는 癌, 肺膿瘍後에 二次的으로 많이 올 수 있으나⁶⁾ 著者는 合併症이 없다고 認定한 氣管枝 擴張症에 對한 臨床的 觀察이 本疾患의 狀態를 理解하는 데 一助가 되리라고 生覺되어 아울러 文獻을 通하여 이를 比較 考察한 바 있어 그 結果를 報告하는 바이다.

材料 및 方法

1962 年 1 月부터 1967 年 10 月末까지 過去 6 年間 延世醫大 세브란스病院 胸廓內科에 入院하였던 患者中 氣管枝 造影法 및 剖檢으로 確診된 62 例의 氣管枝 擴張症에 對하여 그들의 年齡, 및 性別 臨床 所見 및 各種 檢査所見을 分類 觀察하였고 그 治療에 있어서 外科的 手術의 適應症 與否도 考察하였다.

成 績

1. 分類 및 發生頻度

總 62 名中 男女別의 比率을 보면 男子 47 名, 女子 15 名으로 3:1 의 比率을 나타내고 있고 年齡別을 보면 20~29 歲層에 33.9%, 다음이 10~19 歲層의 24.2%, 30~39 歲層의 9%의 順序로 되어 있다. (Table 1).

男女別의 分布를 보면 女子에 있어서 20~40 歲에 두번 피크를 보이고 있고 男子는 20~29 歲에 피크를 보이고 年齡이 많을수록 차차 數는 減少되고 있다.

Table 1. Distribution of Bronchiectasis by Sex and Age Group

Age group(Yr.)	Male	Female	Total
	No. (%)	No. (%)	No. (%)
10 — 19	14 (29.8)	1 (6.7)	15 (24.2)
20 — 29	16 (34.0)	5 (33.3)	21 (33.9)
30 — 39	7 (14.9)	2 (13.3)	9 (14.5)
40 — 49	4 (8.5)	5 (33.3)	9 (14.5)
50 — 59	5 (10.6)	2 (13.3)	7 (11.3)
60 — 69	1 (2.2)	—	1 (1.6)
Total	47 (100.0)	15 (99.9)	62 (100.0)

Fig. 1. Distribution of Bronchiectasis

2. 臨床症狀 및 理學的 所見

患者가 처음 發病할 때 부터 本院에 올때까지의 期間을 分類하여 보면 1~5 年間이 43.6% 이었고 다음이 6~10 年間의 17.7%, 一年 未滿의 期間을 가진 患者가 16.1%의 順序로 되어 있다. (Table 2).

氣管枝 擴張症의 代表的 症狀인 咯血과 또한 本症과 合併 또는 이어서 올 수 있는 慢性上顎洞炎과 鼓手指의 頻度를 觀察하여 본즉 三者中 어느한가지 또는 두가:

Table 2. Clinical Manifestations(Duration of illness)

Duration(yr.)	No.	%
— 1	10	16.1
1 — 5	27	43.6
6 — 10	11	17.7
11 — 15	2	3.2
16 — 20	3	4.9
21 — 25	4	6.5
26 — 30	2	3.2
31 — 35	—	—
36 — 40	2	3.2
41 —	1	1.6
Total	62	100.0

以上을 同伴한 者와 全然 症狀이 없는 者를 區分하여 發病期間과의 關係를 보면 1~5年間の 發病期間을 가진 患者에서 症狀을 갖고 있는 患者가 23名으로 가장 높고 上記 三症狀中 한症狀도 없는 患者는 發病期間이 짧고 길고 間에 無關係 狀態이다. 全患者中 48名(77.4%)이 有症狀者이고 14名(22.6%)이 全然 症狀이 없었다(Table 3).

Table 3. Clinical Manifestations¹⁾

Duration (yr.)	One or more No. of pts.	None No. of pts.	Total No. of pts.
— 1	9	1	10
1 — 5	23	4	27
6 — 10	8	3	11
11 — 15	1	1	2
16 — 20	2	1	3
21 — 25	3	1	4
26 — 30	2	—	2
31 — 35	—	—	—
36 — 40	—	2	2
41 —	—	1	1
Total	48 (77.4%)	14 (22.6%)	62 (100.0%)

1) Hemoptysis, sinusitis and pulmonary osteoarthropathy.

Table 4. Clinical Manifestations

Duration (yr.)	Hemoptysis only	Sinusitis only	Clubbing only	H+S	H+C	S+C	H+S+C
— 1	8				1		
1 — 5	16	2		3		1	1
6 — 10	3	2			1		2
11 — 15	1						
16 — 20					1		1
21 — 25	1			1	1		
26 — 30	1				1		
Total	30	4		4	5	1	4

三症狀中 咯血 慢性上顎洞炎, 또는 鼓手指, 各各 單獨으로 온것과 2個 或은 그 以上이 合하여 온것을 區別하여 보면 咯血 單獨으로 온것이 62名中 30名으로 首位를 차지하고 있다(Table 4).

3. 檢査所見

a. 咯痰의 細菌學的 所見:

咯痰의 培養 檢査에서 62例中 5例(6.6%)를 除外하고는 陽性을 나타냈고 1 또는 2種類 以上の 菌을 찾아낸 者도 있었다. 가장 많은 것은 normal flora가 67.1%이었고 beta streptococci는 2.6%를 차지하고 있었다.(Table 5).

Table 5. Organisms Cultured in Sputum

Organism	No.	%
Normal flora ¹⁾	51	67.1
Beta streptococci	2	2.6
Non-hemolytic streptococci	6	7.9
Staphylococci	5	6.6
Gram (—) bacilli ²⁾	6	7.9
Gram (+) bacilli	1	1.3
No growth	5	6.6
Total	76	100.0

1) Includes Alpha streptococci and Neisseria group.

2) Includes Aerobacteria and Pseudomonas.

b. X-線所見:

氣管枝 造影法으로 確診된 62例 (1例는 剖檢으로서 確診된)의 病巢 範圍를 보면 男子에서는 二葉이 侵犯된 患者가 22名(46.8%), 一葉이 20名(42.5%)이 大部分이었고 女子에서는 一葉이 侵犯된 患者가 10名(66.7%), 二葉이 4名(26.7%)의 順位로 되어 있다(Table 6).

總 62 의 侵犯된 總葉數는 104葉이며, 一葉을 찾아낸 者가 30名(48.4%) 2葉이 26名(41.9%)의 順位로 되어 있다(Table 7).

左右別로 보면 圓柱形, 泡囊形, 그리고 混合形 어느 것이나 左側肺가 右側肺에 비해 더 많이 侵犯 되어 있는

Table 6. Extent of Disease

No. of involved lobe	Patient	
	No.	%
Male	47	100.0
1 lobe	20	42.5
2 lobes	22	46.8
3 //	3	6.4
4 //	1	2.1
5 //	1	2.1
Female	15	100.0
1 lobe	10	66.7
2 lobes	4	26.7
3 //	—	—
4 //	1	6.7
5 //	—	—

Table 7. Extent of Disease

No. of lobes	No. of patients	%	Total No. of lobes	%
1 lobe	30	48.4	30	28.8
2 lobes	26	41.9	52	50.0
3 //	3	4.8	9	8.7
4 //	2	3.2	8	7.7
5 //	1	1.7	5	4.8
Total No. of lobes	62	100.0	104	100.0

Table 8. Type and Location

Type	Right side				Left side				Total
	U.	M.	L.	Sub-total	U.	L.	Sub-total	Total	
Cyl.	3	3	14	20 (37.0)	6	28	34 (63.0)	54 (100.0)	
Sac.	2	4	6	12 (44.4)	5	10	15 (55.6)	27 (100.0)	
Mixed	2	2	6	10 (43.5)	4	9	13 (56.5)	23 (100.0)	

것을 볼수 있다(Table 8).

病巢의 位置를 比較해 보면 左下葉이 75.8% 右下葉이 61.9%로 各中葉 上葉에 比較하여 越等하게 많이 울수 있었다(Table 9).

Table 9. Type and Location

Type of lobe	Right side		Left side	
	No.	%	No.	%
Upper	7	16.7	15	24.2
Middle	9	21.4	—	—
Lower	26	61.9	47	75.8
Total	42	100.0	62	100.0

氣管枝 擴張症의 形狀을 比較해 보면 圓柱形이 總 104 葉中 54 葉(52.0%)으로 가장 많으며 다음이 泡囊形의 27 葉(26.0%), 混合形이 23 葉(22.0%)의 차례로 되어 있다(Table 10).

Table 10. Type and Location

Type	Right side		Left side		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cyl.	20	47.6	34	54.8	54	52.0
Sac.	12	28.6	15	24.2	27	26.0
Mixed	10	23.8	13	22.0	23	22.0
Total	42	100.0	62	100.0	104	100.0

4. 治療 및 經過

氣管枝 擴張症의 治療를 手術이 適合한 例와 症狀이 輕한고로 內科的 治療가 可能한 患者, 重症으로 手術이 不可能한 患者로 分類하여 보았다. 全 62 例中 33 名(53.2%)이 手術이 可能하였고 16 名(25.8%)이 內科的으로 治療가 可能한 患者이었고 1 名(1.6%)은 역시 重症으로 入院한지 2 日만에 死亡하였다(Table 11).

Table 11. Treatment

Treatment	Male		Female		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Surgical indication	25	53.2	8	53.3	33	53.2
Medical care (mild case)	11	23.4	5	33.3	16	25.8
No surgical indication (advanced case)	10	21.3	2	13.4	12	19.4
Died	1	2.1	—	—	1	1.6
Total	47	100.0	15	100.0	62	100.0

外科的 適應者 33 名中 25 名(75%)이 手術을 받았고 拒絶한 者는 8 名(25%)이었다. 手術의 種目을 나누어 보면 lobectomy 가 13 名(39%), pneumonectomy 는 8 名(24%)이며 segmental resection 이 4 名(12%)의 順位로 되어 있다(Table 12).

Table 12. Surgical Treatment

surgical treatment	No.	%
Indicated No. of pts.	33	100.0
Operated	25	75.0
Segmental	4	12.0
Lobectomy	13	39.0
Pneumonectomy	8	24.0
Refused	8	25.0

5. 組織學的 診斷

手術을 받은 患者 25 名과 1 名の 死亡 患者를 합한 26 名에 對한 病理 組織學的 診斷을 區分하여 보면 氣管枝 擴張症 單獨이 22 名으로 84.6%를 차지하고 있으며 結核을 兼한 것이 2 名으로 7.7%, 肺膿瘍이 1 名, 無氣肺가 兼한 것이 1 名 있었다(Table 13).

Table 13. Pathological Diagnosis

Diagnosis	Male	Female	Total
Bronchiectasis	17	5	22(84.6)
B.+ Tuberculosis	1	1	2 (7.7)
B.+ Lung abscess	1	—	1 (3.8)
B.+ Atelectasis	1	—	1 (3.8)
Total	20	6	26 ¹⁾ (100.0)

1) One autopsy case is added to the total.

考 察

氣管枝 擴張症은 人口 1,000 에 1.3 名³⁾의 低率을 보이고 있다하며 우리나라 같이 結核患者¹⁾가 많은 곳에서는 特히 症狀이 비슷한 이 두疾患의 鑑別 診斷에 格別한 留意가 있어야 된다고 보며 이 少數의 氣管枝 擴張症을 結核으로 誤診됨을 未然에 防止해야 된다고 生覺한다. 著者는 1962 年 1 月부터 1967 年 10 月末까지 過去 6 年間 總 62 例의 氣管枝 擴張症 患者를 經驗하였고 男女性別 頻度는 3:1 의 比率을 보여 주었다. 年齡別 發生頻度는 20 代에 第一 많이 오고 10 代, 30 代, 그리고 40 代의 順位로 되어 있다. Lisa 와 Rosenblatt⁷⁾는 氣管枝 擴張症은 肺의 惡化가 反復되어 結局 死亡에 이른다 하였고 Mckim⁸⁾은 그런故로 外科의 處置만이 唯一한 救護의 길이라고 말한 것으로 보아 이 젊은 層에 많이 온다는 點은 우리가 治療 計劃을 세우는데 外科의 問題를 소홀히 다룰 수 없다는 것을 指摘해 주고 있다고 본다. 自覺의 他覺의 症狀 中에서 氣管枝 擴張症에 흔히 있는 기침, 咯痰, 또는 反復되는 氣管枝 感染들을 除外하고 特히 本症과 關係가 깊다고 生覺된 慢性上顎洞炎, 咯血, 그리고 鼓手指를 擇하여 比較하여 보았다.

처음 本病院에 올때까지의 期間을 보면 62 名中 半數以上인 48 名이 10 年間 以內로 되어 있고 成書⁹⁾에는 症狀이 생긴後 부터 約 10~15 年間の 平均 壽命이 된다고 하는데 著者의 結果도 그와 近似하다고 본다.

總患者 62 名中 咯血 慢性上顎洞炎 그리고 鼓手指, 이 中 하나도 症狀이 없었다는 例가 14 名으로 22.6%를 차지하고 있었으며 이도 發病 期間의 長短과 無關係 狀態로 나타났고 Mckim⁸⁾은 82 名 患者에서 咯痰과 기침의 程度를 分類하여 본즉 6 名 即 7.3%에서 無症狀이었다고 하며 이 咯痰, 기침은 普遍的으로 氣管枝 擴張症에 많이

을 수 있다고 보는 症狀이고 著者가 觀察한 3 가지 症狀은 그와 달리 無症狀者가 3 倍 가가이로 22.6%를 차지하게 되었다고 본다. 著者가 觀察한 3 가지 症狀 即 咯血, 慢性上顎洞炎 鼓手指中 가장 많이 볼 수 있는것은 咯血이었고 그 다음이 慢性上顎洞炎, 鼓手指의 順序로 되어 있다. 우리가 患者의 病歷을 記錄할때 咯血의 有無 調査는 氣管枝 擴張症 診斷을 내리는데 많은 도움이 되리라고 본다.

最近 外國文獻 Michall W. Rytel, et al.⁵⁾은 氣管枝 擴張症의 原因이 感染과 關係가 깊다고 말하고 있으며 그들은 主로 Virus infection에 對하여 考察한 바 있었다. 即 173 名의 氣管枝 擴張症 患者에서 氣管枝鏡 檢査로 얻은 specimen를 가지고 分類하여 본 結果 2 例의 Influenza B virus를 分離하였고 Hemophilus influenzae는 5.5%, anaerobic mycoplasma는 32.5%, 그리고 eaton agent는 發見할 수 없었다고 한다. Cherniack, Carton¹⁴⁾은 氣管枝 擴張症 咯痰에서는 H. influenzae와 pneumococci를 많이 볼 수 가 있었다고 하였다. 著者는 咯痰의 viral isolation는 할 수 없었고 routine culture의 結果를 分類하여 본즉 normal flora가 67.1%로 首位를 차지하고 있었고 意義가 있다고 보는 B-streptococci는 2 例에 지나지 않은 것을 보아 氣管枝擴張症의 原因이 된다는 感染說을 더욱 確證하기 위해서는 近來 많이 論議되고 있는 여러가지 virus의 分離가 손쉽게 이루어져야 되리라고 生覺한다.

氣管枝 擴張症을 일으킨 病巢의 範圍로 보면 62 名中 1 葉이 侵犯된 것이 30 名과 2 葉이 26 名, 合하여 90.3%로 나머지 少數에서 3 葉以上の 病巢를 侵犯 當하고 있었다. 文獻上으로 보면 Lambert¹⁵⁾는 68 名中 55 名 即 81%가 1~2 葉의 病巢를 가지고 있었다고 報告한 것을 보아도 氣管枝 擴張症의 病巢는 大部分이 1~2 葉에 온다고 말할 수 있다. 病巢의 位置를 보면 左側이 右側보다 더 많이 侵犯되었고 또한 下葉이 越等하게 病巢가 많았으며 中葉 上葉은 적은差의 順位로 되어있다. 成書¹⁶⁾를 보면 解剖學的 關係에 依하여 特히 下葉에 病巢가 많은 것으로 되어 있으며 또한 한葉 中에서도 basal segment가 superiar segment보다 더 많이 온다고 記錄되어 있고 著者의 그것도 이와 近似한 結果를 보여 주었다. 氣管枝 擴張症의 形態를 보면 圓柱形 擴張이 全體 半數 以上인 52%를 차지하고 있었으며 泡囊形 擴張이 그 1/2 程度의 26%를 차지하고 있었다. 이 두 形狀의 擴張機轉에 關한 것은 앞으로 더 研究할 問題의 하나라고 본다.¹⁷⁾ Reid¹⁸⁾의 報告에도 역시 圓柱形 擴張이 泡囊形 擴張에 비해 많은 數를 보였다고 指摘하였다. 氣管枝 擴張症의 治療에 있어서 內科의인 것과 外科의 適應의 두가지로 나누었다. 病巢가 一側肺의 一葉 또는 그 以上에 局限되

어 있을때 肺機能에 支障이 없는 患者를 選擇하였고 年齡은 最高 46歲부터 最下 18歲이었다. 氣管枝擴張症은 不可逆의 疾患^{3,16)} 임은 既知의 事實이며 病巢가 局限되고 젊은이 일수록 반드시 手術이 必要하다고 말하고 있다. ^{3,15,19)} 또한 泡囊形擴張은 圓柱形擴張 보다도 더욱 手術의 適應이 된다고 學者들은 말하고^{3,8,14)} 있으며 總 62名中 33名인 53.2%가 外科的 適應이 되었다. 그中 25名(75.0%)이 手術을 받았고 拒絕者는 8名(25%)이었으며 그 理由로는 無條件인것 經濟的 困難等이 包含되어 있었다. 手術은 segmental이 4例, lobectomy가 13例, pneumonectomy가 8例로서 合計 25名이며 其中 2例의 lobectomy에서 1例는 手術後 出血로 다시 開胸하여 無事하였고 1例는 退院後 膿胸을 일으켜 再入院하여 全成形術을 받고 無事하였다. Lambert¹⁵⁾은 55例의 lobectomy中 9.1%의 死亡率(手術後 1個月以內 또는 退院할때까지의 入院期間中에)을 내었고 13例의 pneumonectomy中에서 46.2%의 死亡率을 내었다고 하며 著者는 이 結果를 1940年代의 胸廓 手術의 未備한 點에 依한 것으로 思慮된다.

內科 治療群에 있어서는 對症療法³⁾에 지나지 않을 것이며 近來 抗生劑 出現²⁰⁾으로 많은 도움을^{21,22,23)} 받고 있다고 報告되며 內科 治療 對象者의 繼續 觀察은 앞으로 우리에게 남겨진 課題의 하나이다. 剖檢 1例를 包含한 病理組織 標本 26例中 2例는 結核을, 1例는 膿瘍, 그리고 1例는 無氣肺를 同伴한 것으로 病理學的 診斷이 내려지고 22例인 84.6%의 單獨 氣管枝擴張症을 確認하였다. 肺結核後에 二次的으로 오는 氣管枝擴張症은 Edna⁶⁾等에 依해서 指摘된 바 있으나 著者는 選擇된患者라고 思慮된 中에서도 이와같은 合併症의 경우를 볼 수 있었다.

結 論

1962년부터 1967年 10月末까지 過去 6年間 세브란스病院 胸廓內科에 入院하여 氣管枝擴張症의 確診을 받은 患者는 總 62名으로 이는 어느 年齡層에도 올 수 있었으며 더욱 青年層에서 많이 볼 수 있었다.

2. 大多數에 있어서 처음 來院할 때까지의 症狀 發生 期間은 10年間 以內 이었다.

3. 氣管枝擴張症에서 가장 많은 症狀는 咯血이었고 症狀 發生 期間의 長短과는 無關係로 22.6%가 無症狀者이었다.

4. 咯痰의 細菌學的 檢查結果는 大部分이 非病原性菌이었고 Beta streptococci는 2.6%에 지나지 않았다.

5. 病巢의 範圍는 大部分이 1~2葉에 局限 되었고 右側보다 左側에 많았고 下葉이 大部分이며 中葉 上葉의 順位로 되어 있었다.

6. 氣管枝擴張症 形狀은 圓柱形擴張이 가장 많았고

泡囊形과 混合形의 順位로 되어 있었다.

7. 外科的 適應은 全患者의 53.2%이었고 適應者中 75%가 手術에 應하였다.

8. 病理組織學的 診斷으로 15.3%의 合併症을 볼 수 있었다.

References

- 1) S.S.Ham: Study on the Tuberculosis Infection Rates, Morbidity Rates and Therapeutic Results of Household Contacts in Korea, *Soo Do Medical J.*, 2:115, 1965.
- 2) Korean National Tuberculosis Association: *Tuberculosis in Korea*, Nov., 1962.
- 3) Cecil, R. L., and Loeb, R. F.: *Textbook of Medicine*, ed., 11 W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1963 P. 546-548.
- 4) Backly CE 3d et al.: *Bronchiectasis. The clinical syndrome and its relationship to chronic lung disease*, *A. J. M.*, 38:190-8 Feb., 1965.
- 5) Rytel M.W. et al.: *Infectious agents ass. with cylindrical bronchiectasis*, *Dis. chest*, 46:23-8 July 1964.
- 6) EDNA. M. Jones et al.: *Relationship between pulm. Tb. and bronchiectasis*, *Amer. Rev. Tuberc.*, 61:387, 1950.
- 7) Lisa, J. R., and Resenblatt, M.B.: *Bronchiectasis: Pathogenesis, Pathology and Treatment*, Oxford University Press, London, 1943, chap. 9.
- 8) McKim, A.: *Bronchiectasis as seen in an ambulant clinic service*, *Amer. Rev. Tuberc.*, 66:457. 1952.
- 9) Cecil, R. L., and Loeb, R. F.: *Textbook of Medicine*, ed. 8, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1951, p. 835.
- 10) Kay, E.B.: *Bronchiectasis following Atypical Pneumonia*, *A. M. Arch. Int. Med.*, 75:89, 1945.
- 11) Benstead, J.G.: *The flora of one Hundred Bronchial Secretions*, *Lancet*, 1:206, 1950.
- 12) Laurenzi, G. A., Potter, R. T. and Kass, E. H.: *Bacterial Flore of the Lower Respiratory Tract*, *New Engl. J. Med.*, 265:1273, 1961.
- 13) T. W. Walsh and O.O. Meyer: *Pus in the sinuses of 145 of 217 cases of Bronchiectasis*, *A. M. A. Arch. Int. Med.*, 61:890. 1938.
- 14) Neil Cherniack, and Robert W. Carton: *Factors Associated with Respiratory Insufficiency in Bronchiectasis*, *Amer. J. Med.*, 41:562, 1966.
- 15) Lambert, A.: *The results of surgery in bronchiectasis*, *J. Thoracic Surg.*, 19:246, 1950.

- 16) Max Ritvo: *Chest X-ray diagnosis*, ed. 2, Lea and Febiger Company, Philadelphia, 1956, p. 98.
- 17) Chapman, J., and Hoskins, H.: *Morphological Varieties of Bronchiectasis in Relation to History, Symptoms and signs*, *Am. Rev. Tuberc.*, 43:512-520, 1941.
- 18) Reid, L. M.: *Reduction in Bronchial subdivisions in Bronchiectasis*, *Thorax*, 5:233, 1950.
- 19) Frederick G. Kergin: *The surgical treatment of bilateral Bronchiectasis*, *J. Thoracic Surg.*, 19:257, 1950.
- 20) Barach, A. L., Bickerman, H. A., and Beck, G. J.: *Antibiotic Therapy in Infections of the Respiratory Tract: Use of Penicillin, Including Aerosol, Dust, and Diethylaminoethyl Iodide Penicillin; and Aureomycin, Terramycin, and Chrolamphenicol in Bronchiectasis, Bronchitis, Sinusitis, Bronchial asthma and Pulmonary Emphysema*, *A. M. A. Arch. Int. Med.* 90:808-849 (Dec.), 1952.
- 21) Medical Research Council: *Prolonged Antibiotic Treatment of Severe Bronchiectasis*, *Brit. M. J.*, 2:255-258 (Aug. 3), 1957.
- 22) Perry, K. M. A. and King, D. S.: *Bronchiectasis. A study of prognosis based on follow-up of 400 patients*, *Am. Rev. Tuberc.*, 41:531, 1940.
- 23) Cherniak, N.S., Vost, K. L., Dowling, H. E., Lep per M.H. and Jackson, G.G.: *Long-term treatment of bronchiectasis and chronic bronchitis*, *Arch. Int. Med.*, 103:345, 1959.

—Abstract—

CLINICAL STUDIES ON BRONCHIECTASIS

Sung Sook Ham, M.D., Hyung Duk Kim, M. D.

Department of Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.

Bronchiectasis, which occurs at a relatively low rate in the general population, 1.3 out of 1,000, often makes both the clinician and patient confused due to its symptoms which are similar to those of pulm. Tb.. This becomes especially so in Korea where there are a large number of pulm. Tb. patients.

The writer has investigated clinical dates and findings of 62 hospitalized patients having bronchiectasis at Severance Hospital from 1962 to Oct. 1967.

The results are briefly summarized as follows;

1. The disease may occur at any age, but most commonly the patients are 10-29 years of age.
2. The duration of symptoms was within a 10 year period when they first consulted a physician.
3. The extent of the disease was usually confined to 1 or 2 lobes and involved the left side more often

than the right.

The involvement was usually of the lower lobe, middle and upper lobe in that order.

4. The cylindrical type of dilation was most common followed by the sacular and mixed type.
5. The most common manifestation of bronchiectasis was hemoptysis while 22.6% of the patients were asymptomatic.
6. In most of the cases, no pathogenic organism was found in the sputum, and B-streptococci was found only in 2.6%.
7. The surgical indications were present in 53.2% of all the patients, but only 75% of these underwent surgery.
8. Complicated by tuberculosis, lung abscess and atelectasis of 15.3% in the pathological diagnosis.