肺結核과 肺膿瘍의 鑑別診斷

梨花女子大學校 醫科大學 胸廓內科

李 起 鏞

Differential Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis and Lung Abscess

Ki Yong Lee, M.D.

Department of Chest Medicine, College of Medicine,
Ewha Women's University

肺結核과 肺膿瘍의 鑑別診斷에 있어서 重要한 것은 只今까지의 經過 卽 病歷 症狀 理學的檢査 tuberculin 所見成績 X-Ray所見 血液所見 細菌檢出 治療經過等으로 鑑別할 수 있으며 其中 가장 鑑別의 特徵이 되는 것은 細菌檢出, 卽 咯痰에서 結核菌의 發見과 肺膿瘍에서는 이러 Pyogenic bacteria의 檢出이 가장 重要한 鑑別點이 되었고 둘째로 그 症狀이 重要한 것이다. 肺結核에 症狀은 症狀없이 集團檢診에서 發見되는 經過 또는 病이 많이 進行되며 來院하는 수가 많다. 한편 肺膿瘍에 있어서는 症狀이 acute onset이며 急作스런 症狀이 나타나는 것이 特徵에 하나라고 생각할 수 있다. 例를 든다면 發熱은 onset 後 急作스런 高熱及惡寒과 많은 量에 咯痰이 온다. 다음에는 血液所見이다. 結核에서는 白血球增加는 거의 없으며 간혹 있다고 해도 若干에 增加를 보이지만 肺膿瘍에서는 急作스런 增加를 볼 수 있다. 그 외에도 胸部 X-線檢査로 發生에 位置는 多少 鑑別에 要點이 되나 特有한 鑑別은 困難하다. 其他 鑑別로서 理學的檢査로서 嚔診 打診 聽診 등이 있다. 이 세가지 方法은 鑑別診斷에 큰 도움이 되는 것은 아니다.

症 狀

1) 熱: 肺結核은 全身結核外는 普通 서서히 進行됨으로 熱없이 進行되는 경우와 또 熱이 있다고 하여도 微熱로서 37°23°C 程度에 熱이 가장 많다. 한편 肺膿瘍에 있어서는 急作스런 熱과 惡寒을 同作하여 高熱 38°C 以上을 갖아온다. 近來에 와서는 抗生劑에 發達로 因하여 感冒에도 많은 抗生劑를 使用하는 故로 肺膿瘍에서는 特有한 高熱과 惡寒이 적은 경향이 있다. 또 이 高熱과 惡寒은 肺膿瘍 以外에 肺炎과의 鑑別은 困難한 때가 있다.

2) 咯痰……結核에 初期에는 咯痰이 거의 없다가 進行됨에 따라서 점차적으로 생긴다. 한편 肺膿瘍에서는 갑자기 數日後부터 痰量이 多量 나오며 악취가 있는 것이 特徵이다. 이 痰量을 유리컵에 받아보면 三層의 現象(three layers phenomenon): 上層에서 mucous layer 中間層에 milky watery layer 下層에는 pus cells layer의 특징을 나타내는 것이다. 그러나 肺結核과 肺膿瘍이 併合되었을 때는 鑑別은 困難을 초래할 것이다.

3) 其他症狀으로 局所증상으로 血痰, 胸痛, 呼吸困難 全身症狀으로 오는 疲勞感 全身 倦怠 體重減少 食慾不振 盜汗 등이 있으며 肺結核에서는 血痰(鮮紅色에 單純한 色갈을 말하나) 한편 膿瘍에서 血痰과 炎症性物質이 같이 混合되어 咯出하게 된다. 胸痛은 結核에서 初期에는 적고 呼吸困難도 稀少한다. 重症患者에서 만 흔히 볼 수 있다. 膿瘍에 急作한 것으로 空洞의 胸膜에 가까운 곳에 생기면 胸痛이甚할 수 있으며 呼吸困難도 있다. 全身症狀도 膿瘍에서 急作스런 量에 오는 것이 普通이다.

투버큐린反應

鑑別診斷으로 우리 나라에서는 과히 信賴性이 적은 것이다. 卽 우리 나라에 結核에 感染率은 70~75% 程度이며 單 美國 같은 나라에서는 約 20% 程度에 結核 感染率을 나타낸다. 이 투버큐린도 鑑別點은 하나가 될 것이다.

理學的 檢査

膿瘍에 位置에 크기에 따라서 다르다. 中心部에 작은 膿瘍을 證明하기 어려우나 浸潤이 크면 聽診의 結果로 大部分 氣管枝呼吸音 及 右室性水泡音이 聞린다. 肺의 一部分이 咯出되면 定型的인 鼓注打診音 及 嚔注, 呼吸音,

屬에水泡性이 아니라 打診으로 금속음이 聴取된다.

그러나 胸膜腔은 纖維素片이 있으므로 眞性인 金屬이 아니고 變調音이라고 보겠다.

臨床檢査 所見

1. 객담 중에서 結核菌을 證明하는 것과 肺膿瘍에서 여러가지 原因菌을 發見하는 것이 鑑別點이 될 것이. 肺膿瘍에 객담에서 볼 수 있는 이 菌을 順序의로 보면 Hemolytic streptococcus, non hemolytic streptococcus, staphylococcus aureus, 및 krebsella pnunmoniae etc 다.

아마에서 過半數以上이 streptococcus로 오는 것이며 것에 原因은 infected material의 吸入으로 인한 炎症에 滯留 嘔吐 瀉瀉時 癱瘓 及 拔齒에 意識不明狀態로 서 嚥下가 原因이 되는 것이다. 그리하여 患者에 病이 重要할 때 가 말으며 肺膿瘍에 의심이 있을 때에는 記한 病歷에 眞菌을 問質하여야 한다. 한편 結核에서 喀痰統計標本에서 結核菌이 나오지 않는다고 서 結核이 아니라고 判定할 수는 없다. 胃液採取(入 학의 食前 bed에서) bronchoscopy하여 材料를 得하여 養하는 方法 그리고 動物接種 등으로 結核菌을 證明해 鑑別하여야 하겠다.

血液……肺膿瘍에서 血液像은 白血球가 增加되는 것 다. 普通 1立方mm 20,000~30,000까지 增加하여 immature neutrophile가 늘어난다. 또한 結核에 있어 白血球는 正常 狀態를 維持하는 것이 普通이지만 輕微 多少 白血球에 增加를 볼 수 있다. 白血球에 異常을 볼 수 있는 疾患은 miliary T.B. 에 볼 수가 있다.

X-線 診斷

特有한 客體와 X-線上으로 空洞을 나타냈을 때는 診에 判定을 할 수 있는 있으나 特別한 症狀없이 特別期에 있어서는 空洞이 完全形成이 안되었을 때는 急慢性과 鑑別이 困難하며 經過後에 肺炎이나 多發에 變호되자 鑑別되는 것이다. 空洞이 생겼을時 肺結核 肺膿瘍兩者에 鑑別이 必要하다.

또 多發性 肺膿瘍이 있는 患者가 肺膿瘍을 合併하는 것으로 된다. X-Ray 上으로 어떤것이 先行條件인지 分明할 수 없다.

病變의 位置

肺結核에 있어서 空洞이 初期에 肺 $\frac{2}{3}$ 部分 肺 普通 腔下部 1cm 以下에 位置 空洞이 나타나며. 어떤 位置에는 肺炎部에 陰影이 나타난다. 下葉에 結核이 發

沒害하는 部位는 主로 superior segment, lingular segment에 많다.

한편 肺膿瘍에 있어서는 右肺 特히 右上葉에 많다. 下葉에 많이 發生한다고 하였지만 近者에서는 上葉에 많다고 한다. 右肺對 左肺에 發生率은 Hinshaw, willing and picker等에 依하면 3對1 程度이며 男子對 女子에 대해서도 3對1 程度이다. 兩側에 생기는 예는 적은 편을 차지하고 있다.

肺膿瘍이 發生하면 初期에 segmental 또 lobar에 consolidation, 進行하면 rupture 되어서 空洞이 形成하며 膿液이 貯溜되면 空洞內에 水平面을 못하게 된다. 結核에서는 이 fluid level은 거의 보이지 않는 것이 특징이다. 不規則인 두터운 空洞일 때는 case 結果가 오는 수가 많고 fluid level로 Friedlander Bacilli로 오는 空洞은 空洞內 많은 fluid level을 갖은 multiloculated이며 staphylococcus aureus는 多發性이고, 적고 또 많은 空洞壁이 peripheral location에 많이 생긴다.

References:

- 1) Hinshaw, H.C., garland, L.H.: *Discasts of the chest*, 2nded, philadelphia & London, Saunders, 1963.
- 2) Bernhard, w.F. Malcon J.A., Wylie, R.H: *Lung abscess; A study of 148 Cases due to aspiration* *Dis. chest* 43: 620, 1963
- 3) Collins, H.A. guest, J.L. Daniel, R.A Jr: *Primary lung abscess, J. Thor. & cardiovas surg*, 47:383, 1964.
- 4) Cecil-Loeb Text of Medicine. Philadel phia & London 1963
- 5) Harrison, Adams: *Internal Medicine* 1963
- 6) 朱浩星: 肺結核의 診斷과 治療, 大韓內科學會雜誌 1: 9, 1966
- 7) 李復熙, 外4人: 肺膿瘍의 75例의 臨床의 考察, 大韓內科學會雜誌 25: 11, 1968
- 8) 朴海珍, 朴洪培, 趙正根, 金洪植: 肺膿瘍 患者 76例에 對한 臨床의 考察, 大韓內科學會雜誌 43: 12, 1969
- 9) 唐順榮, 金敬植, 金起鎭, 金賢圭, 洪錫勳: 最新肺結核의 診斷과 治療, 1961