結核病院에서의 精神健康 問題에 關한 研究

서울特別市 市立西大門病院 內科

鄭 在 赫

=Abstract=

A study on mental health problems in tuberculosis sanatorium

Chae Hyok Cheong, M. D.

Seodaemoon City Hospital, Seoul, Korea.

The mental health problems in the tuberculosis Sanatorium have been studied.

1. Neurotic tendency of pulmonary tuberculosis patients was evaluated by Eysenck's maudsley medical questionnaire and following results were obtained, In male patients group mean score was 15.86 with standard deviation of 8.55 and in female patients group mean score was 17.78 with standard deviation of 7.23.

2. 85 patients who scored above 20 points by the medical questionnaire were analyzed according to neurotic symptoms. Anxiety was cardinal symptom in both sex groups.

3. Mental health problems in the tuberculosis sanatorium are complex of realistic and Neurotic components. Theoretical principle of synthetic psychothuropy, named "Active Resignation" was proposed for foundation of sound belief in the sanatorium.

서 론

폐결핵 환자의 정신건강에 영향을 주는 문제들을 열거해 보면 그 질환 자체가 만성 전염병이며 특히 西大門市立病院에서와 같이 환자의 대다수가 입원전 항결핵치료에 실패한 중증환자¹⁾(총 395명중 중증 294명, 74.4%)로써 단시일내에 치유되기 어렵거나 혹은 전혀 치유 불가능한 상태이며, 경제적 가정적 내지는 사회적으로 그들이 받는 정신적 부담이 막중하며, 총 입원 환자의 90% 이상이 무료환자라는²⁾이 곳의 특수성, 또 의사 간호원 및 기타 의료종사자들의 환자 진료에 임해서의 신념의 문제, 퇴원 환자에 대한 정신적 재활교육문제 등등 많은 문제점을 열거할 수 있을 것이다. 이는 西大門病院에만 국한된 문제가 아닐 것이며 결핵병원 일반적 문제라고 하겠다. 그러나 이 문제에 관한 문헌은 비교적 드물며 우리나라에서는 吳等³⁾의 연구 보고가 있으나 문제점만을 재기하고 그 해결점에 관해서는

뚜렷한 고찰을 결하고 있으며 또 실제 결핵치료에 임하고 있는 당사자들에 의한 연구 보고는 더욱이 드물어서 著者는 여기에서 이 문제를 다시 學論하며, 또 환자 등의 정신건강뿐 아니라 그것과 직접 관련되는 원활한 疾患 관계의 확립을 위하여 兩者間의 合一된 신념의 모색을 고안하는 바이다.

방법 및 대상

연구 대상은 서울특별시 시립 西大門病院에 73年 3月 1日 현재 입원중인 폐결핵환자중 불가항력으로 시험에 참가치 못한 인원을 제외한 307명(남자 218명 여자 89명)이 포함되었다. 정신건강의 척도로써 一次的으로 Eysenck가 신경증 경향도를 측정하기 위하여 고안한 Maudsley medical questionnaire^{4) 5)}를 사용하여 남녀 환자들에서의 득점을 계산하였다. 직접 사용한 자료는 Eysenck medical questionnaire의 한국판^{6) 7)}이었다. 이 一次 검사 측정으로써 평균 점수를 산하여 他 연구에서

의 특점 평균치와 비교 고찰한 바 전체적인 폐결핵 환자에서의 신경증 경향도를 알 수 있었다. 그러다음 특점 20점 이상인 환자 총 85명(남자 53명, 여자 32명)을 가려내어 그들의 구체적인 신경성 증상별 빈도를 개별적問診을 통하여 측정하였다. 끝으로 환자들에게 병상생활증 가해지는 현실적 不安, 초조, 비판 내지는 고뇌의 강한 자극이 될 입원중 사망자의 직접 사인別 빈도를 72년 통계에서 구분하여 분석 고찰하였고 考案에서는 이러한 정신적 건강 문제의 해결을 위한 기존 학설중에서 이론적 공통點을 가려내어 一般醫에게 비교적 간편하다고 사료되는 종합적 심리요법의 원칙을 제시하였다.

결 과

Eysenck medical questionnaire^{1), 5)}에 의한 신경증 경향도를 서울시 시립西大門 病院에 입원중인 폐결핵환자 307명(남자 218명, 여자 89명)에게 시행하였던 바 표1과 같은 점수분포를 나타내었다. 그 평균치는 남자 환자군에

표 1. 點數分佈

점 수	남 자	여 자	計
1~3	6		6
4~6	23	4	27
7~9	27	6	33
10~12	22	15	37
13~15	28	12	40
16~18	34	12	46
19~21	26	13	49
22~24	22	11	33
25~27	11	5	16
28~30	10	6	16
31~33	6	5	11
34~36	2	0	2
37~39	1	0	1
計	218	89	307

평균점수 15.86±8.55 17.78±7.23

서 15.86, 표준편차 ±8.55 였으며 여자 환자군에서는 평균치 17.78, 표준편차 ±7.23 이었다. 다시 20점 이상 특점자를 신경증적 경향도가 높다고 인정되어 그 수를 보면 총 85명 중 남자 53명, 여자 32명이었으며 이 85명에 대한 신경성 증상 빈도의 측정치는 표2에 나타난 바와 같다. 즉 빈도순을 보면 남자군에서는 不安感이 26例로써 가장 많으며 다음이 현실비관 25例, 불면증 16例, 식욕부진 16例, 항결핵二次藥신경증 11例, 기타의 순위

표 2. 신경성 증상 빈도

	남 자	여 자	計
불안감	26	16	42
현실비관	25	7	32
불면증	16	10	26
식욕부진	16	5	21
2차약신경증	11	0	11
두통	9	9	18
신경질	7	5	12
소화장애	6	14	20
현기증	5	4	9
열등감	3	0	3
고독감	3	1	4
피로	2	4	6
설사	1	2	3
計	130	77	207

표 3. 直接死因別 빈도 (72년도)

사 인	남 자	여 자	計
호흡부전	46	9	55
대량각혈	10	3	13
폐성심	8	14	22
자살	3	0	3
뇌막염	1	0	1
하혈	1	0	1
뇌일혈	1	0	1
計	70	26	96

이며 여자 환자군에서는 역시 不安感이 16例로써 순위이며 소화불량 14例, 불면증 10例, 두통 9例, 기타의 순위였으며 男女群 共히 不安感 내지는 초조가 그들의 주요 신경성 증상이었음을 보이고 있다. 여기에서 언급해야 할 점은 증상빈도 측정에 있어서 한 환자가 각각 二 내지 三개의 신경성 증상을 호소하고 있다는 점이다.

72년도 西大門病院에서 폐결핵으로 사망한 환자수는 96例로써 그 직접 死因別빈도는 표3에서 보는 바와 같다. 남자 사망자군에서는 여자 사망자군에서 보다 그 원인의 다양성을 보이고 있다. 96예 중 남자 70명 여자 26명이었으며 남자군에서의 빈도 순위를 보면 호흡부전 46예, 대량각혈사 10예, 폐성심 8예, 자살 3예(그 중 추락사 2예, 경동맥절단 1예) 기타의 순위이며 여자군에서는 폐

성심 14예, 호흡부전 9예, 대량각혈사 3예의 순서이다. 주의를 요할 점은 남자에서 병상생활 중 자살사 3예의 경우와 他 患者들에게 현실적으로 심리적 경악 내지는 충격을 주는 대량각혈에 의한 急死의 例들이었다.

고 안

어떤 집단의 신경증적 경향도의 측정법으로써 사용하고 있는 심리적 검사법은 Eysenck의 고안에 의한 Maudsley medical questionnaire^{1,4,5,6}와 吳等⁷이 폐결핵 입원환자에게 시행했던 Cornell medical index² 등이 있으나 著者들은 우리나라에서 측정 例가 수례 보고된 바 있는 Eysenck의 방법을 택하여 他 측정치와 비교 고찰하고자 하였다. 吳等⁷의 보고에 의하면 폐결핵환자에게 Cornell medical index로써 신경증적 경향도를 측정 한 바 정상군에서의 평균치는 27.74 내지 29.10점을 보고하였고 폐결핵환자군에서는 이 보다 훨씬 높은 평균 44.67점이라는 보고를 했으며 고찰에서 신경증환자의 평균치인 50점에 접근하고 있다고 했다⁷. Eysenck medical questionnaire에 의한 측정치는 Eysenck 자신의 보고^{1,4,5}에서 英國人 정상군은 2.81 ± 2.60 , 신경증군에서 남자 19.51 ± 8.66 여자 16.82 ± 8.54 였고, 한국에서의 측정치는 62년 金の 남자 대학생군에서 13.54 ± 6.66 , 기타 여자군에서 15.94 ± 6.51 로써⁴ 英國人에서의 정상인 측정치 보다 월등히 높은 값을 보이고 있으며 다시 62년 成에 의해 행한 값은^{4,6} 정상인 집단에서 14.68 ± 5.08 신경증집단에서 27.9 ± 4.93 이었다고 했다. 최근 任⁴이 국립의료원 신경내과에서 입원중인 신경증 환자에게 행한 同一 검사의 성적은 남자군에서 22.0 ± 6.53 여자군에서 23.6 ± 6.06 의 값을 보고하고 있다. 著者의 측정치는 폐결핵 남자군에서 15.86 ± 8.55 폐결핵 여자군에서 17.78 ± 7.23 으로써 任의 신경증군에서의 값보다는 낮고 金과 成의 정상인군에서의 값보다는 남녀 공히 약간 높은 값을 보이고 있다. 이로써 결핵환자에서의 신경증적 경향도가 높다고 보고 吳等의 Cornell medical index에 의한 값에는 다소 미흡한 결과라고 하겠다. 任은 한국인에서의 측정치가 英國人에서의 것보다 정상인에서 월등히 높은 것에 관해 비교 고찰하고 그 내용에 대해서는 未知라고 결론짓고 있다.

증상別 빈도의 결과를 보면 吳의 보고에서는 신체적 증상과 정신적 증상을 구분하고 신체적 증상으로서 호흡기 계통이 제일 많고 다음이 피로 및 심장혈관계이며, 정신적 증상에서는 부처당감이 제일 많고 분노심, 과민, 긴장, 불안감의 빈도 순위 보고를 하고 있다⁷. 著者의 연구에서는 고정된 設問에 의한 것이 아니고 환자

들 각자의 중요한 증상을 직접 문진으로써 얻은 재료의 빈도 순위이므로 吳等의 보고와 여기서도 다소의 차이를 나타냈다고 보며, 뚜렷한 기질적 원인에 의한 증상 즉 예를 들면 결핵환자에서 흔히 보는 해소, 각혈, 호흡곤란 등은 제외하고 신경성 증상만을 취한 증상 빈도의 분석이다. 한 사람이 5개씩의 중요한 증상을 문진한 바 신체적인 것이 218개, 신경성 증상이 207개으로써 대략 신체적 증상과 신경성 증상의 비는 同一함을 보이고 있다. 신체적 증상의 분석은 여기서는 제외하고 207개의 신경성 증상의 빈도 분석에서 男女 共히 不安感이 수위를 보였다. 증상 빈도 순위 분석에서 주저한 것은 호흡곤란의 증상처리였는 바 호흡곤란은 신경성 증상으로써도 신체적 증상으로써도 중요한 것이기 때문이었다. 즉 Hyperventilation syndrome의 문제인 것이다. 그러나 중증 결핵에서 기질적 원인에 의한 호흡곤란과의 혼동을 피하기 위하여 여기서는 완전히 제외한 점이다. 그리고 식욕부진, 두통, 소화장애 등의 증상에도 어느정도의 결핵의 고유신체증상 및 약물부작용으로 인한 증상이 포함됐을 것을 인정해야겠지만 不安感의 경우는 Cycloserine의 사용을 중지한 본원에서는 약물부작용으로써의 빈도측정에 영향은 없었을 것으로 사료된다. 男子군에서 보인 항결핵二次약 신경증이란 특수한 것으로써 이는 二次약만 먹었을 있다면 완치가 될 것이라고 생각하는 중증 환자에서의 심리적 집착증상을 의미한다. 총입원환자의 90%가 무료환자인 본원에서만 볼 수 있는 종류의 신경성 증상이라 하겠다.

결핵병원 환자의 정신건강 문제를 좀더론 각도에서 고찰한 사망자의 통계분석은 3명의 자살사와 13명의 대량각혈사를 보여주는 바 이로 보아 많은 자살 후보자의 실재를 예측할 수 있으며 또 처참한 비극적 종말인 각혈사를 빈번히 목격하게 되는 환자들의 정신적 충격은 지대한 것으로써 정신건강을 해치는 요인중의 하나로써 고찰하는 바이다.

상술한 바와 같은 결핵환자에서의 정신적 고뇌의 해결점을 고안해 보겠다. 우선 그들의 신경증상의 수위를 점하고 있는 不安感의 문제를 중심으로 다루어 보고자 한다. 不安은 현실적 불안과 신경증적 불안으로 분석할 수 있다³. 그리고 이 연구에서는 주관적 호소에 의한 증상의 분석이었음으로 그들의 不安은 현실적 불안과 신경증적 불안의 복합체로 보는 것이 타당하다고 사료되는 바이다. 따라서 신경증적 불안의 分析만으로는 완전한 정신건강의 문제 해결이 될 수 없을 것을 고안하는 바이며 아울러 一般醫의 정신분석 능력의 평가도 문제일 것이다. 이에 결핵병원에서의 심리요법의 한 원칙을

제시하는 바이다. 여기서 고려한 조건으로는 첫째 이론체계가 간단 명료하여 一般醫나 환자가 이해하기 용이해야 할 것. 둘째 집단요법에 적합해야 할 것. 셋째 도덕적 구속, 종교적 편견에서 벗어나므로써 환자에게서 정신적 저항을 받지 않아야 할 것. 넷째 인간의 존엄성과 개인의 자유 자주 자율 정신에 입각한 자각적 신념의 확립에 의한 것등이라 하겠다. 그 이론적 근거는 현재 정신분석학의 첨단이라 할 Frankl의 實存分析과⁹⁾ 모리다(森田)의 심리요법¹¹⁾에 두고 여기에 Herman Hesse의 1919년 以後의 求道的 實存文學사상²⁵⁻³³⁾ 禪思想¹⁸⁻²⁴⁾ 老莊子の 東洋철학사상^{16, 17)}을 추가한 자각적 신념의 확립에 둔 심리요법으로써, 이들에 의하면 신경증적 不安이나 현실적 不安이 나를 불구하고 그 해소 방법은 不安이라는 정신적 고뇌 自體에 대처할 各自의 근본적 정신태도 여하로서 좌우된다는 것이다. 이들의 이론체계 사이에는 많은 共通點을 가지고 있으며 이들 著者は 적극적 체념(Active resignation)이란 말로써 그 이론의 개념을 종합할 수 있겠다. 이는 Frankl의 역설적지향(paradoxical intention), 모리다(森田)의 不安에의 服從, 禪에서의 번뇌 즉 解脫, 老莊子の 道心 속의 安住, Herman Hesse의 不安과의 共存, Nietzsche의 運命愛에 해당하는 것이다. 간단히 그 심리요법의 적용을論하면 不安 그 자체가 고뇌라는 현실적 사실을 醫患間에 절대적으로 인정하고 그 속에 자신들을 적극적으로 내던지는 求道的 苦行者的 체념적 勇氣를 말한다. 즉 不安과의 正面 對決이 아니고 그 不安을 극복하기 위하여 不安을 우선 환영하고, 영접하여 自我속에 포함함으로써 그것을 극복하는 역설적인 이론이라 하겠다. 이는 단순한 퇴폐적인 의미의 체념과는 완전히 상반되는 것으로 Frankl이 역설적 지향(paradoxical intention)이라고 하는 이유이기도 하다.

상술한 바는 주로 不安의 문제에 대한 고찰인 바 그의 신경성 증상 즉 현실비판, 불면증, 식욕부진, 두통, 신경과민 등등 신체적 원인이 아닌 신경성 원인에 의한 것에는 상술한 심리요법의 원칙을 각개 증상에 대하여 적용할 수 있을 것이며 아울러 二次藥性경증과 같은 현실적으로 해결해야 할 문제들은 적극적인 해결방법이 요구되야 하겠다고 사료되는 바이다.

결 론

1. 결핵병원 환자에서의 신경증 경향도를 Eysenck의 Mandsley medical questionnaire에 의하여 임원중인 폐결핵환자에게서 측정 한 바 그 평균점은 남자군에서 15.86 ± 8.55 , 여자군에서 17.78 ± 7.23 의 성적이었다.

2. 그의 득점 20점 이상인 환자에게서 신경성 증상 빈도를 측정하였던 바 不安感이 男女 양군에서 수위의 빈도를 나타내었다.

3. 결핵병원에서의 정신건강 문제는 현실적 및 신경증적 고뇌의 복합체이다. 이에 신념의 확립을 위한 고안에서 적극적 체념"이란 종합심리요법의 이론적 원칙을 제시했다.

References

1. Eysenck, H. J., *Dimensions of Personality*. London, Routledge & Kegan Paul 1947.
2. Brodman, K., Edman, A. J. Jr., Lorge, I., Wolff, H. G. and Broadbent, T. H., *The Cornell medical index and adjunct to medical interview*, J. A. M. A. 140; 530-534, 1949.
3. Freud, S: 精神分析療法 日本敎文社 1958.
4. 任百仁: 綜合病院에서의 Neurosis의 態度, 대한내과학회잡지 15권 11호 1972.
5. 金聖泰: Eysenck의 모스리 醫學的 質問紙의 韓國版
6. 成普星: Eysenck의 모스리 醫學的 質問紙의 韓國版을 爲한 妥當度研究 成均館大學校 碩士學位研究論文 1962年
7. 오석환, 박조열, 이제민, 박희주, 황선무: 임원된 폐결핵 환자의 정신건강에 관한 고찰, 神經精神醫學 제9권 제1호 1970.
8. 崔臣海: 노이로제제의 治療와 豫防 1965.
9. Frankl, V. E: *Paradoxical intention, A logotherapeutic technique*, Amer. J. Psychotherapy 14: 1960.
10. Karen Horney: *Self analysis* W. W. Norton & Co. 1942.
11. 森田正馬: 神經質의 本態와 療法 1925.
12. 高良武久: 神經衰弱と 神經質 1960
13. 閔秉根: 呼吸器系統의 精神身體疾患: 대한의학협회지 65. 6월.
14. 鄭在赫: 心臟神經症의 療法에 關한 研究 最新醫學 10권 3호 1967.
15. 서울특별시립서대문병원 연보 72 Vol. 1
16. 老子道德經
17. 莊子南華經
18. 維摩經
19. 般若心經
20. 金剛般若經

21. 法華經
 22. 佐藤幸治 : 心理禪
 23. 鄭在赫 : 정신의학적 불교관 불교사상 14권 1963.
 24. Fromm, Erich: *Zen and Psychoanalysis* 1958.
 25. Herman Hesse: *Dermian* 1919.
 26. Herman Hesse: *Innen und Aussen* 1920.
 27. Herman Hesse: *Klein und Wagner* 1920.
 28. Herman Hesse: *Siddhartha* 1922.
 29. Herman Hesse: *Der Steppenwolf* 1927.
 30. Herman Hesse: *Narziss und Goldmund* 1930.
 31. Herman Hesse: *Glasperlenspiel* 1943
 32. Herman Hesse: *Die Gedichte* 1942.
 33. Herman Hesse: *Krieg und Frieden* 1946.
 34. Nietzsche, F: *Also sprach Zarathustra*.
 35. Cecil: *Textbook of medicine* 1971.
-