韓國人 肺癌에 對한 臨床的 觀察

國立醫療院 胸廓內科

吳 重 根

—Abstract—

Clinical Aspects of Lung Cancer

Joong Keun Oh, M. D., F. C. C. P.

Department of Chest Medicine the National Medical Center

It is a general observation that carcinoma of the lung seems to be increasing in frequency in most part of the world.

From Korea, however, only very little has been reported so far on the problem of lung cancer.

Author attempted to carry out a series of clinical investigation of lung cancer in Korean who was admitted to chest medical department, the National Medical Center during the period of first three years (group one) from soon after the opening the hospital in 1958 to 1961 and last six years (group two) from 1967 to 1972.

1. The subjects were 63 cases (49 male and 14 female) in group one and 98 cases (74 male and 24 female) in group two.

2. The peak incidence of lung cancer were 50 years of age group and the youngest patient was 29 years old and the oldest patient was 74 years of age.

3. The sex distribution there being a man: woman ratio of 3.5:1 in group one and 3.0:1 in group two.

4. The smokers were affected 2.4 time higher than the nonsmokers.

5. The relationship with dust, there was more lung cancer in dustless occupation.

6. Cough, chest pain, dyspnea and bloody sputum were the most frequent initial symptoms.

7. The average duration symptoms from onset to diagnosis were 6.8 months.

8. Surgery was performed on 25 cases.

9. Initial diagnosis were variously, among which pulmonary tuberculosis was most predominant.

10. Direct finding of bronchoscope was 60.6 per cent.

11. Study on the method of diagnosis revealed that intrabronchial biopsy (54.6%), prescalene biopsy (37.0%) and sputum cytology (31.0%).

12. There is a preponderance of squamous cell carcinoma (41.2%), epidermoid cell carcinoma (32.4%) and adenocarcinoma (20.6%) in this series. Anaplastic carcinoma was found in only 5.8 per cent.

I. 緒 論

우리나라에 있어서도 最近 十數年에 있어서 肺癌의 增加는 마치 結核과는 正反對로 世界各國에서와 마찬가지로 顯著하게 나타나고 있다. 이것은 國民保健上 至大 한 關心꺼리가 되고 있다고 하겠다.

肺癌이 增加하는 理由로는 診斷法의 改良에도 있겠으나 傳染病과 其他 疾患이 減少되고 平均壽命이 增加된 것과 文化가 發達하고 人口가 增加됨에 따라 各種 刺戟이 增加된 데에도 原因이 있는 것으로 보인다.

肺癌의 原因에 對하여는 여러가지 說이 있으며 化學的 및 物理的刺戟 그중에도 汚染된 空氣와의 關聯, 特히 吸煙 其他 煙氣의 吸入等을, 近年에는 肺結核이 肺癌發生에 關係가 있을 것이라고도 報告하였다.

肺癌의 治療成績을 向上시키는 唯一한 方法은 아직까지도 早期診斷에 따른 外科的治療일것으로 著者は 過去 國立醫療院胸廓內科에 入院하였던 肺腫瘍患者에 對하여 早期診斷問題 臨床의所見 其他 經過等を 觀察하였으므로 이에 報告하는 바이다.

II. 資料 및 方法

資料는 過去 國立醫療院胸廓內科에 入院하였던 肺腫瘍患者中에서, 第1群을 1958年 11月 國立醫療院 開院 當時부터 1961년까지의 入院患者 63例와 第2群은 1967年에서 1972년까지의 6個年間の 入院患者 98例에 對하여 比較觀察하였다.

診斷의 參考가 되는 年齡 및 性別, 遺傳的關係, 吸煙과의 關係, 空氣의 汚染, 初發症狀, 罹患期間別, 治療와 轉歸, 初診時 診斷外에 後記한 바와 같이 大部分의 例에서는 肺結核 또는 其他의 診斷下에 依賴되어 왔으므로 이들에 對하여 X線斷層撮影, 氣管支鏡檢査, 氣管支內 또는 淋巴腺의 生檢, 喀痰의 細胞學的檢査, 氣管支內腔塗抹檢査, 肋膜液 貯溜가 있을 때는 이의 穿刺 및 細胞學的 檢査, 必要에 따라서는 肺와 肋膜의 穿刺生檢을 一般檢査外에 施行하였다.

III. 結 果

1. 年齡 및 性別:

當胸廓內科에 入院하였던 肺腫瘍 161例를 年齡 및 性別로 보면 第1表에서 보는 바와 같이 男女 共히 40歲以上에서 顯著하게 많은 것을 볼 수 있다. 또한 原發性肺癌만을 추려 보면 第1圖와 같이 40歲以上은 뚜렷이 增加하고 있다.

以上과 같이 肺癌을 診斷하는데 있어서 年齡의인 要

第1表 肺腫瘍의 年齡 및 性別

a) 第1群 63例

年 齡	男				女				合 計
	原發性癌	縱隔腫瘍	續發性癌	小 計	原發性癌	縱隔腫瘍	續發性癌	小 計	
20~29	—	1	1	2	—	—	1	1	3
30~39	—	—	—	—	4	—	—	4	4
40~49	12	2	—	14	4	—	—	4	18
50~59	21	—	—	21	4	—	—	4	25
60~69	11	—	—	11	1	—	—	1	12
70~	1	—	—	1	—	—	—	—	1
計	45	3	1	49	13	—	1	14	63

b) 第2群 98例

年 齡	男				女				合 計
	原發性癌	縱隔腫瘍	續發性癌	小 計	原發性癌	縱隔腫瘍	續發性癌	小 計	
20~29	—	—	1	1	—	—	—	—	1
30~39	5	1	1	7	2	—	3	5	12
40~49	9	—	3	12	4	—	2	6	18
50~59	24	5	4	33	6	—	2	8	41
60~69	17	—	1	18	3	—	—	3	31
70~	3	—	—	3	2	—	—	2	5
計	58	6	10	74	17	—	7	24	98

第1圖 原發性肺癌의 年齡과 性別

素는 重要な 것이다.

男女比는 第1群에서 3.5:1, 第2群에서 3:1이었다.

第2表 肺腫瘍과 吸煙量과의 關係

症例數 喫煙量	第1群			第2群		
	男	女	計	男	女	計
0	4	12	16	11	20	31
1~9本	8	2	10	18	4	22
10~19	24		24	26		26
20~29	6		6	9		9
30~	1		1	2		2
未詳	6		6	8		8
合計	49	14	63	74	24	98

第3表 肺腫瘍과 職業

塵埃와 關係가 많은 職業					
症例數 職業名	第1群		第2群		
	男	女	男	女	
商 業	7		8		
工場工員	1		1		
勞 動	19		6		
合計	27		15		

塵埃와 關係가 적은 職業

症例數 職業名	第1群		第2群		
	男	女	男	女	
事務員	1		6		
教師	1		2		
新聞記者	2				
會社重役	1		1		
公務員			1		
農 業	15	1	19	1	
家事		13		15	
無 職	16		30	8	
合計	36	14	59	24	

2. 遺傳的關係:

第1群에서 父에서 3例, 母에서 1例, 以外에는 第2群에서는 遺傳的關係는 하나도 없었다.

3. 喫煙關係:

肺癌의 發生因子로 吸煙에 對한 論難이 있으나 여기서는 肺癌患者의 吸煙量을 健康時의 平均 1日量으로 調

第4表

肺癌의 初發症狀

	原 發 性		續 發 性
	1群(60例)	2群(75例)	3群(17例)
	%	%	%
咳 嗽	48(80.0)	74(98.7)	6(35.3)
胸 痛	34(56.7)	54(72.0)	10(58.8)
血痰咯血	30(50.0)	40(53.3)	5(29.4)
呼吸困難	26(43.3)	46(61.3)	12(70.6)
咯 痰	26(43.3)	34(45.3)	1(5.9)
全身倦怠	12(20.0)	30(40.0)	3(17.6)
發 熱	8(13.3)	19(25.3)	3(17.6)
體重減少	5(8.3)	18(24.0)	4(23.5)
肩 痛	1(1.7)	12(16.0)	2(11.8)
哽 聲	5(8.3)	5(6.7)	
腰 痛	2(3.3)	2(2.7)	
神經痛	5(8.3)	1(1.3)	
其 他	4(6.7)	6(8.0)	2(11.8)
無 症 狀	1(1.3)		

査하여 보면 第2表와 같이 吸煙者에 絶對的으로 많으며 특히 1日 10本 以上 吸煙者에게 많다. 吸煙者는 第1群에서는 63例中 47例(70.1%), 第2群에서는 98例中 67例(68.5%)였다.

4. 職 業:

空氣의 汚染이나 塵埃가 發癌性을 有한다고도 하나 여기서는 第3表와 같이 오히려 塵埃와 關係가 적은 職業에서 肺癌을 많이 볼수 있다.

5. 初發症狀:

原發性肺癌의 初發症狀을 表示하면 第4表와 같다. 이런 症狀은 모든 呼吸器疾患에 볼 수 있는 共通된 症狀이며 어느것 하나도 肺癌에 特有한 것은 없다. 여기서 血痰 또는 咯血을 隨伴한 例는 第1群에서 30例(50.0%), 第2群에서 40例(53.3%)로서 肺癌의 半數以上에서 이 症狀을 볼 수 있었다. 따라서 高齡者에서 血痰 또는 咯血을 主訴로 할 때에는 먼저 肺癌을 凝心할 必要가 있다.

6. 罹患期間:

罹患期間은 患者自身の 自覺의 症狀을 基準으로 하였다. 第5表에 있는 바와 같이 10年前인 第1群에 있어서는 大部分이 7個月이 지나서 來院하였으나 近來의 第2群에 있어서는 發病後 3個月 以內에 더 많은 患者가 來院한 것은 그만큼 醫學의 進歩와 더불어 患者自身들도 自己 몸에 對하여 關心을 갖게 된 것이다.

7. 治 療

肺癌의 治療는 可及의 早期에 外科의 切除가 가장 効

第5表 肺癌의 罹患期間別

症例數	第1群			第2群		
	男	女	計	男	女	計
期 間						
3月未滿	4		4	35	12	47
4~6月	6	3	9	18	6	24
7~12	18	5	23	13	4	17
1~2年	19	6	25	5	1	6
2~3	2		2	2		2
3年以上				2		2
合 計	49	14	63	75	23	98

果의인 것은 論할 必要도 없거니와 最近에는 放射線治療도 發達하고 또 化學療法으로 Bleomycin, Mytomyin 등 各種 抗癌劑의 出現을 보았다. 그러나 著者の 境遇 X線療法은 第1群에서 2例와 第2群에서 4例, X線療法과 化學療法을 併用한 것은 第2群에서 2例뿐이었다. 手術에 있어서도 第1群에서는 罹患期間이 길었던 患者들도 마지막 希望으로 19例에 있어서 手術을 받았던 反面에 第2群에서는 罹患期間이 짧았는데도 手術施行은 6例뿐이었다. 이것은 患者나 家族들의 心理가 肺癌이라고 診斷을 받으면 살 수 없을 것이라고 諦念을 하고 對症療法 또는 私藥을 많이 選擇하였다.

第6表 肺癌의 治療

症例數	第1群			第2群		
	男	女	計	男	女	計
治 療						
手術施行	16	3	19	6		6
X線療法	2		2	4	3	7
化學療法						
X線療法과 化學療法				2		2

8. 轉 歸:

豫後는 大體로 第7表와 같이 入院後 3個月以內에 死亡한 數가 많아 第1群에서는 23例, 第2群에서 14例이고 診斷後 1年以上 生存者도 第1群에서 3例, 第2群에서 2例이었으나 追求調査에 따라 이 數는 좀 더 늘어날 것이다.

9. 初診時 診斷:

얼마나 많은 例에서 仔細한 檢査나 檢討가 없이 誤診이 되고 이에 따른 治療가 되었는데는 앞으로 더욱 檢討되어야 할 것이다. 初期의 肺癌을 어느程度 診斷할수 있느냐 하는 問題는 發見의 時期에 따라서도 差異가 있

第7表 肺癌의 轉歸

	第1群			第2群		
	男	女	計	男	女	計
入院 3個月內死亡	18	5	23	9	5	14
“ 6月內 “	5		5	1		1
“ 1年內 “	2		2			
1年以上 生存	1	2	3	2		2
輕快退院	3	1	4	7		7

第8表 肺癌의 初診時診斷

	第 1 群		第 2 群	
	%		%	
肺結核	25	(35.7)	28	(24.5)
肺腫瘍	17	(24.3)	35	(30.1)
肋膜炎	15	(21.4)	28	(24.5)
肺膿瘍	4	(5.7)	12	(10.5)
縱隔腫瘍	4	(5.7)	2	(1.7)
肺 炎	1	(1.4)	5	(4.3)
氣管支擴張症			2	(1.7)
其 他	6	(8.6)	2	(1.7)

第9表 肺癌의 氣管支鏡 所見

	第 1 群		第 2 群	
	%		%	
非特異의 所見(發赤, 浮腫)	14	(31.1)	19	(38.5)
直接所見 { 浸潤狹窄	18	(40.0)	19	(38.5)
腫瘍形成	11	(24.4)	9	(18.4)
異常所見無	2	(4.4)	2	(4.6)
合 計	45		49	

第10表 肺癌의 X線上所見과 氣管支鏡 所見

直接所見	第 1 群		第 2 群	
	有	無	有	無
X線所見				
浸潤型	12	6	13	12
腫瘤型	5	6	2	4
無氣肺型	6	2	6	2
肺門型	2		4	2
肋膜炎型	4	2	3	1
合 計	29	16	28	21

겠지만 當科에서 初診時 臨床所見과 X線所見만으로 肺癌이라고 診斷된 것은 第8表에서 보는 바와 같이 第1群

第11表

肺癌의 X線上所見과 病理組織學的 所見

	氣管支生檢		淋巴腺生檢		肺穿刺生檢		肋膜穿刺生檢		咯 痰		氣管支分泌物		肋 膜 液	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
浸潤型	10/5	9/10	3/7	5/3		5/2		2/0	10/10	4/19		2/11		2/2
腫瘤型	9/3	2/0	1/7	1/2		1/0			7/6	3/5		1/2		
無氣肺型	6/2	1/4	0/3	0/1					5/5	1/5		0/4		
肺門型	1/0	2/1	0/1	1/1		1/0			1/3	1/4		1/2		
肋膜炎型	2/5	1/4	4/1	1/2		2/0		5/6	1/5	1/13		0/3	1/1	9/11
合 計	28/15	15/19	8/19	8/9		9/2		7/6	24/29	10/46		4/22	1/1	11/13

* I : 第1群, II : 第2群, 陽性/陰性

第12表

肺癌의 合併症

肋膜炎	13
肺結核	9
肝 癌	3
乳 癌	2
肝硬化症	2
胃 癌	2
子宮癌	2
糖尿病	1
結核性腹膜炎	1
氣管支擴張症	1
合 計	36

에서 17例(24.3%), 第2群에서 35例(30.1%)에 不過하였다.

10. 氣管支鏡檢査:

氣管支鏡檢査가 早期診斷에 어느程度 도움이 되느냐 하는 問題를 生覺해 볼 때 第1群 45例, 第2群에서 49例의 檢査所見을 第9表에서 살펴본다. 肺癌의 氣管支鏡所見은 非特異的所見, 直接所見, 間接所見으로 區分되나 이中에서 診斷에 도움이 되는 것은 直接所見이고 著者の 症例에서 直接所見을 본 것은 第1群에서 64.4%, 第2群에서 56.9%이었으나 이들이 早期癌이라고는 斷定하기 어렵다.

11. X線上所見과 氣管支鏡所見:

X線像과 氣管支鏡所見의 關係를 第10表에서 보면 大體로 無氣肺型이 氣管支鏡으로 直接所見을 많이 볼 수 있었으나 肺野腫瘤型에서는 有所見例가 오히려 적었다. 浸潤型, 肺門型 및 肋膜炎型에서도 有所見例가 많았다.

12. 細胞 및 病理組織學的 所見:

診斷方法으로 確診을 爲하여 一般檢査外에 可能한 모

든 檢査를 試圖하였다. 細胞診斷은 다른 病理組織學的 檢査와는 달리 손쉽게 反復하여 檢査할 수 있으며 早期에서 陽性率과 確診率이 높다고는 하지만 細胞診斷이나 病理組織檢査를 判定하는데 相當한 熟練을 必要로 한다

第11表에서 보는 바와 같이 氣管支鏡檢査 生檢으로 確診된 것이 第1群에서 28例(61.5%)이나 第2群에서는 15例(44.1%)였고 scalene node biopsy에서 第1群 8例(29.6%), 第2群에서 8例(44.4%)이었다. 咯痰의 細胞學的 檢査結果는 第1群에서 24例(44.4%), 第2群에서 10例(17.6%)이었다.

13. 肺癌의 種類:

組織學的으로 證明된 34例의 種類는 epidermoid 11例, squamous cell 14例, undifferentiated 4例, adenocarcinoma 3例와 anaplastic 2例로서 squamous cell型이 絕對多數이었다.

14. 合併症:

다음 第12表와 같이 合併症으로는 肋膜炎 13例, 肺結核 9例等이었다.

IV. 考 按

肺癌의 發生이 近年의 國際的인 추세로는 急激한 增加를 나타내고 있으며 Schneider(1972)等은 特別 男性에게서 肺癌으로 因한 死亡率이 높아가고 있다고 한다. 우리나라에서 發生한 肺癌患者에 關한 疫學的考察의 結果는 金等(1965)은 年度別로 보아도 年次的으로 增加하였으며, 年齡別分布에 있어서는 peak incidence가 Gibbon 等(1953)에 依하면 60 乃至 70 代로 報告되었으나 著者の 調査는 最年少者가 男子 31歲, 女子 32歲이고 最高齡者는 男子 70歲, 女子 74이며 50代가 가장 많으며 다음이 60代, 40代順이었다. 30代에서는 男子보다 女子가 多少 많다.

性別分布는 Christiansen(1962)에 依하면 男女間의 發生한 比는 8:1, Iceland의 Thorarinsson(1967)은 2:1, 韓國에서는 金等(1962)은 5.8:1, 金等(1965)은 4.2:1, Choi(1967)는 3.5:1이고 著者는 3.3:1이었다.

喫煙과 肺癌發生과의 關係를 보면 美國에 있어서는 肺癌을 發生시키는 要因으로 喫煙에 對하여 贊反으로 論難의 焦點을 이루고 있다. 堂野前(1960)는 喫煙者와 非喫煙者와의 比는 67.9%:32.1%, Carpenter(1968)는 肺癌患者 36例中에서 喫煙者가 32例이었고, 金等(1965)은 喫煙者에 많으나 喫煙量과는 關係가 없다고 하였고, Krohn(1961)은 喫煙과 別關係가 없다고 하고, Schn-eiderman(1972)는 肺癌의 死亡率은 喫煙者群에서 더 높다고 하였으며, Ochsner(1968)는 epidermoid Ca.의 原因은 煙草라고, 또 Thorarinsson(1967)은 Squamous cell Ca.의 69.6%가 過量喫煙者이었다고 報告하였다. 著者의 調査로는 1日喫煙量 10~19本이 喫煙者의 43.8%로 全體肺癌患者의 31.0%이다.

職業分布는 農業이 首位를 차지하며 空氣의 汚染이나 塵埃가 發癌性을 가지고 있다고도 말하나 여기서는 오히려 塵埃가 比較的 적다고 生覺되는 職業에 肺癌이 많이 나타났다.

初發症法으로 血痰 또는 咯血은 Jackson 및 Diamond는 非結核性疾患 436例中 氣管支擴張症 138例, 肺癌이 82例이었고, 堂野前(1960)는 肺癌患者의 25.3%, 金(1962)은 50%, 著者의 境遇는 51.7%이었다.

肺癌으로 診斷받기까지의 罹患期間을 보면 金等(1965)은 平均 9.4個月에 比하여 著者의 調査는 6.8個月이다.

初診時 診斷은 堂野前(1960)는 肺癌 83例中 初診으로 肺癌으로 診斷받은 것은 30.1%이고 約半數는 肺結核으로 診斷되므로서 X線像만으로 本症을 早期 診斷하는 것은 어렵다고 생각된다. 金等(1962)은 肺結核 36.1%, 肺癌 8.5%, 正常으로 21.1%이나 著者는 肺結核 30.1%, 肺癌 27.2% 肋膜炎 23.0%였다.

細胞診斷成績은 或者는 50% 以下の 또는 85% 以上の 陽性率이 報告되어있으나 여기서는 第1群에서는 22.1%, 第2群에서는 17.9%라는 低率이었다.

腫瘍型은 Thorarinsson(1967)은 squamous cell 19.8%, undifferentiated 34.5%, adeno Ca. 7.8%이고 Choi(1967)는 squamous cell 57%, anaplastic 24%, adeno Ca. 11%, undifferentiated 8%, 또한 Carpenter(1968)는 squamous cell 43.8%, undifferentiated 31.3%, epidermoid cell 12.5%, adeno Ca. 9.3%, anaplastic 3.1%이나 著者는 squamous cell 41.2%, epide-

rmoid cell 32.4%, undifferentiated 11.8%, adeno Ca. 8.8%, anaplastic 5.8%이었다.

合併症으로는 Shah-Mirany(1966)는 肺癌患者 105例中肺結核이 54例, Bonchek(1971)는 肺癌 98例中에서 肺結核併發 28例, 五味(1970)는 肺癌과 肺結核의 合併例은 近年 重症肺結核患者의 壽命의 延長, 高齡肺結核患者의 増加에 따라 漸次 増加하는 傾向이 있다고 하였으며 著者는 肋膜炎 13例 肺結核 9例等を 보았다.

診斷方法으로 Moskowitz(1971)는 bronchial brush-biopsy의 새方法으로 30例中 24例에서 確診하고 Bonchek(1971)는 Tuberculin test 와 serum protein electrophoresis로 結核患者에게 併發된 肺癌을 確診하였다.

V. 結 論

1958年 11月 國立醫療院 開院當時부터 1961년까지와 1967년부터 1972년까지 國立醫療院 胸廓內科에 入院하였던 肺癌患者 161例(第1群 63例 第2群 98例)에 對하여 臨床的으로 觀察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 年齡別로 男女 共히 50代가 가장 많았으며 性別로 보면 男女比는 3.3:1이었다.

2. 喫煙者는 非喫煙者보다 約 2.4倍 더 肺癌에 걸렸으며 喫煙量은 1日 10~19本群이 가장 많았다.

3. 職業的으로는 肉體의 勞力이 過重한 사람 即 農業과 勞動에 많았으나 空氣의 汚染이나 塵埃와 關係가 적은 職業에 많았다.

4. 初發症狀은 大多數에서 咳嗽가 있었으며 다음으로 胸痛, 呼吸困難, 血痰도 過半數以上이었다.

5. 罹患期間別은 第1群에서는 1年以上 2年未滿이 第一 많았으나 第2群에서는 3個月未滿이 가장 많았고 患者가 發病하여 診斷 받기까지의 平均期間이 6.8個月이다.

6. 治療는 手術施行 25例, X線療法 9例, X線療法와 化學療法 併用이 2例이다.

7. 轉歸는 入院後 3個月以內에 死亡한 것이 37例, 1年以上生存도 5例이다.

8. 初診時診斷은 肺結核이 30.1%, 肺癌이 27.2%, 肋膜炎이 22.9%, 肺膿瘍이 8.1%이었다.

9. 氣管支鏡所見은 直接所見이 60.6%이고 異常所見이 없는것도 4.5%이었다.

10. 細胞學的 檢查結果는 陽性率이 31.0%이고 病理組織學的의 所見은 氣管支鏡檢查生檢에서 54.6%, Scalane node biopsy 所見은 37.0%이었다.

11. 腫瘍型은 squamous cell 型이 絕對多數이다.

References

1. Boncheck, L. : *Diagnosis of lung cancer in tuberculous patients*, *Chest* 60:256, 1971
2. Carpenter, C. M. and Le Clair, R. A. : *Tobacco mosaic virus and pulmonary diseases of human*, *Dis. Chest* 54:42, 1968
3. Choi, D. H., Sung, N. J. et al: *Primary lung cancer*, *Med. Bull. N. M. C.* 7:21, 1967
4. Christiansen, K. H. and Smit, D. E. : *Bronchogenic carcinoma*. *J. Thorac. Surg.* 43:267, 1962
5. 堂野前維摩郷 : 肺癌の 診断と治療, 48:2001, 1960
6. Gibbon, J. H., Allbritten, F. F. et al: *Carcinoma of the lung*, *Ann. Surg.* 138:489, 1953
7. 五味五郎 : 肺癌, 日本醫事新報 2397:15, 1970
8. 金敬植 : 肺癌에 對한 臨床的 觀察, 結核 12:82, 1962
9. 金炳基, 柳會性 : 原發性肺癌에 對한 臨床觀察, 結核 12:87, 1962
10. 金永旭, 朴重成 : 肺癌의 疫學的考察, 結核 및 呼吸器疾患 21:69, 1965
11. Krohn, J. et al: *Primary lung cancer*, *Med. Bull. N. M. C.* 2:54, 1961
12. Moskowitz, M. et al: *Brush biopsy of the lung*, *Chest* 59:648, 1971
13. Ochsner, A. : *Relationship of smoking to carcinoma*, *Dis. Chest* 54:23, 1968
14. Schneiderman, M. A. and Levin, D. L. : *Trends in lung cancer*, *Cancer* 30:1320, 1972
15. Shah-Miran, J., Reimann, A. F. et al: *Coexisting bronchogenic carcinoma and tuberculosis*, *Dis. Chest* 50:258, 1966
16. Snider, G. L. et al: *Bronchogenic carcinoma and pulmonary tuberculosis*, *Dis. Chest* 55:181, 1969
1. Thorarinsson, H. et al: *Carcinoma of the lung in Iceland*, *Dis. Chest* 52:754, 1967

(本研究는 國立醫療院 研究費와 그一部는 大韓結核學會 研究補助費로 이루어졌음).