<종 설>

마 이 코 플 라 스 마 폐 염

경희대학교 의과대학 내과학교실

이 찬 세

—Abstract—

Mycoplasmal Pneumonia

Chan Se Lee, M.D.

The author has made a review on the Mycoplasmal Pneumonia in general and presented four cases of various types with sputum culture positive.

The first case was 39 year old male, showed a relapse with a new lesion development on right cardiophrenic region after a transient initial pneumonic infiltration on left hilar region several days ago (Fig 1)

The second case was 37 year old female, patch type pneumonic shadow was located on right infraclavicular region and much more confused with tuberculosis. However it was remarkably cleared in only 3 days of admission treatment.

The third case was 20 year old, female. The lesion was located on right upper lung field. This was found on University entrance physical examination without subjective complaints and much cleared in 2 days (Fig 2)

The fourth case was 17 year old, female, the disease was left sided pleurisy with small amount fluid and followed for one month with no remarkable change of the X-ray picture although the subjective complaints subsides after several days treatment.

Mycoplasma 에 대하여

과거에는 급성폐염 이라고 하면 폐염구균성 대염성폐염이 대표적인 것이라고 인정되었었고 이와 대조적인 것으로는 기타세균에 의해서 생기는 기관지폐염뿐인 것으로 구분했었다.

그러나 1942년에 Dingle 과 Finland 는 이것들과 또 다른 폐염으로서 세균성이 아닌것이 있다는 점을 밝히고 이것을 Primary Atypical Pneumonia 라고 했다. 그리고 이것은 Cold hemagglutination test 가 양성인

으로 일명 Cold hemagglutination positive pneumonia 라고도 했다.

그후 1944년에는 Eaton 에 의해서 그병원체가 virus 와 비슷하게 여과성이 있다는 것이 증명되었으나 그 정체의 소속이 불확실 해서 우선 Eaton agent 라고 가칭되었고 또 그 병을 Eaton agent pneumonia 라고도 했다. 몇해후인 1961년에 Chanock 는 이것이 소의 Pleuropneumonia 를 일으키는 병원체인 PPLO(Pleuropneumonia like organism)라고 했으나 그후 곧 1962년에는 이것이 *Mycoplasma Pneumoniae* 라고 개칭되었고 1965년의 Jensen 은 vaccine 을 제조해서 예방에 이용

할것을 제외했다.

Mycoplasma 는 *Schizomycetes* 강(class)에 속하는 *Mycoplasmatales* 목(Order)중에 *Mycoplasmataceae*과(family)에 있는 한개의 genus(속)이나 이것은 15종(species)로 분류되고 있다. Mycoplasma 는 그크기가 150 μ (밀리마이크론)가량으로 myxovirus 와 비슷할정도로 미소여과성이 있고 지금까지 알려진 가장 작은 미생물이다(The smallest known free-living microorganism). 보통현미경으로는 그 집락(colony)만을 볼수 있고 전자현미경 이래야 그 개체를 확인 할수 있다. 이의 성질은 세균과 바이러스의 중간이라고 할수 있는데 즉 숙주세포 외에서 증식이 가능하고 분열증식을 하며 RNA 와 DNA 를 소유하며 tetracycline 과 같은 항생제에 민감한점 등은 세균과 흡사하나 그형태가 변화성이 많고 매우 작고 고정된 세포막이 없는 것은 바이러스와 흡사하다. 세균 중에도 L형(form)에서는 세포막이 없으므로 Mycoplasma 하고 혼동되기 쉬우나 그 유래가 근본적으로 다른 것이 물론이다.

Mycoplasma 중에서 가장 문제가 되는 것은 호흡기 질환을 일으키고 primary atypical pneumonia 의 병원체인 *M. pneumoniae* 이지만 이 이외에도 7가지를 들수가 있다. 간략하게 표시해보면 다음과 같다.

〈Human Mycoplasma/Cough〉	
Species	Usual Site of Occurrence
<i>M. pneumoniae</i>	Respiratory tract
<i>M. salivarium</i>	} Oropharynx
<i>M. orale</i> 1.....	
<i>M. orale</i> 2.....	
<i>M. orale</i> 3.....	
<i>M. fermentans</i>	Oropharynx(Urogenital)
<i>M. hominis</i>	} Urogenital
※ T-mycoplasma ...	

※ 다른 Mycoplasma 의 colony 는 대략 1,000 μ (직경)인데 이것은 50 μ 밖에 안되므로 작다는 tiny 에서 T 를 땀.

Jones 에 의하면 *M. pneumoniae* 가 혈액에 발견된 일이 없고 *M. salivarium* 과 *Orale* 1는 건강인 80%에 발견될 만큼 흔하며 *M. fermentans* 는 인후에서 발견된 일이 없고 *M. hominis* 는 건강인 oropharynx 에서 5%, T-mycoplasma 도 oropharynx 에서 더러 발견된다고 해서 이 표에서 보는 것과 약간 다른 발표를 했다. 이것은 결국 Mycoplasma 가 상당히 광범위하게 퍼져있다는 것을 의미한다고 하겠으나 임상적으로 중요시되는

것은 *M. Pneumoniae* 라는 점에는 차이가 없다.

최근의 폐염들의 양상과 Mycoplasma Pneumoniae

1971년에 발표된 Fekety 의 논문에서는 폐염구균성 폐염이 전체 폐염의 62%나 된다고 했지만 같은 해에 Jones 의 논문에서는 최근 30년 동안에 호흡기질환 양상의 가장 큰 변화는 세균성질환이 감소되고 바이러스성질환이 증가했다는 것이라고 지적했으며 Foy(1970)는 모든 폐염의 20%가 Mycoplasma 폐염이라고 했다. 외국뿐 아니라 우리를 대부분도 과거와 같이 전형적인 폐염구균성 대염성 급성폐염을 흔히 볼수없게 됐다는데는 의견이 합치된다고 할수 있을 것이다. 본 경희대학 병원에서의 경험에서도 지난해(1975)에 입원치료한 급성폐염환자 31명중에서 폐염구균성은 2예뿐으로 Mycoplasma 에 의한 폐염추정의 수효와 똑 같았다.

급성폐염의 원인별 분류(1975년도 경희의대병원 입원환자)

※ Mycoplasma 배양은 1975년 9월부터 시작했음.

객담배양 세균	환자 수효
<i>a-streptococcus</i>	6
Undetermined	6
<i>Staphylococcus aureus</i>	4
<i>Klebsiella</i>	2
<i>Pneumococcus</i>	2
<i>Mycoplasma</i>	2
<i>E. Coli</i>	2
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1
Tuberculosis (Pneumonic)	4
(miliary).....	2
Total	31

Mycoplasma 폐염과 atypical pneumonia로 불리우게되는 이유의 하나는 이병의 증상이 매우 다양해서 아주 심한 급성폐염에서 부터 아주 경한 감기모양으로 아무도 모르게 지내는 것까지 있기 때문이다. 따라서 그 발생빈도를 알아보는게 매우 어려우나 Cate 는 감수성이 있는 사람은 30명중에 1명 꼴로 이 폐염을 일으킨다고 했고 대개는 한집안에서 어린애가 먼저 앓기 시작해서 온 집안식구가 다 앓게되는 일이 많다는 점 그리고 집단생활을 하는 젊은 군인들에서는 대유행을 하는 일이 있으며 또 이것이 별로 계절적 차이가 없다는 점등으로 봐서 세균성폐염 보다는 훨씬 많고 viral pneumonia

보다 별로 적지 않을 것으로 추정된다.

Knight는 *Mycoplasma* 폐염의 빈도가 미국 Seattle에서 인구 1000명당 1년에 1.3이고 모든 종류의 폐염의 약 10%라고 했고 Jansson(1964)은 Eaton agent 보체 반응 양성 폐염이 16세 이하에선 20%, 성인에선 13%라고 했다. Grayston(1965)은 폐염에서 *M. pneumoniae*를 분리검출 한것이 20%인데 이중의 대부분은 15-25세 연령층이었다고 했다.

1964년 Reimann의 논문에 인용한 Hilleman의 도표는 1953년부터 1960년까지의 재료이므로 상당한 연대적 차이가 나겠지만 아직도 폐염의 양상의 변화를 알아보는 데 매우 좋은 통계적 인상을 제시하는 것이라고 생각되므로 여기에 소개한다. 그리고 그는 또 모든 급성감염성 호흡기질환의 95%가 virus와 *Mycoplasma*에 의한다고 했는데 이렇게 따져보면 급성폐염의 원인역시도 이것들이 세균성보다도 더 많을 지도 모른다는 추적을 자아내게 한다고 할수 있다.

Composition of Causative Agent (1953-60)
Hilleman/Reimann

*Mycoplasma pneumoniae*의 빈도와 관련해서 또 생각해야 할 문제는 여태까지의 primary atypical pneumonia라고 하는 병증에서 *Mycoplasma pneumoniae*가 원인 인것이 인정되었다는 것은 확실하지만 모든 Primary atypical pneumonia가 다 *Mycoplasma*에 의한 것이라고는 할수가 없을 것이고 바이러스를 비롯해서

서 또 다른 원인들이 있을 것은 물론일 것이다.

Knight가 Pneumonia due to mycoplasma라는 제목에서 이의 synonym으로서 primary atypical pneumonia, Eaton's agent pneumonia, 그리고 cold agglutinin positive pneumonia까지 넣은 것은 좋으나 virus pneumonia까지를 포함시킨 것은 *Mycoplasma*를 virus라고 오해한 과거의 오류를 되새겨보는 것이라고 할수 있겠지만 이것은 따로 구분해야 할 것이라고 생각된다.

Mycoplasma 폐염의 특성과 임상증상

*Mycoplasma Pneumoniae*의 감염증으로서 나타나는 호흡기증상은 매우 다양하고 subclinical case도 많은것인데 그중에서도 폐염을 일으킨 것은 이론적으로 봐서 좀 중중에 속할것 같지만 사실에 있어서는 또 역시 매우 그 병태가 다양하고 이렇게 다양한것 자체가 이병의 특성이라고도 말할 수가 있다.

발병 역시도 급격할수도 있고 서서할수도 있는데 잠복기는 대체로 1-3주일이라고 인정된다.

처음 증상은 보통감기나 비슷한 경우가 많으나 한가지 특징은 마른 기침이 심하게 날수가 있다는 것이라고 하겠다. 후에도 합병증이 없는 한 맑은 점액의 가래가 좀 있을뿐이며 혹은 혈담이 섞이는 것도 좀 특이한데 이러한 것들은 보통세균성감염과는 다르지만 바이러스성 질환과는 매우 흡사한 점이 많다고 할수있다.

비교적 심한 경우 특히 소아들에 있어서는 hemorrhagic bullous myringitis를 합병하는 일이 있고 이것은 마이코플라스마 폐염의 진단에 있어서 매우 중요한 참고가 된다고는 하지만 그 발생빈도는 5-10% 뿐이다.

인후염을 병발하는 것은 약 30%가량이고 입가의 herpes가 나타나는 것은 3-5% 뿐이다.

체온은 아주 정상적인 경우도 있지만 대개는 37-38°C 정도인 경우가 많고 39.5°C 이상의 고열을 내는 일은 드물다. 흉막염을 병발하는 경우는 10-15%나 되고 피부에 발진(maculopapular 혹은 erythematous)을 동반하는 것이 15%가량이나 된다고 하는데 여기에 대해서 Jones는 이중의 몇 %는 치료약(특히 진통해열제?)에 의한 것일것이라고 했다.

엑스선사진 소견 역시 아주 고유한 변화라고 할수 있는 것은 없으나. 폐문부에서 퍼져나가는 침윤상 혹은 폐하야부에 불규칙한 침윤상을 보는 경우가 많은 것이 보통 세균성질환과는 좀 다르지만 이러한 것들은 바이러스

성 폐염에서도 흔히 보는 것이다.

대부분에 경우는 한쪽폐에 적은 침윤상을 보였다가 수일 내지 2-3주일 안에 완전 소실되는데 드물게는 마치 결핵성과 같이 수주일 이상 계속되는 수도 있으나 공동형성을 하는 일은 없다. 특히 그 위치가 폐의 상부 혹은 쇄골부일 경우나 또는 최근에 폐결핵치료를 받은 일이 있는 환자 일때는 결핵과의 감별진단이 더욱 어려워진다. 이러한 경우에 저자는 우선 결핵치료와 TM을 처방하고 약2주일 후에 다시 엑스선 사진을 찍어보도록 하는데 결핵성이 아닌경우엔 그 음영이 현저히 감소되던지 완전 소실되는 것이 보통이기 때문에 쉽게 감별될 수가 있다.

이렇게 일과성인 폐염상의 몇 %가 *Mycoplasma*성 인지는 아직 구명하지 못하였으나 하여간 우리나라와 같이 결핵이 많은 나라에서도 일과성인 폐염이 결핵성보다 2배이상으로 많다는 것만은 틀림없는 사실이라고 저자는 믿고 있다. (이찬세, 1966)

Jones에 의하면 속립성심포성음영을 나타낼 수도 있다고 하는데 이러한 경우에도 tetracycline에 대해서 치유가 잘되고 한두주일 안에 음영이 소실되는지는 알 수가 없다.

혈액검사에서는 백혈구수가 약간 증가 할수 있으나 대체로 정상적이고 혈구침강속도는 보통 약간 가속된다.

진 단

확진을 위해서는 객담중에서 *Mycoplasma pneumoniae*를 배양검출 해야 하지만 아직까지도 이것이 보급되지 못했고 또 이 배양에는 1-3주일이 걸리므로 치료전 진단에는 도움을 못준다.

그러므로 임상에서는 형광항체반응검사법이 매우 필요한데도 불구하고 아직도 손쉽게 이용할 단계에 이르지 못하고 있다. 임상적으로 가장 흔히 이용되는 것은 보체결합반응이고 여기에 겹드려서 한성응집반응을 병용하는데 이것들 역시 반응이 양성으로 나타나기 위해서는 1-2주일 이상의 기간이 필요하고 또 현재의 질환을 확인하기 위해서는 1-2주일후에 재검을 해서 4배 이상의 상승을 인정해야 된다는 난점이 있다.

그러나 보통으로는 보체결합반응이 80배 이상이고 임상증상이 확실하면 진단을 거의 확정할 수가 있다. 그리고 이것은 *Mycoplasma* 폐염에서 50-80% 양성으로 나타난다고 한다(Jones). 한성응집반응은 50%가량의 양성을 뿐이고 또 비특이성반응 이니까 전자와 동시에 해서 32배 이상으로 나타날때만 보조적 역할을 할수가 있다.

그러나 이것이 virus 폐염이나 Q-fever 나 Psittacosis에서는 과히 높은 수치가 나타나지 않으므로 256배 이상일 경우는 *Mycoplasma* 폐염의 진단에 확실한 증거가 될수 있다고 한다. 또 이것은 이병의 경증과 병행되며 특히 hemolysin에 의한 β -hemolysis와 직접 관계가 있다고 인정되고 있다. 이 이외에 growth inhibition, indirect hemagglutination, hemagglutination inhibition 검사법 등이 진단에 이용될수 있으며 이것들을 병용한다면 95% 가량의 확진율이 있다고 한다.

*Mycoplasma pneumoniae*의 배양을 위해서는 신선한 객담이나, pharyngeal swab에 의한 재료를 사용할 수 있으며 swab 한것은 건조하지 않도록 곧 바이러스재료나 마찬가지로 0.2% bovine albumin in Hanks solution을 1-2ml 주입한 병속에 잠가서 운반해야 하며 즉시 배양을 못할 때는 4°C에 10여시간 보존할 수 있다. 분리 배양에는 교모엑스과 혈청 혹은 난황을 첨가한 Difco의 PPLO Agar에 다가 잡균제거를 위해서 페니실린을 가한 고형평판배지 혹은 Difco의 PPLO Broth 액체배지를 사용해서 37°C에 보관한다. 1-3주 이상 배양하는 도중에 때때로 집락형성 여부를 검사하고 평판배지에 생긴 집락은 과립양이고 직경이 약 1000 μ 이니까 보통현미경으로 그대로 볼수가 있다.

치료와 예후

현재까지는 치료전 확진이 불가능하므로 결국 이의 치료는 매우 불안하다. 그러니까 검사용 객담과 혈청을 채취하고는 짐작으로 진단을 가정하고 치료를 개시하는 수밖에 없다.

항생제로서 tetracycline과 erythromycin은 매우 효과 적이나 아직도 그 작용기전에 대해서는 잘 모른다. 그러나 대체로 발육저지 작용이 있을 뿐이라고 추측되므로 임상증상이 완전소실 될때까지 보통 2주일 이상 계속해야 한다.

이병은 재발이 흔하지만 대개는 치료여하에 불구하고 완전회복이 가능하다. 상당한 신원이 있는 환자도 치료후 2-3일 혹은 발병후 2주일 가량이면 평온으로 되고 엑스선사진 소견도 정상으로 되는 것이 보통이지만 기침과 쇄약감은 수주일간 계속되는 경우도 있다. 사망율은 0.1% 이하이다. (Jones)

마이코플라스마 폐염에 병발하는 중요한 비호흡기성 질환으로서 첫째로 꼽아야 할것은 용혈성질환이다. 이 병에서 한성응집반응이 잘 일어난다는 점에서 짐작되는

일이지만 hemolysin 에 의해서 β -hemolysis 가 잘 일어나게 되는데 소량의 용혈은 이 병을 앓는 환자의 전부에서라고 할수있을 터이지만 임상적으로 주목될수 있는 경우는 약 5%이고 이러한 일은 이병의 경증과 직접적으로 관련된다고 할수 있으므로 예후에 대해서 큰 관계를 미치는 것이다.

그다음은 중추신경계의 질환으로서 aseptic meningitis, encephalomyelitis, ascending polyneuritis 등을 볼수 있는데 이의 빈도는 아주 드물지만 이것이 발생되면 그 예후가 아주 어려워지므로 중요시되지 않을 수가 없다.

그다음은 피부질환인데 여러가지의 경한 발진이 흔하게 나타나는 것은 별 문제가 안되지만 드물기는 하나 erythema multiforme 이나 심지어는 Stevens-Johnson Syndrome 을 일으켜서 사망한 예도 보고되어 있다.

증 례

본 경희의대에서는 우리나라에서는 처음으로 최근에 Mycoplasma 의 분리배양이 가능하게 되어서 현재까지 10여례의 환자 객담중에서 *Mycoplasma pneumoniae* 라고 생각되는 병원체를 인정할 수가 있었는데 아직도 그 정체에 대해서 좀더 규명할 점이 있기는하나 대략적으로 그 병들이 Mycoplasma Pneumonia 라고 진단했으므로 그중의 몇예를 여기에 제시해서 동료들의 고견은 물론고자한다.

증례 1. 이 ○호, 39세 남자 1976년 1월 초(당시 인플루엔자 유행)에 기침과 고열이 약 10일간 계속되여서 본병원에서 5일간 치료후 경쾌되원했다가 3일후에 다시 열이 나서 또 5일간 입원치료 하고 경쾌되원했다. 처음 발병은 보통 감기 비슷했고 기침은 꽤 심했으나 가래는 별로 없었다. 처음 입원때나 둘째번 입원때나 청타진상 폐에는 소견이 없었고 백혈구수는 약 1만가량 이었으며 한성응집반응은 약 1주일 간격으로 두번한 것이 모두 1:4로 음성이었다. 초입원시 체온은 38.5°C 정도, 재입원시는 37.5°C 정도가 2-3일 계속했다. 초진시에 한 객담검사에서 Mycoplasma 가 양성으로 배양되었기 때문에 초입원 시에는 ampicillin 과 kanamycin 을 사용했던 것을 재입원시에는 tetracyclin 으로 치료를 하게되었다.

폐엑스선 사진소견은 폐문부에서 퍼져나가는 침윤상으로서 말하자면 전형적인 Mycoplasma 폐염상이라고 할수 있었다.

이때에 특기할 것은 신체증상은 퇴원후에 재발되었는데 사진소견은 그 동안 계속적으로 호전되는것 같았

으며 초진단후 10일 즉 재입원 치료후 3일에는 그 병변은 완전히 소실되어 있었으며 재치료후에 신체증상은 호전되었는데 엑스선사진에선 반대쪽 폐문하부에 약간의 불규칙한 침윤상이 나타났다는 점이다.

이예는 단시일내에 다른 폐에 재발된 Mycoplasma 폐염이라고 인정된다. 환자는 신체증상이 없으므로 곧 퇴원하고 말았다. (그림 1)

그림 1. 증례 1 이○호 39세 남자

증례 2. 이 ○자 37세 여자 역시 1976년 1월초에(이 당시 인플루엔자가 유행했고 폐염환자가 많았음)고열, 흉통, 기침, 혈담을 주소로 하고 입원했다. 발병은 보통감기 같았고 약 20일후 입원했다. 입원초진찰시 폐의 소견을 없었으며 백혈구수는 12,600이었고 체온 39°C 가량, 인데 폐엑스선사진에서 우측 폐상부 쇄골하부에 침윤상이 보였기 때문에 결핵을 의심하고 치료를 시작하면서 ampicillin 도 병용했다. 객담검사는 도말과 배양 3회 모두 결핵균은 음성이었다고 일반세균검사에서 특기할 것이 없었는데 Mycoplasma 가 두번 배양 양성이었으므로 이것이 그 원인일것이라고 추정했다. 한성응집반응은 한번한 것이 1:4로 음성이었다. 환자는 입원 3일후에 일반증상이 좋아졌을 뿐아니라 엑스선사진 소견도 현저히 경쾌되여서 퇴원했는데 그후 소식은 모른다. 이예에서 특기 할 것은 병변의 위치가 마치 결핵을 의심하기 좋을 정도이었다는 점이라고 하겠다. 결핵이 아니었다는 것은 병원체의 검사결과 뿐아니라 단지 3일만에 현저한 경쾌를 보았다는 것으로도 의심할 여지가 없을 것이다.

증례 3. 한 ○염 20세 여자 이 환자는 1976년 2월에 학교입학 신체검사 시에 폐엑스선사진에서 우측중상부에 폐염양의 이상소견이 발견되었는데 수일전에 경한감기를 알았다는 것이외에는 아무 증상이 없고 진찰소견에도 이상이 없었다.

한성응집반응은 1:4로 음성이었으나 객담중결핵균검사는 도말과 배양 1회한 것이 음성이었는데 객담배양에서 *Mycoplasma* 가 인정되었다.

이에에서 특기할 일은 2일후에 폐엑스선사진에서 그 음영이 거의 다 소실되었다는 점이다. (그림 2)

그림 2. 증례 3 한 ○염 20세 여자

증례 4. 이 ○옥 17세 여자 역시 1976년 2월에 기침 가래, 좌측흉통 그리고 38도가량의 열을 주소로 하고 발병 후 약 2주에 본원에 입원해서 5일간 치료후 신체 증상이 경쾌되어서 퇴원하고 그후 1개월만에 외래로 와서 진찰을 받았는데 자각증상은 없었으나 엑스선사진 소견은 여전히였다. 엑스선사진에서는 좌측의 경한 삼출성홍막염의 양상을 보였으며 임상적으로도 결핵성홍막염을 의심하지 않을 수가 없어서 결핵치료로서 ethambutol, isoniazid, streptomycin 을 계속했다.

발병은 역시 일반 감기 비슷했고 입원초에 검사한 백혈구수는 4,100이었다. 결핵균검사에서 객담의 도말과 배양 3회, 홍막액 배양 1회를 했는데 모든 음성으로 보고되었으며 *Mycoplasma* 는 배양 2회 모두 양성이었다. 이에에서 특기할것은 검사결과를 갖고 *Mycoplasma pneumoniae* 에 의한 홍막염이라고 한다면 결핵치료의 효과를 기대할 수는 없을 것이고 *Mycoplasma* 의 배양 기간이 길어서 조기치료가 불가능했던 것은 사실이나 치료를 안한 폐염성 변화는 비교적 단시일에 소실될수도 있었는데 홍막염의 변화는 오래동안 계속되는 것인 지하는 점이라고 하겠다.

※ 이상의 예들이 모두 미비한 점들이 많으나 금후 연구를 계속해서 보충할 계획이다.

※ 「이연구는 경희대학교 연구비에 의해서 이루어졌으며 본교 미생물학교실의 김찬수교수의 지도협조와 마이코플라스마배양에 있어서 직접 수고해주신 이금자여사에게 충심으로 사의를 표합니다」

참 고 문 헌

- Andrews, C.E. et al: An Epidemic of Respiratory Infection due to *M. pneumoniae* in a Civilian Population. *Amer. Rev. Resp. Dis.* **96**:973, 1967.
- Alender, al: Pneumonia due to *M. pneumoniae*, It's Incidence in the Membership of a Cooperative Medical group. *New. Engl. J. Med.*, **275**:131. 1966
- Cate, T.R.: *Mycoplasma*. In *Gradwohl's Clinical Laboratory Methods and Diagnosis*, 7th Ed., 1970. pp 1383-1390.
- Chanock, R.M. et al: Growth on Artificial Medium of Agent Associated with Atypical Pneumonia and It's Identification as a pleuropneumonia Like Organism. *Proc. Nat. Acad. Sc.*, **48**:41. 1962
- Chanock, R.M.: *Mycoplasma Infection of man* *New Engl. J. Med.*, **273**:1199. 1965.
- Cherry, J.D. et al.: A Search for *Mycoplasma* Infections in Patients with chronic Bronchitis, *Thorax (Engl)* **26**:62. 1971
- Chester, A. et al.: *Mycoplasma Pneumonia* with Bilateral Pleural Effusion. *Amer. Rev. Resp. Dis.*, **112**:451, 1975
- Couch, R.B.: *Mycoplasmal Disease*, In Beeson-McDermott, *Textbook of Medicine* 14th Ed. Philadelphia:W.B. Saunders. pp. 271-273. 1975,
- Dingle & Finland/Beeson-McDermott, Ibid.
- Fekety Jr., F.R. et al: Bacteria, Virus, *Mycoplasma* in acute Pneumonia in Adults. *Amer. Rev. Resp. Dis.*, **104**:499. 1971
- Fine, N.L. et al: Frequency of Pleural Effusion in *Mycoplasma* and Viral Pneumonia. *New Engl. J. Med.*, **283**:790, 1970.
- Forsyth, B.R. et al: Etiology of Primary Atypical Pneumonia in a Military population. *JAMA*, **191**:92. 1965
- Foy, H.M. et al: Epidemiology of *Mycoplasma*

- Pneumonia Infection in Family, *JAMA*, **197**:857, 1966.
- Foy, H.M. et al: Mycoplasma Pneumonia in a City, *JAMA*. **214**:1666. 1970
- George, R.B., et al: Roentgenographic appearance of Viral and Mycoplasma Pneumonias *Am. Rev. Resp. Dis.*, (abstract)**96**:164, 1967
- Grayston, J.T. et al: *Mycoplasma Pneumoniae* Infections, Clinical and Epidemiologic Studies, *JAMA*, **191**:368. 1965
- Griffin, J. et al: Association of *Mycoplasma pneumoniae* Infection with Primary Atypical pneumonia, *Amer. Rev. Resp. Dis.*, **100**:206, 1969
- Jansson, E. et al: Studies on Eaton PPLO Pneumonia, *Brit. Med. J.*, **1**:142, 1964
- Jensen, K.E. et al: An Inactivated Mycoplasma Pneumonia Vaccine. *JAMA*. **194**:248, 1965
- Jones, M.C.: Mycoplasma Infection of the Respiratory Tract, *BTTA Review* **1**:1, 1971.
- Kenny, E.R., et al: *Mycoplasma pneumoniae* Infection, *JAMA*. **191**:369, 1965.
- Knight, V.: Pneumonia caused by *Mycoplasma pneumoniae*. In Harrison's *Principles of Internal Medicine*. 7th Ed. New York: McGraw-Hill, pp. 936-938, 1974.
- 이찬세: 경증폐결핵 초진단시에 있어서 폐염과의 감별 진단. 결핵 및 호흡기질환, **13**(1):89, 1966.
- Reiman, H.A.: Viral and Mycoplasmal Pneumonia, Prevention and Treatment, *Dis. Chest*, **46**:158. 1964
- Rytel, M.W.: Primary Atypical Pneumonia, Current Concepts. *Am. J. Med. Sci.*, **247**:84, 1967.
- Pathogenic Mycoplasma*, Ciba Foundation Symposium. 1972
- 北本: ウイル스性 及び 마이코플라즈마性 肺炎, 日本内科学會 宿題報告 1967.
- 佐佐木: 마이코플라즈마, 講談社 サイエンス・フィク, 日本, 1974-2.
- 富山: 마이코플라즈마, 臨床検査, 日本醫學書院. 1975-11-15.