疫学的 模型에 依한 韓国の 結核問題에 関한 考察 [1]

大韓結核協會 結核研究院

陳 炳 洵

= Abstract =

Tuberculosis Problem Analysis by Epidemiological Simulation Model in Korea [I]

Byoung Won Jin, M. D., M. P. H.

Institute of Tuberculosis, Korean National Tuberculosis Association

Present and appropriate epidemiological information is indispensable for the establishment and accomplishment of effective National Tuberculosis Control Programme. An attempt is made to estimate the time trend of tuberculosis epidemiology and dynamics of epidemiological tuberculosis problems reduction through National Tuberculosis Control Programme for 12 years from 1965 to 1977, by applying Y. Azuma's simple epidemiological simulation model.

Those results are as follows:

1. Prevalence rate of infectious cases showed 0.798% in 1965 and 0.534% in 1977 among total population, which means 32.3% of reduction rate comparing with that of 1965.
2. Tuberculosis incidence rate could be estimated 0.1473% in 1965 and 0.1345% in 1977, which means 8.7% of reduction rate comparing with incidence in 1965.
3. Tuberculosis infection rate showed 47.89% in 1965 and 45.38% in 1977, which means 9.0% of reduction rate comparing with that of 1965.
4. Tuberculosis death rate could be estimated 110.4 in 1965 and 59.9 in 1977 per 100,000 of population which means 45.7% of reduction rate comparing with that of 1965.
5. Work-load during 12 years from 1965 to 1977 under the National Tuberculosis Control programme could be estimated 12,100,000 of total number of BCG vaccination and 763,882 of the total number of patient treatment years. By application of BCG vaccination and case management under the National Tuberculosis Control Programme, the number of patient reduced was 344,440 or 12.85% of patient treatment years, and the reduction rate of tuberculosis death was 29.6%.
6. Treatment coverage has increased from 19.5% in 1965 to 49.44% in 1977, and the treatment regularity from 20% in 1965 to 34.46% in 1977, respectively.

1. 序 論

國家結核管理의 보다 效率의인 對策樹立을 爲하여 疫學的인 模型에 依하여 結核問題의 動態를 把握하는것이 有效한일 임을 WHO 專問委員會 報告書에서도 提示한바 있다.

우리나라는 1962年 以來 全國의이며 組織의인 事業이 展開되어 왔으며 1965年 부터는 每 5年마다 3次에 걸쳐 全口結核實態調査를 實施함으로써 疫學的인 基本資料를 얻게 되었으나 結核의 疫學的인 模型計算은 Waaler와 Azuma^① 등에 依하여 提示된바 있는데 著者는 보다 小規模의 電算機의 使用이 可能한 Azuma의 模型을 引用하여 1次的으로 1965年에서 1977년까지 12年間の 結核問題의 疫學的인 動態를 觀察하고 다음으로 1978年以後 未來의 動態를 國家의 여러가지 結核管理施策 方向에 따라 推定하여 봄으로서 效率의 對策樹立에 貢獻하고자 하였다.

二. 方 法

1. 基礎條件을 爲한 疫學的인 諸係數值 適用 模型에 依한 結核問題의 推計는 統計學的인 根據에 立脚한 充分한 資料가 提供된 狀態에서 이루어 져야 하겠으나 우리나라는 現在도 몇가지 基礎의인 資料만이 發表된바 있으므로 本研究에서는 基他 資料에 依하여 模型計算에 必要한 係數位置를 補正하여 求하거나 推定에 依하지 않을수 없었다.

1965年을 始作年度로 하여 1975年 까지의 結核問題의 動態를 把握하기 爲하여 1965年 當時의 結核問題의 諸條件을 다음과 같이 定하였다.

結核有病率의 指標設定은 病型의 区分이 明確한 菌陽性 肺結核患者의 有病率로 하였으며 1965年 以

后 每5年마다 實施된 全國結核實態調査 結果^②(1965 : 0.94%, 1970 : 0.74%, 및 1975 : 0.76%)을 補正하여 求한 細菌學的 有病率 (1965 : 0.94%, 1970 : 0.67% 및 1975 : 0.57%)을 適用하였다. (表 1 參照)

結核菌 感染率과 BCG 接種率은 1965年에 49.9%와 16.4%(表 2 參照)이었으며 1965年에서 1975년까지 10年間の 感染危險度(risk of infection)는 3.8로 算定되어 이를 適用하였다. 한편 政府結核管理 年度別報告書^③와 張의 報告^④에 따라 1965年度에 推定되는 全体 傳染性 患者中 受療中에 있는 患者는 19.3% 이들 受療患者中 一年間 規則的으로 계속 治療를 받고 있는 患者가 20%로 推定하였으며 每年 患者管理가 20%의 組織化와 改善으로 非受療患者의 減少率이 0.9624%, 不規則的인 服藥率의 減少率은 0.98%로 推定하였다.

年間 新患者 發生率^⑤을 1971年 新患者 發生率調査에서 報告된 0.14%을 適用하였으며 結核患者中 受療中인 患者의 死亡率은 6.5%非受療中인 患者의 死亡率은 15.8%로 算定되어 이를 適用 하였다.

1965年에서 1975年 까지 年平均 出産率과 死亡率을 算定한바 各各 4.08%와 1.08%이었으며 年間 死亡率과 出産率의 減少率은 0.908% 및 0.958%로서 이를 適用 하였다.

Table 2. Proportion of population to tuberculosis infection and BCG vaccination, 1965, 1970 and 1975.

Group		1965	1970	1975
Total population		100(%)	100(%)	100(%)
BCG vaccinated		16.4	30.3	41.3
Not BCG vaccinated	not infected	33.7	24.7	17.6
	infected	49.9	45.0	41.1

Table 1. Adjustment of Tuberculosis Prevalence (Bacteriological)

Years	Smear & culture (5yr's above) [1] (%)	smear only (5yr's above) [2] (%)	[1]÷[2]	[2]×1.36(%)	prevalence of total population
1965	0.94	0.69	1.36	0.94	0.79
1970	0.74	0.56	1.32	0.76	0.67
1975	0.76	0.48	1.58	0.65	0.57

以上 1965年을 基準年度別로 하여 simulation을 爲한 疫學的인 諸般條件은 表 3에서 提示한바와 같다.

2. 模型計算 結果와 觀測值의 比較

模型計算에서 適用한 諸係數值의 滿足性 與否를 確認하기 爲하여 1965年 1970年 및 1975年度의 當時의 人口와 三次에 걸친 實態調査 結果에서 얻은 有病率, BCG接種率 및 結核減染率을 觀測值로 하여 模型計算에서 얻은 結果와 比較觀察한 바 “表 4”에서 나타난 바와 같이 近似한 結果를 나타 내었으므로 適用한 諸係數值가 滿足한 것으로 一旦 假定하고 1965年에서 1977年 까지의 疫學的인 動態를 觀察하기로 하였다.

三. 觀察內容

1. 結核問題의 疫學的인 추세

1965年에서 부터 1977年까지 12年間 傳染性 結核患者의 有病率, 新患者發生率과 結核減染率 및 結核死亡率의 動態를 國家結核管理對策下에 實施해온 結果로 나타나는 結核問題의 趨勢(The trends of National Tuberculosis Control Programme : NTP)

와 1965年以後 國家結核管理 對策이 順히 實施되지 않은 狀態(BCG 接種 및 治療事業을 一切 中斷한

Table 3. Initial Condition in 1965

Population	28.377 million
Annual birth rate	4.08 %
Annual death rate	1.08 %
Prevalence of non-infected	33.7 %
Prevalence of TB-infected	49.9 %
Prevalence of BCG-vaccinated	16.4 %
Prevalence of TB-cases	0.79 %
Treatment coverage in TB cases	19.3 %
Risk of infection	3.8 %
Incidence of TB-cases	0.14 %
TB mortality in non-treated cases	15.8 %
TB mortality in treated cases	6.5 %
BCG Primary vaccination	1.1 million
Annual reduction rates	≈ 0.8204
Treatmentc irregularity	0.98
Non-treated TB cases	0.9624
Birth rate	0.908
Death rate	0.958

Table 4. Comparison of the simulation results with observed estimates

Years	Population (10 ⁵)		Bacteriological Tuberculosis Prevalence (%)		BCG coverage (%)		Infection Prevalence (%)	
	Observ.	SIM	SURVEY (Adjust.)	SIM.	Survey	SIM.	Survey	SIM.
1965	28.377	28,377	0.79	0.789	16.4	16.40	49.9	49.89
1966		29,228		0.760		19.51		49.34
1967		30,008		0.735		22.47		48.82
1968		30,720		0.712		25.31		48.35
1969		31,367		0.691		28.06		47.91
1970	31,793	31,951	0.67	0.670	30.3	30.74	45.0	47.52
1971		32,478		0.650		33.37		47.15
1972		32,949		0.631		35.95		46.81
1973		33,370		0.611		38.51		46.49
1974		33,743		0.592		41.05		46.19
1975	34,028	34,073	0.57	0.572	41.3	43.59	41.1	45.90

狀態)를 假定하여 結核問題의 自然的인 趨勢(Natural Trends : NAT)를 比較 觀察하였다.

2. 結核管理 業務量 및 問題의 減少量

自然狀態 下에서의 疫學的인 趨勢와 國家結核管理 施策 下에서의 疫學的인 趨勢 間에 生겨나는 面積(圖1, 2, 3, 4 參照)에 該當하는 量을 問題의 減少量으로 보았으며 이같은 減少를 爲하여 實施 하여온 結核管理 業務量 即 BCG接種數와 治療患者數를 求하였다.

3. 受療率과 規則的인 服藥率

1965年以後 1977年까지 每年 推定되는 伝染性 患者中 發見되어 治療를 받은 患者의 數를 求하고(受療率: Treatment coverage) 受療中에 있는 患者中 一年間 規則的服藥을 하는(規則的인 服藥率: Treatment regularity) 狀態를 觀察하였다.

四 結 果

1. 結核問題의 疫學的인 動態

自然的인 條件下에서 1965年度의 有病率은 0.789

%, 新患發生率은 0.1473%, 自然感染率은 49.89% 및 死亡率은 人口 10萬名에 對하여 124.7名에서 어느 期間 약간의 減少추세를 보였으나 다시 增加現象을 나타내어 1977年에 有病率이 0.83%, 新患發生率은 0.165% 自然感染率은 55.85% 및 死亡率은 人口 10萬名에 對하여 131.2名으로 問題가 더욱 많아지는 趨勢를 나타내었다.

그러나 1965年 以後 國家 結核管理事業의 實施 結果로 1977年度에 有病率이 0.534%, 新患發生率은 0.1345% 自然感染率은 45.38% 그리고 死亡率은 人口 10萬名에 對하여 59.9名으로 1965年 以後 漸次的인 減少趨勢를 나타내고 있음을 알수 있었다. (表5, 圖 1-4 參照)

2. 結核管理 業務量 및 問題의 減少量 推定

1965年 以後 12年間 國家結核管理事業을 通하여 實施된 BCG 予防接種 實施數는 12,100,000名에達했음을 推定할 수 있었으며 患者發見을 通하여 治療를 받은 總年患者數는 763,882名이 되었다. 1965年에서 1977年 까지 12年間 이같은 予防事業과 治療事業을 通하여 自然狀態 下에서 總年患者數(Total number of patient-treatment-years)와 死亡者數

Table 5. Annual trends of TB epidemiology by natural status and national TB programme (1965~1977)

Years	Bacteriological TB. Prev. (%)		TB. incidence (%)		Infection prevalence (%)		TB. Mortality (Per 10 ⁵)	
	NAT	NTP	NAT	NTP	NAT	NTP	NAT	NTP
1965	0.789	0.789	0.1473	0.1473	49.89	49.89	124.7	110.4
1966	0.771	0.760	0.1467	0.1457	49.68	49.34	121.9	104.1
1967	0.760	0.735	0.1466	0.1442	49.65	48.82	120.1	98.7
1968	0.753	0.712	0.1470	0.1429	49.78	48.35	119.1	93.8
1969	0.751	0.691	0.1478	0.1416	50.04	47.91	118.7	89.2
1970	0.753	0.670	0.1490	0.1405	50.44	47.52	118.9	85.0
1971	0.757	0.650	0.1505	0.1395	50.95	47.15	119.7	81.0
1972	0.764	0.631	0.1524	0.1385	51.56	46.81	120.8	77.1
1973	0.774	0.611	0.1545	0.1376	52.27	46.49	122.3	73.4
1974	0.785	0.592	0.1568	0.1367	53.06	46.19	124.1	69.8
1975	0.799	0.572	0.1593	0.1360	53.93	45.90	126.2	66.4
1976	0.814	0.553	0.1621	0.1352	54.86	45.63	128.6	63.1
1977	0.830	0.534	0.1650	0.1345	55.85	45.38	131.2	59.9

Fig 1 Comparison of Annual TB Prevalence Between NAT & NTP (1965-1977)

Fig 2 Comparison of Annual TB. Incidence Between NAT & NTP

Fig 3 Comparison of Infection Prevalence, NAT & NTP (1965–1977)

Fig 4 Comparison of TB. Mortality between NAT & NTP (1965–1977)

Table 6 Total TB. Problem (1965–1977)

	Work Load		Problem Reduc- tion [(1)–(2)] (3)	Problem Reduction Rate (3)/(1)(%)
	NAT (1)	NTP (2)		
Total No. of TB. Pat–years	2,679,588	2,335,148	344,440	12.85
Total No. of TB. Death	423,374	297,912	125,462	29.63
Total No. of Treated pat–years	0	763,882	—	—
Total No. of BCG Vacc.	0	12,100,000	—	—

Table 7. Annual treatment coverage and regularity

years	Expected No. of patients	No. of pts. on treatment	Treat. coverage (%)	Treat. regularity (%)
1965	224,000	43,680	19.50	20.00
1966	222,000	50,057	22.55	21.60
1967	220,000	56,112	25.51	23.16
1968	218,000	61,799	28.35	24.69
1969	216,000	67,068	31.05	26.19
1970	214,000	71,874	33.59	27.66
1971	211,000	76,178	36.10	29.11
1972	207,000	79,995	38.63	30.53
1973	204,000	83,192	40.78	31.92
1974	199,000	85,892	43.16	33.28
1975	195,000	88,069	45.16	34.46
1976	190,000	89,749	47.24	35.77
1977	184,000	90,966	49.44	37.05

(Total number of tuberculosis death)가 2,679,588명 과 423,374명이 될것으로 推定 되었던 것이 国家結核管理施策下에서는 各各 2,335,148명과 297,912명으로 나타나 自然狀態에서보다 推定되는 總年患者는 344,440即 12.85%가 死亡者數는 125,462명 即 29.63%의 減少率을 가지고 왔음을 볼 수 있었다. (表6參照)

3. 受療率과 規則的인 服藥率

推定되는 伝染性 患者中 治療를 받은 患者數는 1965年度에 19.5%에 지나지 않았으나 漸次的으로 増加하여 1970년에는 33.59%, 1975년에는 45.16%에 達하였으며 1977년에는 49.44%로서 推定되는 患者의 절반에 가까웠음을 볼 수 있었다. 한편 이들 治療를 받고 있는 患者中 一年間 계속 規則的으로 治療를 받은 患者는 1965年度에 20.0%이었으나 1970년에는 27.66%, 1975년에는 34.46%, 1977년에는 37.05%에 達하였다. (表7參照)

五 結 論

보다 効率的인 国家結核管理 計劃樹立를 爲하여 1965年에서부터 1977年까지 過去 12年間 結核의 疫學的인 動態를 Dr. Y. Azuma의 model에 依하여 觀察한바 그 結果를 다음과 같이 推定할 수 있었다.

1. 伝染性 患者의 有病率은 1965年의 0.789%에서 1970年은 0.670%, 1975年은 0.572%, 1977년에는 0.534%로 漸次的인 減少趨勢를 나타내고 있음을 알수 있었으며 1965年 보다는 0.255%가 減少되어 32.3%의 減少率을 나타 내었다.

2. 新患者發生率은 1965年의 0.1473%에서 1970年은 0.1405, 1975년에는 0.136, 1977년에는 0.1345%로 鈍한 減少趨勢를 보였으며 1965년에 比하여 0.0128%가 減少되어 8.7%의 減少率을 나타 내었다.

3. 結核感染率은 1965年의 49.89%에서 1980年에 47.52%, 1975年은 45.90%, 1977년에는 45.38%로 弱한 減少趨勢를 나타 내었으며 1965년에 比하여 4.51%가 減少되어 9.0%의 減少率을 나타내

었다.

4. 結核死亡率은 1965年度의 人口 10万名當 110.4명 이었으나 漸次 減少되어 1977년에는 59.9명 으로서 1965년에 比하여 45.7%의 減少率을 나타 내었다.

5. 1965年에서 1977年까지 12年間 實施한 業務量은 BCG接種(再接種은 除外) 總數는 12,100,000名에 達하였으며 治療를 받은 總年人員數는 763,882名에 達하였다. 이로서 同期間中에 結核患者 總年人員數는 2,335,148명으로 国家結核管理 實施가 없는 自然狀態 下에서의 患者總年人員數 2,679,588名보다 344,440명이 減少되어 12.85%를 減少시킬 수 있었으며 結核으로 因한 總死亡者數는 国家結核管理施策 下에서 297,912명으로 自然狀態 下에서의 423,374명 보다 125,462명에 尠하여 結核으로 因한 死亡者를 減少시켜, 29.63%의 減少率을 나타냈음을 推定할 수 있었다.

6. 推定되는 結核患者中 受療中에 있는 結核患者는 1965年과 1977年에 各各 19.5%에서 49.44%로 増加하였으며 受療中인 患者中 一年間 規則的인 服藥中에 있는 患者는 各各 20%에서 34.46%로 推定 되었다.

References

1. WHO Expert Committee on Tuberculosis, Ninth Report, Wld. Hlth. Org., Geneva, 1974
2. Waaler, H. T., Gessel, A. and Anderssen, S.: The use of mathematical methods in the study of Epidemiology of Tuberculosis. Am. J. Publ. Hlth., 52:1002, 1962
3. Waaler, H. T., and Piot, M. A.: Bull. Wld. Hlth. Org., 41:75, 1969
4. Waaler, M. T., and Piot, M. A.: Use of Epidemiological model for Estimating the Effectiveness of Tuberculosis measure. Bull. Wld. Hlth. Org., 43:1, 1970
5. Y. Azuma: A simple simulation model of tuberculosis epidemiology for use without large scale computers; Bull. Wld. Hlth. Org. 52:313-

322, 1975

6. Y. Azuma: *Estimation of the epidemiological time trend of tuberculosis in Japan, Atrial with a simple epidemiological simulation model, Kekkaku, 50:199-207, 1975.*
 7. 全国結核実態調査報告書：保健社会部，大韓結核協会，1965, 1970, 1975.
 8. 結核管理実績報告書，保健社会部，1965~1975
 9. 張承七，結核治療劑의 補合現況 및 그 藥理作用：藥師公論 第106号，1869, 7. 24
 10. 結核新患發生率 調査報告，保健社会部，大韓結核協会，1970~1971
-