非定型抗酸菌 Atypical Mycobacteria

結核研究院

金 成 鎮

1. 序 論

Griffith가 狼瘡의 조직편으로부터 檢出した 抗酸菌을 Atypical tuberle bacilli라고 指稱 報告(1924)함¹⁾을 효시로, 1950年代에 이르러서는 Buhler와 Pollak(1953年)²⁾을 위시하여 Timpe와 Runyon(1954)等³⁾이 소위 非定型抗酸菌도 사람에게 肺結核樣의 疾患을 초래한다고 報告했다. 이후로 이들 菌群에 대한 관심과 研究가 더욱 높아졌고, 抗酸菌種 鑑別에 有用한 生化學的方法이 개발됨과 아울러, 肺疾患, 淋巴腺疾患, 膿瘍 및 患者의 喀痰, 胃액, 조직재료등에서 속속 新菌種이 분리되었으며, 그 症例와 治療에 대한 報告가 계속 되고 있다.

現今에 와서는 結核의 發病이 매우 감소된 선진 제국에서는 非定型抗酸菌의 感染과 發病이 상대적으로 증가되고 있음을 고려 할 때 (그림1참조), 우리나라에서도 앞으로는 이들 菌群에 대한 調査·研究 및 治療方法等에 대한 깊은 관심을 가져야 할 것으로 보아, 非定型抗酸菌의 一般의인 概要와 그 分布 및 임상적인 意義等에관해 간단히 기술하고자 한다.

2. 概 要

1) 命名法

흔히 M. tuberculosis와 M. bovis와 같이 사람에게 定型的 病巢를 形成하는 結核菌을 제외한 結核菌種에대해서는 소위 “非定型 (Atypical)”이란 명칭이

붙으며, 이들이 일으키는 病症을 mycobacteriosis (非定型抗酸菌症)로 通稱하고 있다. 非定型 抗酸菌도 自体대로 特性을 가진 菌이며, 一般적으로 病原性 또는 伝染性이 없거나 매우 弱하나, 病原性이 認定되는 菌種들이 多数 報告되었다. 한편 同一 菌種이지만, host-parasite relationship의 不均衡으로 인해 非病原性菌도 되고 때로는 病原性菌도 되므로, 所謂 機會感染菌(Opportunist)이라고 불리우기도 한다. 菌種의 特性에 따라 대략 다음과 같은 代各詞들이 붙여져 學者에 따라 混用되기도 한다.

- ① Atypical mycobacteria.
- ② Opportunist group
- ③ Intermediate group
- ④ Anonymous group
- ⑤ Tuberculoid Mycobacteria
- ⑥ Saprophytes

한편, 結核菌種間에는 略호가 쓰이기도 하는데 가장 많이 쓰이는 略호는 다음과 같다.

- ① TB=tubercle bacilli : M. tuberculosis, M. bovis.
- ② tbc=tuberculosis : TB 菌種中 어느 것에 의해 생기는 病. 소위 atypical mycobacteria에 의해 생긴 病症은 제외.
- ③ tbcn=tuberculin : M. tuberculosis complex의 species로 제조된 tuberculin
- ④ ksn=kansasin : M. kansasii로 제조된 sensitin
- ⑤ ftm=M. fortuitum으로 제조된 sensitin
- ⑥ MAIS complex=M. avium-intracellulare-scrofulaceum.

Fig 1. Epidemiological Trend in Mycobacterial Disease

⑦ MOTT = mycobacterium other than tuberculosis

2) 非定型結核菌의 分類學的 位置

現在로서는 公認된 명칭으로 分類되어 있는 mycobacterium 屬의 菌種은 40여종⁴⁾에 이르며, 1980년 1월 이후는 ICSB (International Committee on Systematic Bacteriology)에서 정한대로 현재의 명명법의 수정이나 다소의 菌種이 공식적으로 첨가 될 것으로 생각된다.

3) 菌分類方法

대체적인 分類方法은 이미 확립되어 있으나 最終的 結定은 역시 국제적인 결정에 의할 것⁵⁾이지만, 대

체로 菌種의 生物學的 性狀 또는 生化學的 性狀, 血清學的 시험, phage typing 또는 實驗動物에 대한 病原性 檢討等を 통해 分類하고 있다. 檢査방법의 편리성, 시간절약 문제, 분류상 간결성등을 들어, 형태학적 특성에 주안점을 두어 균을 分類하는 方法인 Runyon의 grouping⁵⁾을 사용하고 있으나 문제점이 없는 것은 아니다. 임상가검물에서 흔히 분리 될 수 있는 代表的 菌種들을 例로 Runyou's Group⁵⁾으로 大別한 다음, 比較的 용이한 方法을 써서 菌

Table 1. Physio-Chemical Classification

1-A. TB Complex

CLASSIFICATION PROPERTY- SPECIES	PHYSIOLOGY					BIOCHEMISTRY			
	GROWTH TEMPERATURE	GROWTH RATE	COLONIAL TYPE	PIGMENTATION	ACID FASTNESS	NIACIN	CATALASE 68°C/20 min	500mcg/ml PNB	10mcg/ml TCH
M. TUBERCULOSIS	37° C	SLOW	ROUGH	-	STRONG	+	-	-	+
M. BOVIS	37° C	SLOW	ROUGH	-	STRONG	-	-	-	-
OTHER	37° C (25-45)	VARIABLE	(SMOOTH)		WEAK	- (+)	+	+	+

(+) : M. SIMIAE

Table 1-B. Photochromogen

METHOD SPECIES	PIGMENTATION		TWEEN 80 HYDROLYSIS (5-10 DAYS)	NITRATE REDUCTION	NIACIN
	DARK	PHOTO- ACTIVATED			
M. KANSASII	-	+	+	+	-
M. MARINUM	-	+	+	-	-
M. SIMIAE	-	+	-	-	+

Table 1-C. Scotchchromogen

METHOD SPECIES	PIGMENTATION		NITRATE REDUCTION	TWEEN HYDROLYSIS IN 5 DAYS	UREASE
	DARK	PHOTO- ACTIVATED			
M. SCROFULACEUM	+	- +	-	-	+
M. SZULGAI	+	- +	+	+	NOT SIGNIFICANT
M. GORDONAE	+	- +	-	+	-

Table 1—D. Non Chromogen

METHOD SPECIES	TEMPERATURE			NIA- CIN	PIGMENT- TATION	CATALASE 68°C/20 min.	NITRA- TE REDUCTION	TWEEN 80 HYDR. <5 DAYS	TELLUR- ITE REDUC. <3 days	5% NACL TOLERANCE
	25°C	37°C	45°C							
M. AVIUM	±	+	+	-	-	+	-	-	+	-
M. INTRACELLULARE	±	+	±	-	-	+	-	-	+	-
M. GASTRI	+	+	±	-	-	-	-	+	-	-
M. TERRAE	+	+	±	-	-	+	+	+	-	-
M. ULCERANS	±	+	-	-	-	+	-	-	NOT SIGNIF.	-
M. TRIVIALE	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
M. XENOPI	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-

Table 1—E. Rapid Growers

METHOD SPECIES	GROWTH RATE <7 DAYS	GROWTH TEMPERATURE			PIGMENT- TATION	5% NACL	ARYLSUL- FATASE <3 DAYS	GROWTH ON MACCON- KEY	NO ₃ RED.	TWEEN 80 HYDR. <3 DAYS
		25°C	37°C	45°C						
M. FORTUITUM	R	R	R	-	-	+	+	+	+	±
M. CHELONEI	R	R	R	-	-	+	+	+	-	-
M. PHLEI	R	R	R	R	+	+	-	-	+	+
M. SMEGMATIS	R	R	R	R	-	+	-	-	+	+
M. VACCAE	R	R	R	-	-	+	-	-	+	+

R = RAPID GROWTH

種을 분리해 본다면 表 1—A. B. C. D. E와 같다. 임상적으로 가장 중요한 TB complex를 非定型抗酸菌種들로부터 分離하는 방법은 表1에서 보는 바와 같이 비교적 용이하다고 하겠다.

表 1에서와 같은 비교적 간단한 방법외에 既知의 mycobacteria serotype에 대한 토끼의 antisera를 利用하여, type specific antiserum과 未知의 bacterial suspension을 使用 agglutination test를 通해 serotype을 区分하는 방법(McClatchy, 1979)⁸⁾이나 mycobacterium 菌種에 따른 特異 또는 非特異 lipid pattern을 利用 菌種을 分離해내는 방법等(Jenkins, 1979)⁹⁾도 근래 많이 利用되고는 있으나 分類方法의 研究나 疫學의 目的이 아니라면, 현재로서는 임상적으로 뚜렷한 重要性을 지니고 있는 것 같지는 않다.

3. 非定型抗酸菌의 分布 및 臨床의 意義

1) 分 布

세계 도처에서 自然界에 널리 分布되고 있으며, 특히 토양에서 흔히 分離되며 기타 물이나 집먼지나 우유 또는 닭, 돼지같은 動物에서도 發見되고 있다.¹⁾ 그림2는 美國內의 M. intracellulare 感染을 알아내기 위해 Gruft等¹⁰⁾이 sensitin skin test를 實施하여 얻은 結果를 그림으로 나타낸 것으로서 特異하게 美國 東南部 地域에 높은 感染率을 나타내고 있다. 그러나, 그림3(Davidson, 1979)¹¹⁾에서 보는 바와같이, 疾病의 發生率은 感染率과 반드시 일치하지 않는 것을 보면 疾病의 發生에는 여러가지 복잡한 要因이 많은듯 하다. 日本도 最近 Tsuka-

mura⁸⁾의 報告에 의하면, 非定型抗酸菌症患者의 數가 結核有病率의 減少와 反比例하여 增加하고 있는데, 역시 地域의 으로 그림 4와 같이 太平洋沿岸을 따라 地域差를 나타내고 있다.

2) 臨床的 意義

表 2 (National Jewish Hospital Report)⁹⁾는 人体 各部位別 MAIS 分離件數를 表로 보인 것인데, 598 件의 MAIS 分離件中 62%는 肺이고 38%는 肺外 各臟器 및 部位에서 分離되었다고 보고했는데, 이는 *M. tuberculosis*보다는 肺外部에 病變을 잘 일으키는 것이 크게 다른 점이라 하겠다.

表 3 (Rosenzweig, 1979)¹⁰⁾은 *M. intracellulare*가 分離된 患者의 現在 또는 過去 疾病別 分布를 나타낸 것인데, 이는 *predisposing factor*로도 생각할 수 있으며, 肺疾患이나 기타 어떤 先行條件下에서 이러한 Atypical mycobacterial disease가 發病되는 경우가 많음을 시사해주고 있다. Atypical mycobacteria의 여러 specis는 우리나라 土壤이나 기타 自然환경에도 보통 많이 존재하며¹⁶⁾ 이들이 人体에 感染될 기회는 매우 높다. 그러나 우리나라와 같이 結核菌의 感染이 매우 높은 나라, 即 대부분의 成人은 거의 感染되어 있는 狀態^{11, 12, 13)}에 있어서는 *M. tuberculosis*에 대한 強한 免疫의 成立때문 인지는 확실히 알 수 없으나 Atypical mycobacteria로 인한 患者는 현재 그리 문제시 되고 있지는 않는 것 같다. 한편, 細菌學的 分離方法에 있어서는 문제가 없는 것은 아니다. Kransnow가 報告⁸⁾한 바와 같이 結核菌 分離時 他雜菌의 生存저지 목적으로 使用하는 NaOH 處理와 같은 強力한 前 處置方法에서는 그림 5에서 보는 바와 같이 結核菌이 2 時間以內에 그 生菌數가 減少 내지는 死滅하며 Zephiran-acetyl-L-Cysteine으로 處理하면 4時間以上 生菌數의 減少를 보이지 않는 것을 알 수 있으며 뿐만 아니라 耐性結核菌 또는 非定型抗酸菌의 發育을 원활하게 해주기 위해 CO₂ 環境하에서 菌을 培養하면 더 많은 菌을 發育시킬 수 있을 것이지만, 우리나라의 많은 檢査室은 炭酸 gas 孵卵器를 使用^{14, 15)}치 못하고 있는 實情이다.

Davidson 等⁶⁾의 자료에 의하면 非定型結核菌에 起因된 질병으로 確定하기 위해서는, 첫째 同一 菌種이 同一 Source로부터 계속적으로 많은 量이 檢출되어야 하며, 둘째, 非定型抗酸菌症外의 要因에

Fig. 2. Prevalence of *M. intracellulare* by Skin test in U. S. A (GRUFT)

Fig. 3. Geographic Distribution of Avium-Intracellular Diseases in U. S. A (DAVIDSON)

Fig. 4. Prevalence of Atypical Mycobacterial Lung Diseases in Japan (Tsakamura)

의한 疾病의 可能性이 모두 배제되는 경우이어야 하며 (특히 人型結核菌에 의한 病症이 간과되어서는 안될 것임), 세째 환자는 非定型抗酸菌症이라는 診斷과 부합되는 임상적 증거를 반드시 가지고 있는 경우에 한했다. 네째로 通常 無菌의인 가검물 (예를 들면 腦脊髓液, 糞水, 조직生檢等)에서 非定

Fig 5. The Role of the Clinical Laboratory in Decontamination Methods for Recoery of Mycobacteria form Specimen. (Kransnow)

Table 2. Mais Isolates by Body Sites (NIHRC)

CLASSIFICATION OF LESIONS	NUMBER
PULMONARY	371 (62%)
EXTRAPULMONARY	227 (38%)
LYMPHATIC	13
BONE JOINT	12
GENITOURINARY	16
WOUNDS	10
PERITONEAL	6
OTHERS	13
UNKNOWN	157
TOTAL	598

型菌이 分離되면 非定型抗酸菌症의 가능성을 높여 준다고 하겠다.

한편, 현재까지 밝혀진 資料로부터 임상적으로 유의하다고 보고된 菌種과 이에 有關하여 治療 방법 등에 대해 略記하면 다음과 같다.

① *M. kansasii*

우리나라에서는 菌檢出 및 그 症例報告가 없으나 美國에서는 地域에 따라 *M. tuberculosis*를 포함한 제반 *Mycobacteria* 感染患者의 20% 정도가 *M. kansasii* 감염에 의한 것으로 밝혀지고 있다.⁴⁾ 毒力은 非定型抗酸菌中 가장 강한 것으로 알려져 있고 塵肺나 肺氣腫歷이 있는 患者에게서 多發한다는 報告^{6,9)}가 있다. *M. tuberculosis* 감염시와 같이 대부분의 抗結核藥劑에 感受性이 있으나, 특히 Rifampicin, Ethionamide, Cycloserine이 가장 有效하며 Ethambutol에도 더러 感受성을 보인다고 한다.⁸⁾ 治療時에는 일년동안 계속 배양 음성을 보일 때까지 二劑 이상을 併用 투약함 것이 권장되며, 藥劑併用時는 Rifampicin을 포함 함이 좋다⁶⁾고 한다. 安(安재호, 1979)⁸⁾은 Texas 地方에서 約 300例의 *M. kansasii* 감염 환자의 治療 성적을 보고한 바 있는데, 이보고에서 人

型菌과 다른 것은 *M. kansasii*는 해당 약제에 完全 耐性만 보이지 않으면 임상적으로 治療가 가능했다고 했다.

表 4.5 (Raleigh, 1979)⁸⁾ 및 그림 6 (Lowell, 1979)⁸⁾은 *M. kansasii* 患者에 대한 治療 성적을 보인 것으로, 治療 효과는 기대할만 하다.

Table 3. Spectrum of Clinical Disease in Pulmonary M. Intracellulare Infections (Roseuzweg)

DISEASES	NUMBER
C O P D	32
PREVIOUS TB	28
ALCOHOLISM	18
SILICOSIS	14
DIABETES	9
ATHEROSOLELOSIS (HEART DISEASE)	5

Table 4. Comparison of Sputum Conversion in Disease Caused by Kansaii

DURATION & DIVISION	0	4	8	12	-----	26 WEEKS
D S	P	P	P	N		
CULTURE	P	P	P	N

Fig. 6. Transition of General Status in Patients under the Treatment of Disease Caused by Kansaii

Table 5. Chemotherapy Experience in kansasii Diseases (Davidson)

NO. OF PTS	SUMMARY OF TREATMENT	PREDISPOSING FACTORS
122	UNDETERMINED 41	COPD 36 %
	CASES TREATED 81	CANCER 8.0 %
	SUCCEDED 63	SILICOSIS 9.8 %
	FAILED 18	BRONCHIECTASIS 6.5 %
		RHEUMATOID DISEASE 6.5 %
		ANKYLSING SPONDYELITIS 5 %

③ *M. intracellulare-avium*

*M. intracellulare*와 *M. avium*은 血清學的 方法이 아니고는 区分이 곤란하며, 실제 임상적으로는 区分의 의의가 없을 것 같다.⁶⁾ MAIS complex라고 해서 *M. scrofulaceum*을 이 群에 포함시키는 理由는 이 3個菌種이 血清學的으로 밀접한 연관성을 갖고 있으며 이 complex는 治療도 매우 어렵다는 点에서이다. 그림 2, 3, 4에서 본 바와 같이 지역에 따라서는 그 有病率이 상당히 높다. 특히 지대가 낮고, 습도가 높으며, 토양중 유기물 성분이 많은 地대,⁶⁾ 이를테면 美国이나 日本의 東南部와 같은 海안을 면한 地대에서 發病率이 높다. 우리나라에서도 흔히 發見되는 상재균이며, 환자의 객담에서도 많이 分離되고 있으나 病症의 증거는 아직 보고된 바 없다. 肺結核樣疾患, 淋巴節炎等 散發的인 症例報告가 外国⁷⁾에서는 나오고 있으나 아직까지 宿主에 대한 毒性, 病的 预后等은 예측 불가능하다. 가장 큰 문제점은 이 菌種이 大개의 現抗結核藥劑에 耐性を 보인다는 것이다. (David, Kuze, Wallace 1979)⁸⁾ 따라서 治療方法이 문제시 되며, 病巢가 限局的인 경우는 手術적 方法을 취할 수도 있을 것이다. National Jewish Hospital에서 多劑複合投与治療를 시도한 결과 다소 效과를 보았다는 報告⁶⁾가 있다.

④ *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. ulcerans*, *M. szulgai*, *M. simiae*, *M. xenopei*, *M. marinum*, *M. scrofulaceum*.

이들 菌種들은 우리나라 患者에 대한 發生 症例報告는 없으나 客담에서는 發見되고 있는 菌種들이다. 이들 菌種에 의한 질병은 흔치 않고, 주로 predisposing factor로 作用하는 것 같다. *M. fortuitum*에 의한 各혈 및 피부부조직농양증례등⁹⁾은 때로 보고가 되고 있다. *M. scrofulaceum*, *M. chelonae*, *M. simiae* 등의 감염증에 대해서도 산발적인 보고들⁶⁾이 나오고는 있으나 이들 菌種은 시험관내에서 抗結核藥劑에 대해 高度耐性^{6,9)}을 보이고 있으므로 現結核藥劑 使用에 의한 治療效과는 기대하기 힘들 것이다. *M. szulgai*, *M. xenopei*, *M. marinum* 등은 通常 抗結核治療藥劑에 대해 感수성⁶⁾인 것으로 나타난다.

4. 結 論

현재까지 우리나라 실정으로서는 결핵 感染率과 有病率이 매우 높기 때문에 非定型抗酸菌으로 인한 問題는 아직 크지 않으나, 앞으로 結核이 減少 되면 必然的으로 非定型抗酸菌感染患者의 增加를 나타낼 可能性은 外國의 例를 보아 많다. 하루 속히 抗酸菌屬 定義에 有用한 細菌學의 研究 및 各種 非定型抗酸菌種에 대한 病原性 有無에 관련하여 그 治療 方法의 확립에 관한 연구가 더 進행 되어야 하겠고, 抗酸菌屬 各種의 区分에 有用한 生化學的 檢査方法의 標準化 및 명칭의 통일도 시급하다고 할 수 있겠다. 아울러 일부 결핵균종의 bacteriocin에 의한 抗

癌作用의 研究例(Saito, 1979)¹¹⁾에서 보는 바와 같이 면역학적 연구나 그 검사방법의 진전 및 MAIS 등에 對한 強力한 治療藥劑의 開發等이 앞으로의 研究 사항으로 남아 있다고 하겠다.

References

1. Griffith, A. S.: *Tubercle*, 5, 569, 1924
2. Bahler, V. B. and Pollak, A.: *Amer. J. Clin. Path.*, 23, 363, 1953.
3. Timpe, A. and Runyon, E. H.: *J. Lab. Clin. Med.*, 44, 202, 1954.
4. Kubica, G. P.: *Bull. Int. Union against Tuberculosis*, 53(3), 1978.
55. Runyon, E. H.: *Med. Clin. North Amer.*, 43, 273, 1959.
6. Davidson, P. T.: *Amer. Thoracic Society Medical Section of Amer. Lung Ass.* 18(1), 1979.
7. 堀三津夫: 結核診療 vol. 2, 312, 1972.
8. Subject Materials of International Conference on Atypical Mycobacteria, Denver, Colorado. September 5-8, 1979.
9. 財団法人結核予防会: 東京, 1971.
10. 金成鎮·金尚材: 韓國土壤으로부터 分離된 未分類抗酸菌에關한 研究, 結核研究院 研究論文集, 大韓結核協會, 1976.
11. 제1차결핵실태조사보고: 보건사회부, 대한결핵협회, 1965.
12. 제2차결핵실태결과보고: 보건사회부, 대한결핵협회, 1970.
13. 제3차결핵실태보고: 보건사회부, 대한결핵협회, 1975.
14. Beam, R. E., Kim, K. S., Kubica, G. P.: Comparison of different digestion-decontamination methods for recovery of mycobacteria from sputum, *Scand. J. Resp. Dis.* (48): 136-141, 1976.
15. Beam, R. E., Kubica, G. P.: Stimulatory effects of carbon dioxide on the primary isolation of tubercle bacilli on agar-containing medium, *Technical Bulletin of the Registry of Medical Technologists* 38(8), 1968.