Roentgenogram of the Issue

左側 全肺野를 가린 大量의 血性胸膜滲出液

부산대학교 의과대학 내과학교실

김홍범 · 김영철 · 박순규 · 신영기

증 례

환 자 : 석○○ 28세, 여자

주 소 : 호흡곤란, 좌측흉통

현병력 : 호흡곤란 및 좌측흉통이 입원전 한달전에 발생하여 점점 심해져서 마산 개인병원을 방문하여 thoracentesis 결과 흉막 삼출액이 yellowish 하여 결핵성 늑막염으로 진단 받고 치료하였으나 증상의 호전이 없었다. 입원하기 일주일전에 다른 병원을 방문하여 재차 thoracentesis 결과 약 1400 cc의 bloody effusion을 천자한 후 본원으로 전원되어 왔다.

기왕력 및 가족력 : 특별한 소견은 얻을 수 없었다.

이학적 소견 : BP 130/90 mmHg, R 26/min, P 104/

min, T 36°C였으며 일반상태는 불량했다. 청진상 sinus tachycardia가 있었으며 오른쪽 폐에 호흡음이 약간 감소되어 있었고 왼쪽 폐의 경우 앞쪽에서는 호흡음이 들리지 않았으며 등쪽에서는 호흡음을 약간 들을 수 있었다.

검사실 소견 : CBC; Hb 14.8, WBC 8500, (Diff, WNL), ESR 15 mm/hr

LFT; protein/albumin 6.1/3.0 gm%.

Sputum; 3회에 걸친 검사결과 AFB(-), cytology (-).

제 1 병일째 촬영한 흉부 X-선소견상 좌측폐는 total opacity를 보이면서 종격동 구조물 및 기관을 오른쪽으로 전이된 소견을 보여 왼쪽폐의 흉막 삼출액을 의심할 수 있었다. 후액와선에 일치한 7번째 늑간에

Fig. 1. Chest P-A & left lateral view (after thoracentesis) show slightly diminished amount of effusion with newly appeared free air and air fluid level rather than previous film and well defined lobulated mass shadow which is contrast by air and thus seems to be pleural mass lesion.

서 흉강천자술을 시행한 결과 색깔은 bloody 했고 양은 600 cc, numerous cell(poly 10%, lymph 90%), sugar 30 mgm%, Rivalta(+), total protein 4.4gm%, AFB & Gram stain: negative, cytology 상 특별한 소견이 없었다. 또한 후액와선에 일치한 7번째 늑간에 closed thoracotomy 를 시행하여 약 700 cc의 bloody effusion 이 배액되었다.

제 2병일째 심한 양쪽 견통 때문에 누울수가 없게되어 이후 계속 앉은 자세로 있게 되었다. 제 3병일째부터 closed thoracotomy 한 bottle세 배액되는 색깔은 점차 옅어졌다. 제 4병일째 흉부 X선 촬영상(Fig. 1) 좌측폐의 apex에 늑막 종괴 음영이 나타났다. 매일 배액되는 흉막 삼출액은 200~300 ml였다. 제 10병일째 흉부 컴퓨터 단층촬영을(Fig. 2) 시행하여 좌측 흉강을 거의 다 메우고 있는 거대 종괴가 hemopneumothorax와 같은 소견을 보였으며 종격동 구조물이 오른쪽 후측으로 밀리는 소견을 보였다. 제 12병일째 늑막 침생검을 왼쪽 견갑골하부의 7번째 늑간을 통해 시행하였다. 제 13병일째 오른쪽 상복부에서 왼쪽 상복부로 이어지는 band 같은 종괴가 촉진되었는데 복부사진 촬영상 좌측 상복부에 큰 종괴음영을 보였는데 아마도 흉강내 종괴가 아래로 밀렸거나 좌측 상복부 복막에 악성종양의 전이 때문인 것으로 생각되었다.

제 15병일째 진통제로 조절되지 않는 심한 흉통, 양쪽 견통, 상복부통 때문에 보호자의 뜻에 의해 퇴원하였는데 조직검사 결과 악성 중피종(Fig. 3)으로 규명되었다.

Fig. 2. Chest CT films show;
 1. multiple lobulated pleural mass.
 2. intrathoracic fluid and free air collection.
 3. marked collapse of left lung.
 4. marked mediastinal and tracheal shifting to right.

Fig. 3. Microscopic finding of pleural biopsy specimen is malignant mesothelioma.

고 안

Mesothelioma는 드문 종양으로 흉막에 생기는 유일한 원발성 악성종양이며 장축 및 벽측 늑막에 모두 생길 수 있으며 남녀 모두 어느 연령층에서나 다 발생할 수 있다. 뚜렷한 원인인자는 규명되지 않았으나 석면이^{3~7,13)} 중피종의 발생과 관계가 깊은 것으로 알려져 있으며 석면섭취는 탄산수소, 니켈, 크로미움등을 흡수하는데 이것들은 폐암의 발생과도 상당한 연관관계가 있다. 대체로 석면에 접촉한 후 중피종이 발생하는데는 20~40년이 소요되나 반드시 지속적으로 석면과 접촉해야만 중피종이 발생하는 것은 아니며 지역적으로 광산 및 제분소가 인접한 곳에 발생빈도가 높은 것으로 보고되고 있다. 본 증례의 경우는 석면과 접촉한 뚜렷한 기왕력은 없었다. 조직학적으로는 flat spindle cell, fibroblast, adenomatous gland-like pattern 등 다양한 소견을 보이면서 흉막강내로 신속하게 sarcomatous invasive growth를 하여 흉막강을 gray-whitish, fleshy neoplastic tissue로 꽉 채우게 된다. 중피종은 흉막강내에 국소적으로 증식하며 흉막 삼출액을 거의 초래하지 않는 고립성 양성 중피종과 흉막강내에 미만성으로 퍼져 다량의 늑막 삼출액을 동반하는 미만성 악성 종양으로 크게 두가지 형태^{2,10)}로 나눌 수 있는데 대체로 국소종양은 섬유종 혹은 섬유육종의 소견을 보이고 미만성 종양은 선종 혹은 혼합종의 소견을 보인다. 실제로 흉막 조직검사에 의하여 확진되는 예는 약 50%인데 그 이유는 조직소견이 매우 다양하기 때문이다. 본 증례의 경우는 흉부 컴퓨터단층 촬영상 늑막강을 거의 다 메운 미만성 병변인데도 불구하고 조직소견은 섬유육종과 유사한 소견을 보였으나 혼합종의 소견도 배제할 수는 없었다.

늑막 삼출액은 미만성 악성 종양의 경우 다량으로 형성되는데 삼출액에서 악성 중피종 세포는 중피종 환자의 약 70%에서 발견되며 흉막 삼출액에서 hyaluronic acid를 측정하여¹²⁾ 그치가 증가된 경우 진단에 상당한 도움이 되나 본 예에서는 시행되지 않았다. 또

본 증례에서는 흉막 생검으로 진단된 예이나 세 차례의 늑막 삼출액 세포 검사상 악성 중피종 세포는 검출되지 않았다. 증상을 보면 국소종양의 경우 종양이 상당히 커질때까지 별 증상이 없으나 미만성 종양의 경우 흉통과 기침이 제일 흔한 증상이나 드물게는 호흡곤란, 발열, 체중감소, 허약감, 각혈, clubbing finger, 유주성 다발성 관절통(migrating multiple polyarthralgia) 등이 나타날 수도 있다. 본 증례의 경우 내원시 좌측 흉통과 호흡곤란을 주소로 하였으며 체중감소, 허약감도 호소하였다.

흉부 방사선학적^{9,10)} 소견상 국소성 악성종양은 흉막 혹은 interlobar fissure에 인접한 폐의 변연부에 물과 같은 농도의(water density) 균질성 종괴로 나타나므로 쉽게 판별될 수 있다. 그러나 미만성 악성 종양의 경우는 다량의 흉막 삼출액에 의해 가려져서 잘 판별되지 않는데 가끔 흉막 삼출액 상부의 비중력 의존부(non-gravity dependent portion)에 있을 경우에는 쉽게 판별될 수 있다. 본 증례의 경우 내원 당시에는 다량의 흉막 삼출액 때문에 종괴가 발견되지 않았으나 개흉술에 의한 유관배액후 lateral film 상에 비중력 의존부에 있는 종괴 음영의 판별이 가능했다.

미만성 악성종양의 경우 특별한 치료 방법이 없으나 방사선 치료에 의해 일시적으로 증상이 호전된 경우도 있다. 대개의 경우 다량의 흉막 삼출액이 동반되므로 개흉술¹¹⁾에 의한 유관배액을 해주면 증상의 호전을 기대할 수 있다. 본 증례의 경우는 후액와선에 일치한 일곱번째 늑간에 개흉술을 시행하여 매일 200~300 ml의 흉막 삼출액을 배액시켜 호흡곤란은 다소 호전되었으나 흉통의 호전은 볼 수 없었다.

본 증례를 검토해 볼 때 흉부 X선 촬영에 의해 다량의 늑막 삼출액이 판별되었을 때 대개의 경우 결핵성 흉막염을 생각하게 되나 bloody character 및 intractable 하던 드물지만 한번쯤은 악성 중피종의 가능성도 생각해 보아야 할 것으로 생각된다.

(본 증례에 협조해주신 방사선과 김 병수 교수님과 문 태용 선생님께서 감사사를 드립니다).

Malignant Mesothelioma Causing Bloody Pleural Effusion

Hong Bum Kim, M.D., Young Chul Kim, M.D., Soon Kew Park, M.D., and Young Kee Shin, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Busan National University

Mesothelioma is a rare primary neoplasm of the pleura and can be separated into benign and malignant lesions. Mesotheliomas are usually, but not always, related to previous exposure to asbestos. Malignant mesothelioma usually infiltrate widely over the pleural surface and may completely encase the lung; the tumor often invades the diaphragm, pericardium and hilar lymph nodes. Cough, chest pain, and weight loss are nearly always present in addition to dyspnea. Bloody pleural effusion containing malignant cells is frequently observed. Prognosis of patients with diffuse malignant mesothelioma is bad.

This 28 year old female patient was transferred to BNUH from local clinic because of bloody pleural effusion of one months duration. On chest film, there was total haziness of left lung due to pleural effusion. After thoracentesis, chest films showed mass-like density by air-contrast in pleural cavity. CT of the chest showed multiply lobulated intrapleural mass with pleural effusion. By pleural needle biopsy, the lesion was confirmed as a malignant mesothelioma.

REFERENCES

- 1) Fisher ER and Hellstrom HR: Periodic acid-schiff reaction as an aid in the identification of mesothelioma. *Cancer* 13:837, 1960
- 2) Urschel HC and Paulsen DL: Mesotheliomas of the pleura. *Ann Thorac Surg* 1:559, 1965
- 3) Wagner JC, Sleggs CA and Marchand P: Diffuse pleural mesothelioma and asbestosis exposure in NW Cape province. *Br J Ind Med* 17:260, 1960
- 4) Newhouse ML and Thompson H: Mesothelioma of the pleura and peritoneum following exposure to asbestosis in the London area. *Br J Ind Med* 22:261, 1965
- 5) Selikoff IJ, Church J and Hammond C: Exposure to asbestos and mesothelioma. *N Engl J Med* 272:560, 1965
- 6) Borow M, Conston A, Livornese LL and Schalet N: Mesothelioma and its association with asbestos. *JAMA* 201:92, 1967
- 7) Wagner JC and Skidmore JW: Asbestos dust deposition and retention in rats. *Ann NY Acad Sci* 132:77, 1965
- 8) Wagner JC: Epidemiology of diffuse mesothelial tumors: evidence of an association from studies in South Africa and United Kingdom. *Ann NY Acad Sci* 132:575, 1965
- 9) Hutchinson WB and Friedenberg MJ: Intrathoracic Mesothelioma. *Radiology* 80:937, 1963
- 10) Hourihane D, Lessof L and Richardson P: Hyaline and calcified pleural plaques as an index of exposure to asbestos: a study of radiological and pathological features of 100 cases with consideration of epidemiology. *Brit Med J* 1:1069, 1966
- 11) Leininger B, Barker W and Langston H: a simplified method for management of malignant pleural effusion, *J Thorac cardiov surg* 58:758, 1969
- 12) Rassmussen K and Faber V: Hyaluronic acid in 247 pleural fluids. *Scand J Resp Dis* 48:366, 1967
- 13) Selikoff I: The occurrence of pleural calcification among asbestos insulation workers. *Ann NY Acad Sci* 132:351, 1965