호흡기 알레르기 질환에서의 혈청 Prostaglandin 농도

서울대학교 의과대학 내과학교실

김 유 영

= Abstract =

Serum Prostaglandin Concentrations in Allergic Respiratory Diseases

You Young Kim, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Seoul National University

The concentrations of serum prostaglandin E and $F_{2\alpha}$ were measured by radioimmunoassay in 18 patients with bronchial asthma, 18 with allergic rhinitis, 17 with bronchial asthma and allergic rhinitis and in 20 normal subjects.

The results were as follows.

1) Serum PGE concentrations were 32.0 ± 5.1 ng/ml in normal subjects and the serum PGE concentrations of bronchial asthma patients with or without allergic rhinitis were lower than those of normal subjects.

2) Serum $PGF_{2\alpha}$ concentrations were 4.4 ± 0.7 ng/ml in normal subjects and there were no differences between the serum $PGF_{2\alpha}$ concentrations of normal subjects and those of bronchial asthma or allergic rhinitis patients.

3) PGE/F ratios were 7.4 ± 1.8 in normal subjects and PGE/F ratios of bronchial asthma or allergic rhinitis were lower than those of normal subjects.

서 론

폐는 Prostaglandin(PG)의 생성 및 대사가 일어나는 중요한 장기중의 하나인데, 정상 생리하에서는 폐내의 PG의 생성, 대사 및 분비가 평형을 유지하고 있으나 그 평형상태는 폐에 대한 여러가지 생리적, 병리적 자극에 의해 쉽게 깨지게 되는데¹⁾, 이에 따라 폐내에서의 병태생리적 반응과정이 전개되겠다.

PGE는 기관지평활근을 이완시키고 $PGF_{2\alpha}$ 는 기관지 평활근을 수축시킨다는 것은 잘 알려져 있는데^{2~4)}, 기관지 천식 환자에서 $PGF_{2\alpha}$ /PGE의 비율이 정상인에서 보다 증가한다는 연구결과나⁵⁾ PGE/ $PGF_{2\alpha}$ 의 비율이 기관지천식환자에서 정상인보다 감소되어 있다는 보고⁶⁾들은 기관지천식환자에서의 기관지의 과민성은 아마도 $PGF_{2\alpha}$ 가 PGE에 비하여 과다하게 생산되거나 PGE가

$PGF_{2\alpha}$ 에 비하여 적게 생성되는데 기인하는 것이 아닌가하는 가설^{4,7)}을 뒷받침하고 있다.

한편 기관지천식과 알레르기성 비염이 같이 있는 환자들을 임상에서 흔히 보게 되는데, 이들중 상당수는 알레르기성 비염이 선행된후 수개월 또는 수년이 지나서 기관지천식이 병발함을 본다. 기관지천식은 기관지의 과민성을 그 특징으로 하는데, 알레르기성 비염의 상당수가 이미 기관지의 과민성을 갖고 있다고 할때⁸⁾ 여기에서 PGE와 $PGF_{2\alpha}$ 의 혈중 농도를 측정해 보는 것이 기관지의 과민성과 PG와의 관계를 알아보는 데 의미가 있을 것으로 생각되어 저자는 기관지천식 및 알레르기성 비염환자에서 혈청 PGE 및 $PGF_{2\alpha}$ 의 농도를 측정하여 정상건강인과 비교 관찰하였다.

대상 및 방법

서울대학교병원 알레르기 내과에 내원하여 기관지 천

식으로 진단된 환자 18명, 알레르기성 비염으로 진단된 환자 18명, 기관지천식과 알레르기성 비염이 같이 있는 환자 17명 및 정상건강인 20명을 대상으로 하였다.

피검자들은 검사전 72시간동안 일체의 약물투여를 금하였으며 채혈은 전주정맥에서 정맥혈 5 ml를 뽑아 실온에서 30분 동안 세워 놓은 후, 3,000 rpm에 5분간 원심분리하여 혈청 1 ml를 채취하여 측정할 때까지 -20°C 에 냉동 보관하였다.

혈청 PGE 및 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 의 농도측정은 Travenol사의 [^3H] PGE 및 [^3H] $\text{PGF}_{2\alpha}$ kit를 사용하여 방사면역 측정하였다.

성 적

정상건강인 및 기관지천식, 알레르기성 비염환자 각각과 기관지천식과 알레르기성 비염이 같이 있는 환자들에서의 혈청 PG의 농도 및 PGE/F ratio는 Table 1에 요약되어 있는데, 혈청 PGE 농도는 정상인에선 $32.0 \pm 5.1 \text{ ng/ml}$ 이고 기관지천식환자 및 알레르기성 비염이 같이 있는 기관지천식환자에서 각각 $21.4 \pm 10.2 \text{ ml}$, $18.7 \pm 8.6 \text{ ng/ml}$ 로 정상인에 비해 유의하게 낮은 농도를 보였다($p < 0.005$).

그러나 알레르기성 비염만 있는 환자에서 $26.3 \pm 12.3 \text{ ng/ml}$ 로 정상인에 비해 낮은 혈청 PGE 농도를 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다($p > 0.05$) (Fig. 1).

혈청 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 농도는 건강인에선 $4.4 \pm 0.7 \text{ ng/ml}$ 이고 기관지천식, 알레르기성 비염, 기관지천식과 알레르기성 비염의 혼합형 환자에서 각각 $4.2 \pm 1.9 \text{ ng/ml}$, $4.5 \pm 1.7 \text{ ng/ml}$, $3.8 \pm 1.5 \text{ ng/ml}$ 로 정상인에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다($p > 0.1$) (Fig. 2).

PGE/F ratio는 정상인에서 7.4 ± 1.8 인데 비해 기관지천식, 알레르기성 비염 및 기관지천식과 알레르기성 비염의 혼합형환자에서 각각 5.1 ± 1.4 , 5.7 ± 1.9 , 4.9 ± 1.5 로 정상인보다 유의하게 감소되어 있었다($p < 0.005$, $p < 0.025$, $p < 0.005$) (Fig. 3).

고 안

Arachidonic acid로부터 PG를 전환시키는 효소인 cyclo-oxygenase는 인체의 거의 모든 장기에 다 존재하고 있으나 특히 폐, 신장, 정선(seminal gland)에서 PG를 생성하는 능력이 아주 큰 것으로 알려져있다⁹⁾.

PG는 폐에서 쉽게 생성되고 이중 일부는 전신순환계로 분비되기 때문에 폐는 일종의 내분비장기로 인정될 수 있고^{10,11)}, 또 15-hydroxy PG dehydrogenase (PGDH)의 활성이 높기 때문에 PG의 대사장기로써도 폐는 중요한 역할을 한다.

PG에 대한 폐내의 혈관 및 기도반응은 정상생리하에서나 병태생리상 모두 중요한 의미를 갖는데 이는 PG에 대한 반응도가 다른 혈관활성 물질에 대한 반응도 보다 훨씬 크기 때문이다¹²⁾.

Table 1. Serum PG concentrations (ng/ml) and PGE/F ratios in normal subjects and allergic respiratory disease patients

	Normal	Bronchial asthma	Allergic rhinitis	B.A.+A.R.
PGE				
Mean $\pm$ SD	32.0 ± 5.1	21.4 ± 10.2	26.3 ± 12.3	18.7 ± 8.6
Sample size	20	18	18	17
P*		<0.005	>0.05	<0.005
$\text{PGF}_{2\alpha}$				
Mean $\pm$ SD	4.4 ± 0.7	4.2 ± 1.9	4.5 ± 1.7	3.8 ± 1.5
Sample size	20	18	18	17
P*		>0.1	>0.1	>0.1
PGE/F				
Mean $\pm$ SD	7.4 ± 1.8	5.1 ± 1.4	5.7 ± 1.9	4.9 ± 1.5
Sample size	20	18	18	17
P*		<0.005	<0.025	<0.005

* Student's t test

Fig. 1. Serum PGE concentrations in normal subjects and allergic respiratory disease patients.

Fig. 2. Serum PGF_{2α} concentrations in normal subjects and allergic respiratory disease patients

PGE는 기관지평활근을 이완시키고 PGF_{2α}는 기관지 평활근을 수축시킨다는 사실^{2~4)}과 기관지천식환자에서 PGF/E ratio가 증가하거나 PGE/F ratio가 감소한다는 연구결과^{5,6)}들은 기관지천식에서의 기관지의 과민성과 PGE나 PGF의 과소 혹은 과다생성과의 상호관계를 꾸준히 시사하고 있는데 본 실험에서 기관지천

Fig. 3. PGE/F ratios in normal subjects and allergic respiratory disease patients.

식환자뿐 아니라 알레르기성 비염환자에서도 PGE/F ratio가 감소되어 있는 점으로 보아 알레르기성 비염에서 기관지천식으로 진전되는 것은 이미 이들이 기관지의 과민성을 갖고 있다가 적당한 시기에 기관지천식을 발현하는 것이 아닌가 생각된다.

저자가 이미 지적했듯이⁶⁾ 기관지천식 환자에서의 혈중 PG 농도에 관한 측정치들이 보고자에 따라 다른 것은 첫째 피검물이 혈청이나 혹은 혈장인가에 따른 차이와 둘째 검사방법의 차이에 의한 것이 아닌가 한다.

앞으로 arachidonic acid의 cyclo-oxygenase 대사산물(PG)뿐 아니라 lipoygenase 대사산물인 leukotriene(SRS-A의 구성성분)계의 구조나 그 작용을 이해하는 것이 기관지천식등의 알레르기 질환을 이해하는데 관건이 될 수 있겠는데, 이를 위해서 cyclo-oxygenase계와 lipoygenase계의 생성, 대사, 분비 및 작용효과에 대한 선택적 억제제의 출현을 기대해 본다.

결 론

기관지천식환자 18명, 알레르기성 비염환자 18명, 기관지천식과 알레르기성 비염이 같이 있는 환자 17명 및 건강정상인 20명을 대상으로 혈청 PGE 및 PGF_{2α} 농도를 측정하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 혈청 PGE 농도는 정상인에선 32.0 ± 5.1 ng/ml 이

있고 기관지천식, 알레르기성비염 및 양자 혼합형환자에서 각각 21.4 ± 10.2 ng/ml, 26.3 ± 12.3 ng/ml, 18.7 ± 8.6 ng/ml로 기관지천식 및 양자 혼합형환자에서 정상인에 비해 감소되어 있었다.

2) 혈청 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 농도는 정상인에선 4.4 ± 0.7 ng/ml 이었고 기관지천식, 알레르기성비염, 양자 혼합형환자에서 각각 4.2 ± 1.9 ng/ml, 4.5 ± 1.7 ng/ml, 3.8 ± 1.5 ng/ml로 정상인과 차이가 없었다.

3) PGE/F ratio는 정상인에선 7.4 ± 1.8 이었고 기관지천식, 알레르기성비염, 양자혼합형에서 각각 5.1 ± 1.4 , 5.7 ± 1.9 , 4.9 ± 1.5 로 정상인에 비해 감소되어 있었다.

REFERENCES

- 1) Hyman, A.L., Spannhake, E.W. and Kadowitz, P.J.: Prostaglandins and the lung. *Am. Rev. Resp. Dis.*, **117**:111, 1978.
- 2) Sweatman, W.J.F. and Collier, H.O.J.: Effects of prostaglandin on human bronchial muscle. *Nature*, **217**:69, 1968.
- 3) Cuthbert, M.F.: Bronchodilator activity of aerosols of prostaglandin E_1 and E_2 in asthmatic subjects. *Proc. R. Soc. Med.*, **64**:15, 1971.
- 4) Mathé A.A., Hedqvist, P., Holmgren, A., and Svanborg, N.: Bronchial hyperreactivity to prostaglandin $\text{F}_{2\alpha}$ and histamine in patients with asthma. *Br. Med. J.*, **1**:193, 1973.
- 5) Nemoto, T., Aoki, H., Ike, A., Yamada, K., Kondo, T., Kobayashi, S. and Inagawa, T.: Serum prostaglandin levels in asthmatic patients. *J. Allergy Clin. Immunol.*, **57**:89, 1976.
- 6) 김유영, 강석영 : 한국인 기관지천식 환자의 혈중 Prostaglandin 농도에 관한 연구. *알레르기*, **2**:1, 1982.
- 7) Horton, E.W.: Hypothesis on physiological roles of prostaglandins. *Physiol. Rev.*, **49**:122, 1969.
- 8) Townley, R.G., Bewtra, A.K., Nair, N.M., Brodkey, F.D. and Burke, K.M.: Methacholine inhalation challenge studies. *J. Allergy Clin. Immunol.*, **64**:569, 1979.
- 9) Christ, E.J. and Van Dorp, D.A.: Comparative aspects of prostaglandins. *Adv. Biosci.*, **9**:35, 1972.
- 10) Vane, J.R.: The role of the lungs in metabolism of vasoactive substances. In Teorell, T., Dedrick, R.L. and Condliffe, P.G., eds.: *Pharmacology and Pharmacokinetics*. Plenum, New York, pp. 195-207, 1972.
- 11) Bahkle, Y.S. and Vane, J.R.: Pharmacokinetic function of the pulmonary circulation. *Physiol. Rev.*, **54**:1007 1974.
- 12) Goetzl, E.J.: Oxygenation products of arachidonic acid as mediators of hypersensitivity and inflammation. *Med. Clin. North Am.*, **65**:809, 1981.