結核性肺空洞에 對한 人工氣腹의 治効

(1956. 5. 27 第4次大韓結核協會學術大會에서 發表)

丁 佑 鎭

緒 言

筆者는 這間에 「人工氣腹後의 肺空洞, 特히 上野部病巢의 X線上變化」에 對하여 記述한바 있을뿐 아니라 肺結核, 特히 結核性肺空洞에 對하여 人工氣腹이 有効하다 함은 이미 世上이 周知하는 바이며 또 이것이 얼마의 期間에 어느 程度의 效果를 내느냐? 함에 對하여도 이미 先輩들의 많은 文獻에 依하여 알수 없는바는 아니나 아직 經驗이 얕은 우리들이 直接 經驗한바를 살펴봄은 追試의 意味에서도 決코 無用한 일은 아닐 것이다. 이에 筆者가 前者(本誌第2卷第1號)에 發表한 39例와 아울러 그후 繼續 經驗한 바에서 가장 確然한 症例로서 材料가 蒐集된 것만을 주려서 前者에 發表한것에 追加報告의 意味로 簡略히 綜合記述하여 同學 諸彦의 批判을 바라는바이다.

症 例

演者가 昨年6월에 發表한 39例와 그후로부터 다시 今年3월까지 10個月間에 새로이 施行한 24例를 合하면 總數 63例로서 後者의 成績을 본다면 이도 또한 大體로 前者의 그것과 別로 크게 다름이 없으므로 이에 對하여는 省略하고 다만 兩者中에서 X-ray 其他 檢索이 比較的 體系있게 蒐集된 것만을 간주려서 綜合적으로 集計한것이 다음의 附圖과 같다.

第 1 例 安○世 男 38歲

A. 發病當時

(早期咯血時)

B. 大咯血後, 惡化

C. 氣腹 15個月

D. 氣腹中止 2個月

第 2 例 尹○求 男 42歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個年

第 3 例 金○海 男 24歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個月

C. 氣腹施行 5個月

D. 氣腹中止後 8個月

第4例 尹○榮 男 18歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個月

C. 再發 氣腹施行前

D. 再氣腹施行 6個月

第5例 崔○範 男 21歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個月

第6例 金○順 女 18歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個月

第7例 金○俊 男 32歲

A. 氣腹施行前

B. 氣腹施行 1個月

第8例 李○昊 男 31歲

A.

B.

第1例 安○世 36歲 車務轉手

從來 無自覺症인 健全한 體腦者로서 職務遂行中에 小量의 咯血을 보고서 X-ray檢査에 依하여 結核性肺空洞의 診斷(A圖)일에 化學療法(以下 化療라고 略함)만으로 治療途中 다시 大咯血로 말미아마 再惡化(B圖)하여 비로소 安靜과 아울러 月餘間 化療後에 氣腹施行 8個月만에 空洞이 完全히 閉鎖되었고 繼續 16個月(C圖) 施術하였으나 그間에 生計難으로 全然 쉬지않고 職務遂行中에 右側鼠蹊「헤르니아」가 併發되어 手術中에 約 1個月間 靜養과 同時에 氣腹을 中斷하였으나 有効(D圖).

第2例 尹○求 42歲 會社員

發病後 數年來 化療中 時時로 少量의 血痰과 頑強한 微熱과 恒時 消化障礙로 呻吟하였으나 氣腹單一療法만으로써 12個月만에 空洞이 完全히 閉鎖된지 6個月에 氣腹中斷 有効.

第3例 金○海 24歲 家庭婦人

發病後 年餘에 걸쳐 家庭에서 化療中 妊娠으로 말미아마 惡化되어 大咯血(A圖)로 비로소 놀래서 氣腹併行 2個月餘에 兩個의 大空洞이 完全閉鎖(B圖), 5個月間持續後(C圖)에 氣腹中斷 化療만으로 一般家事에 從事(D圖)有効.

第4例 尹○榮 18歲 高校生

數年前發病 時時로 咯血및 微熱과 咯痰으로 病勢 漸次 惡化(A圖), 化療및 氣腹併行하였으나 每次 一時的 好轉될적마다 治療를 中斷, 再三反復(C圖)하였으나 約一個年에 空洞은 完全히 閉鎖(D圖)되었고 于今 學業을 쉬지않고 高校를 마쳤으며 다시 大學에 進學코자 準備中.

第5例 崔○範 21歲 高校生

數個月前 咯血로 發病하여(A圖) 氣腹과 化療併行으로 不過月餘에 空洞은 完全히 閉鎖

(B圖)되었고 그후 3個月에 氣腹中斷. 有効.

第6例 金○順 18歲 女高生

發病後 數月間 高熱, 咯血, 咯痰 등으로 重態(A圖)였으나 一時 化療만으로 一般 症候의 好轉됨을 기다려서 氣腹併行, 不過 月餘에 空洞은 完全閉鎖되었고 氣腹繼續5個月後에 化療만으로 自宅療法 約1個年인 今日에 健康이 더욱 增進 有効(C圖).

第7例 金○俊 32歲 警察官

全然 無自覺症인中에 偶然 咯血로 發病(A圖)하여 化療와 氣腹併行 1個月에 空洞은 完全히 閉鎖되었고 그후 1個月에 氣腹中止 有効(B圖).

第8例 李○昊 31歲 大學生

數年前發病, 時時로 咯血과 咯痰이 反復될 뿐, 그밖에 아무런 自覺症이 없고 다만 X-ray 檢査(A圖)에 依하여 在肺上野에 2個所의 增殖性空洞이 有함으로 化療와 氣腹併行 8個月에 別無差効(B圖)일뿐아니라 咯血과 Gaffky의 不變動으로 無効로 判定코 外科手術을 받기로 轉醫 無効.

總 括

筆者가 1953年末부터 1956年3月까지 2個年 4個月에 都合 63例의 結核性肺空洞患者에 人工氣腹을 施行한 成績을 總括하면 約 $\frac{1}{3}$ 은 氣

腹이 完成되기도 前에 中斷함으로 그成果는 全然不明이며 나머지 $\frac{2}{3}$ 에서도 그殆半이 또한 施術途中에 治療를 中斷함으로써 確然한 効果를 알길이 없었으니 이는 患者가 本療法에 對한 認識不足과 多少의 副作用의 피로움으로 말미암아 無誠意한 탓에 基因한것이 어니와 長期間에 끈기있게 繼續한 나머지 $\frac{1}{3}$ 은 一部分의 重態患者와 陳舊性增殖型을 除外하고는 짧은 月餘에, 길어도 年內에 空洞이 閉鎖되며 Gaffky가 陰轉되고 赤沈도 健康値로 回復되나 病型이 新鮮한 수록 더욱 有効하며 空洞의 部位에 關係없이 肋膜의 癒着이 없는 限 有効하나 다만 長期間 끈기있게 持續하지 않음이 가장 效果를 보지못하게되는 主因이 된다고 믿는다.

結 言

演者가 2個年4個月間에 施行한 67例의 結核性肺空洞에 對한 人工氣腹의 效果는 陳舊性增殖性病型이 아닌以上 끈기있게 持續한다면 舉皆가 有効한 成果를 얻을수 있으리라고 믿으며 따라서 아직껏 肺外科가 널리 施行되지 못하는 우리나라의 現實에서는 肺空洞에 對하여는 可及의 早期에 部位에 關係치않고 躊躇 없이 人工氣腹을 施行함으로써 많은 成果를 얻을수 있을것으로 믿는다.

結核性肺空洞에 對한 人工氣腹의 治効例

順位	症 例	初診	診 斷	主 訴	治療前 Goffky 및 赤沈	氣腹開 始 年 月 日	空洞閉 鎖 期間	氣腹施 行 期間	氣腹後 (中止) 觀察 期間	治療後의 Goffky 및 赤沈 値	判 定
No. 1	安 ○ 世 合 36歲	4286 7.14	混合型空洞	咯血, 微熱, 咯痰	卅 120mm	4287 2.13	8個月	16個月	8個月	— 8mm	有 効
No. 2	尹 ○ 求 合 42歲	4287 6.5	纖維性增殖型	血痰, 微熱, 消化障礙	十 100mm	4287 6.5	12個月	18個月	9個月	— 10mm	有 効
No. 3	金 ○ 海 女 24歲	4287 11.26	混合型空洞	咯血, 有熱, 咯痰	十 116mm	4287 12.9	1個月	5個月	11個月	— 4mm	有 効
No. 4	尹 ○ 榮 合 18歲	4287 12.3	混合型空洞	咯血, 微熱	卅 96mm	4288 1.13	12個月	13個月		— 8mm	有 効
No. 5	崔 ○ 範 合 21歲	4288 1.13	滲出型空洞	咯血, 微熱, 咯痰	卅 84mm	4288 1.13	1個月	3個月	10個月	— 8mm	有 効

No. 6	金 ○ 順	4287	渗出型空洞	咯血, 高熱 咯痰	卮	4288	1個月	5個月	11個月	—	有 効
	우 18歲	11.23									
No. 7	金 ○ 俊	4288	增殖型空洞	咯血, 微熱,	十	4288	1個月		7個月	—	有 効
	송 32歲	6.21									
No. 8	李 ○ 昊	4287	增殖型空洞	咯血	卮	4287		8個月		+	無 効
	송 31歲	3.10									
					120mm	12.12				6mm	
					36mm	7.3				4mm	
					66mm	3.20				50mm	

但, 以上 내가 經驗한 症例는 全部가 다 外來通院患者였음으로 安靜을 지키지 못한것은 勿論이며 그中에서도 第1例는 추력運轉手로서 長期治療中에도 每日 長距離運轉으로 말미아 마 鼠蹊에 針을 併發시켰으나 結局 肺空洞은 完治된것과같이 重態의 渗出性病型이 아닌

以上 반드시 絕對安靜을 지키지않어도 外來通院治療로도 能히 所期의 效果를 얻을 수 있다 고 믿는다.

經驗期間이 不過 2 個年餘임으로 遠隔成績에 對하여는 言及할수 없음이 遺憾이다.

Artificial Pneumoperitoneum for Tuberculous Cavities of the Lung

Wu Jin Chung, M. D.

Seoul, Korea

67 cases of tuberculous cavities treated by pneumoperitoneum during the past 28 months were presented.

It is found that, unless the lesion was old productive type, the majority of cavities responded favorably to sustained pneumoperitoneum. It is felt that in Korea where there are limited facilities for pulmonary surgery, those cavities should be treated with pneumoperitoneum as early as possible regardless of the location of the cavities.

These cases reported were all treated on outpatient basis and consequently with-

hout bed rest.

The first case was a truck-driver who continued to carry out his daily work to the extent of developing an inguinal hernia. In this case the cavity disappeared completely and from this it is apparent that, unless the lesion is a serious exudative type, it is possible to attain satisfactory results without bed rest.

This experience covers only the past two years and, consequently, it is impossible to deduce the long term results from this study.

學徒結核集團檢診의 統計的觀察(第二報)

(1956. 5. 7. 第4次大韓結核協會學術大會에서 發表)

國立中央結核院豫防部

金 錫 根 · 韓 膺 洙

緒 論

우리나라의 結核實態를 把握하는에는 全國的인 結核死亡者 結核患者等의 實情을 잘 알고 特定地區住民 또는 特定集團에 對한 調查成績等에 對해서 仔細한 檢討를 加한 後에 判斷하는 것이 順序일 것이며 더욱 可能하면 全國的으로 같은 時期에 같은 方法으로 結核의 實態를 把握하기 爲한 特別한 調查를 行한 後에 그結果를 檢討判斷하여야 할것이다. 然이나 이러한 全國的인 實態調查를 實施하는에는 첫째로 豫算, 人員, 設備, 資材等은 勿論이요 그 調查自體의 科學的인 同時에 精度가 높은 調查方法 調查對象 成績判定基準等을 作成하는에 困難性이 많어 오늘날까지 그總體的인 實施를 보지 못하고 地域的으로 또는 集團體單位로서만 實施하여 왔다. 現在도 全國各地에서 本事業이 以前에 比해서 相當히 活潑히 實施는 되고 있으나 大部分이 地域別로 또는 集團體別로만 實施되고있는 實情이다. 앞으로 本事業이 어느程度 軌道에 오르게 되면 全國的인 結核實態調查를 爲한 本格的인 本事業이 實施될 것으로 期待된다. 서울特別市地區에서도 學徒를 主로한 本檢診事業이 現在 進行中에 있으며 演者는 于先 그中集計가完了된 二個의 男女中高等學校學徒들에 對한 本檢診成績을 比較考察하여 이에 報告코져한다. 本檢診成績은 直接本院에서 實施한後 集計된 成績이다.

檢 診 對 象

서울特別市 { 男子中高等學校 1個校; 2,162名
 { 女子中高等學校 1個校; 1,280名
 計 ; 3,442名

檢 診 方 法

各集團의 全員에 “튜버큐린”皮內反應을 實施하여 48時間後에 戶田氏方法에 依하여 判定하여 發赤이 0~4mm까지를 陰性, 5~9mm를 疑陽性, 10mm 以上을 陽性으로 하였다. “Tuberculin”은 2000倍의 O.T(中央防疫研究所製)를 使用하였다.

다음에 集團體全員에게 (Tuberculin反應結果를 不問하고) 間接撮影을 實施하여 X線上에 異常한 陰性이 나타나 有所見者로 보이는 者에게는 直接撮影을 實施하고 寫眞의 判讀은 結核專門醫 三人以上 合席下에 N.T.A. 分類法에 依據하여 分類集計하였으며 結核의 有所見者에 對해서는 喀痰檢査를 實施하고 指導區分에 있어서는 要監視者와 要治療者로 區分하였다.

要監視者: X線像, 胸部의 形態學的病變部所見에 있어서 Probably Inactive(非活動性으로推定)에 該當되는 것으로 直接治療는 必要치 않으나 休養 또는 注意를 要하는者 N.T.A. 分類法에 依한 Suspected T.B(類似結核)나 probably Non T.B(非結核性으로推定)에 該當된다. (Cardiac change pleural change Other changes)

要治療者: 胸部의 病變部所見에 있어서 probably active(活動性으로推定)에 該當되는 것으로 直接治療를 必要로하는 者이며 N.T.A分類法에 依한 Suggestive of T.B(結核症)에 該當된다.

檢診成績의 統計的觀察

(1) 檢診對象者人員構成
男子; 2,162名

女子; 1,280名
計 3,442名

(2) 年齡構成

檢診對象이 男女中高等學校學徒이였음으로 15~16歲를 最高로 하여 12歲부터 23歲까지 分布되어 있으며 年齡構成表를 作成하여보면 別表1과 같다.

第1表 男女別年齡構成表

(3) 檢診對象者の受診率

集團體의 檢診對象者の 檢診에 應하는 受診率은 大體로 良好하였으며 Tuberculin 檢査에 있어서 99.24% X線檢査에 있어서 99.48%의 高率을 보여 주었다.

이는 本事業實施直前に 結核에 對한 徹底한 認識을 주기爲한 保健敎育을 實施함으로서 對象學校側의 積極的인 協助을 얻어 이만한 成果를 達한것으로 生覺된다. 各受診率은 (別表2와 같다.)

(4) 튜버큐린反應陽性率

別表 3. 參照; 男子에 있어서는 89.28% 女子에 있어서는 87.10%, 計 88.47%의 高率의 陽性率을 보여 주었다.

(5) 陽性者の精密判定(男子被檢限함)

+; 24.38% ++; 26.72% +++; 23.13%
 +++; 15.90% ++++, B. N, 9.88. %

第4表. 參照 (+); 10~14mm
 {B: 水泡} (H); 15~19mm
 {N: 壞死} (HH); 20~29mm
 (HHH); 30~mm以上

第3表 튜버큐린反應檢査成績表(서울市內中高等學校二國校)

種別 年齡別	-		土		+		計		% 合	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
12	1	21	—	1	5	142	6	164	83.33	82.93
13	17	20	3	—	118	154	138	174	85.51	88.51
14	28	20	3	2	264	195	295	217	89.49	89.86
5	28	19	3	1	301	169	332	189	90.66	89.42

第2表 檢診對象者の受診率

事項 種別	在籍者數		受診者總數		% 男	
	男	女	男	女	男	女
튜버큐린反應檢査	2,178	1,282	2,155	1,279	98.94	99.75
計	3,460		3,434		99.24%	
X線撮影檢査	2,178	1,282	2,162	1,280	99.27	99.84
計	3,460		3,442		99.48%	

16	39	21	4	7	314	130	357	158	87.95	86.68
17	40	24	4	6	309	184	353	214	87.54	85.98
18	29	15	3	3	256	103	288	121	88.89	85.12
19	15	4	1	1	222	36	238	41	93.28	87.80
20	10	—	2	—	106	1	118	1	89.83	100
21	1	—	—	—	22	—	23	—	95.65	—
22	—	—	—	—	4	—	4	—	100.00	—
23	—	—	—	—	3	—	3	—	100.00	—
計	208	144	23	21	1,924	1,114	2,155	1,279	—	—
性 別	%	9.65%	11.26%	1.07%	1.64%	89.28%	87.10%	—	—	—
%					3,038	(6847)%	3,434			

第4表 류버린反應檢査陽性者精密判定表

(男子中高校)

種別	+	±	卅	卅	卅	B.N	計
年齡別							
12	—	1	3	1	—	—	5
13	25	33	33	17	10	—	118
14	82	67	48	35	32	—	264
15	90	66	89	38	18	—	301
16	87	86	58	54	29	—	314
17	68	81	59	72	29	—	309
18	50	85	64	34	23	—	256
19	40	63	63	23	23	—	222
20	25	20	18	23	15	—	106
21	2	12	4	1	3	—	22
22	—	—	1	2	1	—	4
23	—	—	—	1	2	—	3
計	469	514	445	306	190	—	1924
%	24.38	26.72	23.13	15.90	9.88	—	

(6) 結核有所見者에 있어서의 류反應檢査成績
第5表 參照

結核의 有所見者 147名中, (-)3.40% (±) 2.72%, (+)93.88%로 大部分이 陽性으로 나오고 있다.

(7) 류反檢査와 結核有所見者와의 相關
第6表 參照.

總檢査人員 3,434名中 88.47%에 該當되는 3,038名이 陽性反應인데 그中 4.54%의 138名이 結核의 有所見者였다.

第5表 結核有所見者에 있어서의 류버린反應檢査成績表

種別	區分 性別	一		±		+		計	
		男	女	男	女	男	女	男	女
單純石灰化		1	—	1	3	41	29	43	32

結 核 症	1	2	—	—	17	21	18	23
中 等 症	1	—	—	—	5	4	6	4
重 症	—	—	—	—	3	2	3	2
疑似結核症	—	—	—	—	8	8	8	8
小 計	3	2	1	3	74	64	78	69
計	5	4			138			147
%	3.40	2.72			93.88			

第6表 Tuberculin反應檢査와 結核有所見者의 相關

事項	檢 査 總 員 數	"T" (+) 數	結 核 有 所 見 者	"T" (±) 數	結 核 有 所 見 者	"T" (-) 數	結 核 有 所 見 者
性別							
男	2,155	1,924	74	23	1	208	3
女	1,279	1,114	64	21	3	144	2
計	3,434	3,038	138	44	4	352	5
%	—	88.47	4.54	—	9.10	—	1.42

(8) B. C. G接種與否狀況

第7表 參照

非接種群이 73.53%로 大部分이고 接種群이 17.89% 不明群이 8.53%로 接種群에 있어서 는 1回接種群이 가장 많았다.

(9) 結核有所見者에 있어서의 B. C. G 接種與否狀況

第3表 參照

○接種을 받은者中에서; 0.14%(1名)

○接種을 받지 않은者 5.43%(138名)

○不明者: 2.70%(8名)

第7表 BCG接種與否狀況

事 項 別	總 數	非接種者	%	接 種 者					不 明 者	數
				1 回	2 回	3 回	總 數	%		
男	2,178	1,578	72.45	288	59	18	365	16.76	235	11.76
女	1,282	966	75.35	195	46	13	254	19.81	62	5.84
計	3,460	2,544	73.53	483	105	31	619	17.89	297	8.58

第8表 結核有所見者에 있어서의 BCG接種與否狀況

種 別 所見別	總 數		接 種 을 받 은 者		接 種 을 받 지 않 은 者		不 明 者	
	3,460		619		2,544		297	
姓 別	男	女	男	女	男	女	男	女
單純石灰化	43	32	—	—	42	30	1	2
結 核 症	18	23	—	1	16	20	1	3
輕 症	6	4	—	—	6	4	—	—
中 等 症	3	2	—	—	3	2	—	—
重 症	8	8	—	—	8	7	—	—
疑似結核症	78	69	—	1	75	63	2	6
計	147	1	138	8				
總 數	147	1	138	8				
全體에 對한%	—	0.13%	5.43%	2.70%				

(10) 間接影攝狀況表 第9表 參照

第9表 間接影攝狀況表 (60mm Film)

事 項 別	在箱者數	間接 攝影者數	要直接 攝影者數	未 參者數	直接攝影 者實數
男子中高校	2,178	2,162	189	13	176
女子中高校	1,282	1,280	112	0	112
計	3,460	3,442	301	13	288

(12) 罹病率

男子에 있어서는 1.62% 女子에 있어서는 2.89%로 女子에 있어서 若干高率이었고 平均年令別로 보면 男女 共히 年齡의 增加에 따라 率의 上昇을 볼수 있으며 受診者數, 有所見者數의 小數인 境遇에 있어서 그罹病率이 高率로 나타나고 있음은 男女共히 別意義가 없다고 生覺한다. (第11, 12, 13 表; 參照)

(11) 直接攝影結果集計表 第10表 參照

第10表 直接攝影結果集計表

事 項 別	間接攝 影者數	直接核 影者數	正 常 (陰性)(A)	寫眞不眞 (B)	單純石 灰化 (C)	結 核 症 (D)			疑似結 核 症 (E)	非結核 病(其他 病變)(F)	診 斷 保 留 (G)
						輕症	中等症	重症			
男子中高	2,162	176	96	2	43	18	6	3	8	1	—
女子中高	1,280	112	42	1	32	23	4	2	8	—	—
小 計	3,442	288	138	3	75	41	10	5	16	1	—
總 計	3,442	288	138	3	75	56			16	1	—
%	—	—	—	—	2.18%	1.63%			0.46	—	—

第11表 (X線變形, 年令別, 性別總括表) (男, 女中高等學校二個校)

性 別 年 令 別	男				女				計			
	受檢者數	有所見者數	罹病者數	罹病率	受檢者數	有所見者數	罹病者數	罹病率	受檢者數	有所見者數	罹病者數	罹病率
12	11	—	—	—	158	4	1	0.63	169	4	1	0.49
13	138	3	1	0.72	184	2	3	1.63	322	5	4	1.24
14	295	13	2	0.68	227	6	5	2.20	522	19	7	1.34
15	334	12	4	1.20	189	13	7	3.70	523	25	11	2.10
16	359	4	4	1.11	165	14	5	3.03	524	18	9	1.72
17	353	9	5	1.42	192	16	7	3.65	545	25	12	2.20
18	283	22	9	3.18	123	9	6	4.88	406	31	15	3.69
19	238	8	6	2.52	41	5	3	7.32	279	13	9	3.23
20	118	4	3	2.54	1	—	—	—	119	4	3	2.52
21	23	3	1	4.35	—	—	—	—	23	3	1	4.35
22	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
23	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
計	2,162	78	35	1.62	1,280	69	37	2.89	3,442	147	72	2.09

第12表 病率率曲線 (對受診者全員)

(3) 喀痰檢查

結核의 有所見者全員에게 喀痰檢查를 實施코저 痰을 받아 오도록 指示했으나 제대로 받아오는 者가 極小數이었음으로 直接對象學校에 出頭해서 朝會後에 有所見者를 呼名하여 喀痰을 採取하여 直接塗沫法(Gabbet氏法)으로 檢出코저 했으나 男子校 有所見者 78名中 全員이 陰性으로 나왔으며 이成績은 勿論 痰採取方法自體의 未備한點도 있겠지만 역시 集團檢診을 통한 結核의 有所見者에 對한 喀痰檢查는 集團 또는 培養을 하여야만 正確할것이며 本觀察에서 그러한 精密한 檢査를 못하였음은 遺憾스러운 事實이었다.

(14) 結核有所見者의 指導區分 指示率

第XIV表

姓 別	男	女	計	%
受診者總數	2,162	1,280	3,442	—
有所見者數	78	69	147	4.27
要監視者	8	8	16	0.46
要治療者	27	29	56	1.63

第13表 X線所見率及結核患者發見率

事 項 姓 別	受檢者數	X線所見率	(罹病率) 結核患者發見率
男	2,162	3.60%	1.62%
女	1,280	5.38%	2.89%
計	3,442	4.27%	2.09%

別表; 14
參照

考 察

本集團檢診成績은 檢診方法에 있어서 對象集團을 任意로 選定實施하였고 또한 特定年令層에 屬하는 對象者에 限해서 實施하였으므로 그나타난 成績의 實測值을 直接全般的인 結核

動態에 引用論할 수는 없으나 特殊集團體에 對한 檢診成績을 結核實態의 一部로써는 取扱할 수 있을것이다. 이를 以前에 우리나라에서 : 는 日本에서 發表된 本檢診成績과 比較考察하면 다음과 같다. 別紙15 參照.

第15表 中高等學校學徒群에 對한 比較考察

年 度 事 項 實施者	1944~19491	11953~1954	1955	1956	1954
	趙重參氏及共同研究者	三部(國防文敎保健)合同	中央結核院	今般成績(本院)	結核豫防會
總 數	18,489	108,824	6,279	3,442	28,423
有 所 見 者	1,359	1,415	179	147	991
%	7.35	1.30	2.85	4.27	3.48
罹 病 者 數	299	772	37	72	420
%	1.62	0.72	0.59	2.09	1.48
地 域 別	主로都市	都市及農村	都市及農村	都 市	都 市

結 論

①約 3,400名の 都市(서울特別市) 中高等學校 學徒에 對하여 結核集團檢診을 實施했다.

②檢診對象者의 受診率은 99.48%로 相當히 高率로 成績이 良好했다,

③“Tuberculin”反應陽性率은 男女別로 別差異가 없으며 88.47%의 高率을 보여 주었다.

④X線撮影檢査에 依한 結核의 有所見率은

4.27% 罹病率은 2.09%로 中高等學校 學徒層에 있어서도 男女共히 年齡의 增加에따라 漸次 一定한 上昇傾向을 보여 주었다.

⑤結核有所見者의 指導區分指示率은 有所見者 總數 147名中, 10.83%인 16名이 要監視者이었고 38.10%인 56名이要治療者이었으며 앞으로 學徒들에 對한 集團檢診이 徹底히 實施되면 相當數의 患者가 發見될 것임으로 더욱 檢診內容의 充實과 結核學徒를 爲한 治療設備의 必要性을 痛感한다.

Conclusion

Suk Keun Kim, M. D. · Eung soo Han, M. D., FCCP

National TB center
Seoul, Korea

1) There had been performed the TB Mass Survey for 3,442. students of middle and high schools in Seoul, the capital of this country.

2) Rate of the surveyed to the expected for the campaign was 99.48% and this showed good results. The remarkable number of students had Participated the campaign and showed their understanding and cooperation for this purpose.

3) Positive rate in the Tuberculin Test showed 88.47%, which is fairly high, however, the rate by sex was found no considerable difference.

4) 4.27% pulmonary TB cases. (suspected TB, suggestive TB) and 2.09% active TB cases were found through the campaign. The rates revealed the gradual increase by that of students age, no difference by their sex.

5). Classified 147, of the pulmonary TB cases, (suspected TB, suggestive TB) are needed medical supervision, and 56(38.10%) need treatment.

Considerable Number of TB cases are expected to be found as continuing the

campagin.

Therefore, it is necessary to strength the TB mass survey and the provide sufficient facilities for treatment of TB cases in the present and future campaign.

(Author' Abstracts)