肺結核通院治療에 隨伴되는 諸般問題

家庭訪問을 中心으로

(1956年5月27日 第4次大韓結核協會學術大會에서 發表)

國立中央結核院

李 灌 熙 · 邊 海 元 · 韓 膺 洙

I. 緒 論

우리나라의 結核實情으로 보아, 肺結核의 通院治療은 不可避한 것이고, 또한 그것을 通院制度下에서 治療함에 있어서 가장 問題가 되는 것은 患者의 家庭療養일 것이다.

即 結核을 治療함에 있어서 그것을 藥物療法에만 依存할수는 없는 것이며, 여기에 安靜을 基盤으로 하는 科學的인 療養生活이 加해져야 한다는 것은 다 아는 事實이다.

또한 結核을 家庭에서 治療함에 있어서, 患者의 治療效果問題는 고사하고라도, 患者自身이 늘 感染源이 되고 있다는 點에 비추어, 다른 健康한 家族들에 對한 感染乃至 發病의 防止는 소홀히 生覺할수 없는 重要한 問題의 하나일 것이다.

이러한 理由로서 結核의 家庭治療에 있어서 患者는 勿論 그의 家族들의 絶對的인 協助가 없이는 所期의 成果를 期待하기 어려울 것이며, 患者乃至 家族들에 對한 家庭療養指導 結核常識의 啓蒙 家族들에 對한 健康診斷等等이 切實히 要求되는 것이다. 本院에서는 관 푸렛 리후렛 등의 印刷物, 또는 通院患者指導會 家庭訪問 등을 通해서 積極 啓蒙指導에 힘쓰고 있으며 그중에서도 特히 家庭訪問을 通해서 直接 患者 또는 그의 家族에 對하여 家庭療養에 必要한 여러가지 問題를 指導하고 있다.

家庭訪問을 通해서 患者의 家庭狀態 自宅療養狀態 및 家族들에 對한 結核檢診을 施行하였음으로 여기에 報告하는 바이다.

II. 材料 及 方法

저음 活動性結核으로 診斷된 患者로 하여금 所定의 家庭訪問카드裏面에 患者의 집 略圖를 그리게 한다음 이 略圖에 依해서 家庭訪問을 實施하여 家庭療養에 必要한 諸般問題를 指導하는 한편 患者의 家庭狀態에 關하여 可及的 疫學的인 見地에서 調查하였다. 家庭訪問은 本院에서 가까운 곳을 優先으로 施行하고 그중에서도 開放性患者의 家庭을 먼저 訪問하는 것을 原則으로 하였다. 또한 患者家族 全員에게 2000倍 O. T. 를 施行하고, 滿48時間 만에 再次 訪問하여 그것을 判定하는 同時에 陽性者에게는 來院하여 X線檢査를 陰性者에게는 來院하여 B. C. G. 를 接種하도록 勸告하였다.

患者家族들에 對한 結核檢診은 今年初부터 實施하였으며 4 月末現在로 總訪問件數는 325件으로 그중 初訪問이 100件 再訪問이 225件이다.

이들 初訪問에 該當하는 100件을 性別로 보면 男子가 72, 女子가 28이며 診斷別로 보면 表1과 같다. Min 이 7, M. A. 가 52, F. A. 가 37, Primary가 2, Other TB가 2 이다.

이들 100名患者에 總家族數는 407名 이었으며 이들의 檢診狀態는 表 1과 같이 Tuberculin Test 는 不應者가 11이고 檢査者가 396名 X線檢査는 T反應 陽性者에 限해서 施行하였으며 그중 不應者가 9 名으로 檢査者는 349名 이었다.

表 I. 家族檢診狀態

年齡別	男 子			女 子			Total		
	家族數	O. T. 不 應	X-Ray 不 應	家族數	O. T. 不 應	X-Ray 不 應	家族數	O. T. 不 應	X-Ray 不 應
0~10	74		1	65		2	139	0	3
11~20	53	1		51			104	1	
21~30	29	2	1	38	2	1	67	4	2
31~40	18	1		29	1	1	47	2	1
41~50	10	1		17		1	27	1	1
50以上	8	1	2	15	2		23	3	2
計	192	6	4	215	5	5	407	11	9

III. 觀察 及 考按

1. 患者의 家庭狀態

家族數는 (圖1)에서 보는바와 같이 五人以上の 家族이 가장 많으며 房數는 圖2에서와 같이 房하나를 쓰는 사람이 44%로서 거의 半數에 該當된다. 또한 自家賃房別을 보건대 (圖3) 自宅患者는 62%, 나머지 38%는 賃房사리를 하고있는 形便이다.

이것은 좁은 房에서 多數家族이 한대 살고 있다는 것을 말해 주고있다.

2. 生計狀態

生計는 이를 上, 中, 下와 極貧으로 區分하였으며 그집의 總收入을 家族數로 나누어서 一人當收入이 5,000圓代가 되는 것을 中으로 하고

그以上을 上, 그以下를 下로 하였으며 一定한 收入이 없고, 그야말로 生計가 漠然한 家庭을 極貧으로 한것인데 이와같은 分類에 依해서 患者家庭의 生計狀態를 보면, 圖4에서 보는 바와같이 上에 屬하는 家庭이 11%, 中에屬하는 家庭이 34%, 下가 46%, 極貧이 9%, 로서 下와 極貧을 合한것이 55%로 半數以上이 나 되었다. 이것으로 역시 貧困層에 기울고 있다는 것을 再確認할수 있었다.

또한 患者가 生計를 維持하기 爲한 家庭經濟의 責任狀態를 보면 全責任과 補助와 無責任으로 나누어서 볼때 圖5에서 보는바와 같이 49%에 該當하는 患者가 家庭經濟의 全責任을 지고 있는 形便이며 全然 經濟的인 責任 없이 療養할수 있는 患者는 41%에 不過하였

Fig.1 No. of Family

No. of Family

Fig.2 No. of Using Room

No. of room

Fig.3 State of Possessing Residence

Fig. 4 Lively Hood

Fig. 5 State of Patients. Financial Responsibility for their Family

다. 이것을 肺結核分類別로 보며 역시 圖6에서 보는바와 같으며, F.A.T.B에 있어서도 45.9%에 該當되는 患者가 家庭經濟의 全責任을 지고 있다는 것은 患者의 治療面이나 또는 豫防醫學의 見地에서 볼때 大端히 憂慮되는 事實이라고 生覺된다.

3. 安靜狀態

通院患者의 安靜狀態는 이를 Complete Bed Rest와 modified Bed Rest와 安靜不可能의 세가지로 나누어 볼때 圖7에서 보는바와같이 Complete Bed Rest를 하고 있는 患者가 32%, modified Bed Rest가 47%, 安靜不可能이 21%로서 많은 患者가 安靜의 重要

Fig. 7 State of Rest

Fig. 6 TB by Classification & Financial Responsibility

性을 認識하고 있었으며 modified Bed Rest나 施行하고 있다는 것을 알 수 있다. 다음 安靜狀態를 肺結核分類別로 보면 圖8에서 보는 것처럼 Complete Bed Rest를 施行하는 例가 F.A.T.B에서 가장 많았으나 거기서도 13.5%에 該當되는 患者가 安靜을 全然 못하고 있는 形便으로 역시 注目할만한 事實이라고 하겠다.

Fig. 8 T.B. by Classification and Rest State

Fig.9 Source of Infection

Fig.10 Analysis of 54% Finding Source of Infection

4. 感染源別

家庭訪問에 있어서 感染源을 追求하는데 많은 힘을 기울였으며 感染源을 追求한다는 것은 家庭訪問에 있어서 重要な 課題의 하나일 것이다. 그結果 圖9 에서 보는것 처럼 感染源이 分明하게 된 境遇가 54%. 不明한 것이 46%였으며 分明하게 된 54例를 感染源種別로 보면 圖10과 같이 家族內가 27例로 50%이며 가장 首位를 차지하고 있는 것으로 家族內傳染이라는 것의 重要性을 再確認할 수 있었다.

5. 患者의 同居狀態

家庭療養患者는 家庭에 있어서 늘 感染源이 될수 있다는 點에서 患者와 健康家族들의 同居狀態란 素홀히 生覺할수 없는 問題일 것이다. 勿論 前記한바와 같이 大體로 房數는 적은

며다가 家族數는 많은 것으로 患者가 여러 家族과 同居하고 있으리라는 것을 能히 짐작할 수 있으나 여기서 그의 隔離狀態를 보면 圖11에서 보는바와같이 隔離가 可能한境遇가 19%에不過하며 나머지 81%는 1人以上의 家族과 同房을 使用하고 있으며 同房使用人員中 3人 家族과 한房을 쓰는 境遇가 가장 많아 24%에 該當된다.

또한 比較的 感染率及 發病率이 높다고 할 수 있는 10歲未滿에 兒童과 患者의 同居狀態를

Fig.11 No. of Persons Using the Same room with Patient

Fig.12 No. of Children below aged 10 of Family

Fig. 13 State of Children below aged 10 Using the same Room with Patient.

No of children who using the Same room with pt.

보던 圖12에서 보는바와 같이 먼저 家庭內의 10歲以下 兒童이 有한 집이 70% 나머지 30%가 10歲以下의 兒童을 가지고 있지않았다. 그리고 이들 10歲以下 兒童과의 同房使用狀態는 圖13에서 보는바와 같이 同房을 使用지 않는 境遇가 44%, 나머지 56%는 10歲以下의 兒童과 同房을 使用하고 있었으며 그중 1 人의 10歲未滿兒童과 同房使用하는 例가 26%로서 第一 많았다.

6. 患者家族의 感染狀態

患者家族들에 對하여 感染 內至는 發病如否를 檢査한다는 것은 自宅療養者에 있어서는 그意義가 더 커지는 것으로 生覺된다. 家庭訪問을 通해서 患者家族全員에게 (表 1에서 보는바와 같이 數名의 不應者는 除外되었으며 이들 不應者中 大部分은 집에 없는 사람들이었음) 2000倍 O. T. 를 施行하고 48時間後에 이들을 判定하였다. 그結果는 圖14에서 보는바와 같이 陽性이 90.4%, 陰性이 8.6%, 凝陽性이 1.0%이었다. 이들을 結果를 年齡別로 보면 大體로 11歲以上에서는 거의 90%以上의 陽性率을 보여주고 있으며 6 歲~10歲에서도 83.3%의 높은 陽性率을 나타내고 있다. 特히 注目할만한 事實은 1 歲未滿의 乳兒에 있어서 40%, 2~5歲幼兒에 있어서 66.6%란 陽性率은 이年齡層에서는 大體로 높은 陽性率로서 憂慮되는 事實이라고 아니할수 없다.

7. 患者家族의 發病狀態

家庭訪問을 通해서 家族內에서 患者를 發見하고자 Tuberculin 反應 陽性者에 對한 X線 檢査를 施行한바 有所見者가 97名으로 이것은 檢診總家族의 25.1%에 該當되는 것이다. (圖 15) 이것은 保社部推算에 依한 罹患率 6.5%라는 數字와 比較하여 보드라도 約 4倍가까이 되는 數字로 注目할만한 事實이라고 하겠다.

이들 有所見者를 年齡別로보면 圖16에서 보

Fig. 14 Total Results of Tuberculin Test on Patients' Family.

Fig. 15

Total Results of X-ray Examination on Patients Family.

Fig. 17

Rate of Classification on Active T. B.

는바와 같이 10歲未滿年齡層에 있어서 30%以上이란 어느年齡層보다도 높은 發病率을 보여 주고있는 것으로 10歲未滿의 乳幼兒가 얼마나 危險한가를 實證해주고 있다.

이들 25.1%의 該當하는 有所見者를 病名別로 볼때, 圖17에서 보는바와 같이 初期結核이 40.2%로 가장 高率이고 Minimal TB가 14.4%, M. A. TB가 13.3%, F. A. TB가 8.2%, 其他結核이 23.8%이다. 여기서도 初期結核이 가장 高率이라는 것으로보아, 患者家族中에서도 特히 年少者들에 있어서 發病의 危險性은 더 크다는 것을 알수 있다.

Fig. 16

Total Results of X-ray Examination on Patients Family (by Age)

Fig. 18 Rate of Infection and Incidence by Isolation

8. 相關關係別로 본 感染及 發病狀態

a) 隔離可否別로 본 感染及 發病狀態

前記한바와 같이 隔離可群이 19, 不可群이 81이었으며 이들 家族들의 感染及 發病狀態를 보면 圖18과 같이 隔離可群에 있어서는 反應陽性이 88.0%, 不可群에 있어서는 89.6%로서 隔離可, 不可群 共히 感染率에 있어서는 別差異를 認定할수 없으나, 한편 X線檢査에 의한 發病狀態는 可群이 13.2%, 不可群이 29.0%로서 不可群에 있어서 約 2倍以上이나 되는 높은 發病率을 보여 주고 있어 自宅患者의 隔性問題의 重要性을 再認識할수 있다.

b) 喀痰檢査別로 본 感染及 發病狀態

喀痰檢査는 모든 患者에게 一律的으로 培養檢査를 施行지 못한 關係上 여기서는 單純塗抹檢査만을 基準으로 하였으며 100例患者中 塗抹陽性者가 30例, 陰性者가 70例이었다. 이들

Fig. 19 Rate of Infection and Incidence by Sputum Examination

가족들에 대해서 먼저 감염상태를 보건대 圖 19에서 보는바와 같이 陽性喀痰群의 가족에 있어서는 O.T. 陽性이 91.1%, 陰性喀痰群에 있어서는 88.6%로서 陽性喀痰群에 있어서 感染率이 若干 높다고는 할수 있으나 別로 큰 差異는 認定할수 없다. 한편 X線檢査에 의한 發病狀態는 陽性喀痰群에 있어서는 32%, 陰性喀痰群에 있어서는 22.3%로서 陽性喀痰群의 家族에 있어서 훨씬 높은 發病率을 볼수있어 開放性如否가 또한 結核傳染에 미치는 影響이 크다는 것을 再確認할수 있는 것이다.

c) 同房使用別로 본 感染及 發病狀態

結核檢診에 應한 100名患者의 家族 396名中 246名은 患者와 同房을 使用하고 있었으며 나머지 150名이 患者와 別居하고 있는 形便이었다. 먼저 感染狀態를 본다면 圖20와 같이 同房使用群에 있어서 90.3%, 別居群에 있어서 87.5%로서 여기서도 O.T. 陽性率에는 別로 큰 差異를 認定하기 困難하다. 그러나 한편 發病狀態를 보면, 同房使用群에 있어서 28.5% 別居群에 있어서 19.4%로서 同房使用群이

Fig. 20 Rate of Infection and Incidence by Using Same Room with Patient or not

훨씬 높은 發病率을 보여주고 있는 것으로 여 기서도 隔離의 重要性을 認識할수 있었다.

d, 肺結核分類別로 본 感染及 發病狀態

100例患者中 NTA 分類에 依하여 Min. M. A, 그리고 FA로 나누어서 (Primary TB와 其他結核은 除外) 그들 家族의 感染及 發病狀態를 보면 圖21에서 보는바와 같이 O.T. 陽性

Fig. 21 Rate of Infection and Incidence by Classification of Pulmonary T. B.

率은 Min. TB 에있어서 78.3%, M. A. TB 에 있어서 90.1%, F. A. TB에 있어서 91.3%로 서 別로 큰 差異를 認定하기 困難하나 한편 發病狀態를보면 Min TB에 있어서 13.5% M A TB에서 22.3% F. A. TB에서 28.0%로서 患者의 病이 重해질수록 그의 家族들의 發病率이 높아감을 볼수 있으며 F. A. TB에 있어서는 Min TB의 約 2倍以上이나 되는 發病率을 보여주고 있어 重症患者일수록 傳染의 危險性이 커짐을 알수 있다.

e, 結核死有無別로 본 感染及 發病狀態

100例患者中 家族內에 結核死을 認定할수있었던 例가 15例였다. 이들 家族에 對한 感染狀態를 보건대 圖22에서 보는바와 같이 O. T.

Fig. 22 Rate of Infection and Incidence by T. B. Death in Patients family

陽性率인 結核死有群의 家族에 있어서는 98.1%, 無群의 家族에 있어서 87.8%로서 有群이 無群보다 若干 높은 感染率을 보여 주고 있으나 큰 差異는 認定하기 困難하다. 그러나 發病狀態를 보면 有群에 있어서 33.3%, 無群에 있어서는 23.7%로서 有群이 훨씬 高率의 發病狀態를 보여주고 있어 여기서도 家族內傳染이라는 것의 重要性을 再認識할 수 있다.

以上の 몇가지 相關關係別로 感染及 發病狀態를 볼때 感染率에 있어서는 別로 큰 差異를 認定하기 困難하였으나 發病率에 있어서는 共히 豫防醫學的으로 不利한 條件에 있는 群의 家族에 있어서 훨씬 高率을 나타내고 있어 有意的 差異를 認定할 수 있었다.

9. 夫婦間의 感染及 發病狀態

100例患者中 配偶者를 가진 患者가 58名이였으며 이들 配偶者의 O.T. 陽性率은 圖23에서 보는바와 같이 94.8%, X線檢査에 의한 發

Fig. 23 Rate of Infection and Incidence in Couples.

病率은 17.2%로서 比較的 낮은 것을 볼 수 있다. 한편 20歲以上の 患者家族群과 10歲未滿의 家族群과 나누어서 發病及 感染狀態와 夫婦間의 그것을 比較하여 볼때 感染率에 있어서는 夫婦間의 그것이 20歲以上の 家族群과는 비슷하고, 10歲未滿의 家族群보다는 高率이나 發病率에 있어서는 反對로 10歲未滿家族群이 훨씬 高率임을 볼 수 있어 역시 한 家族內에서도 10歲未滿의 兒童이 더 危險함을 認定할 수 있다.

IV. 結 論

우리들은 肺結核通院治療를 圓滿히 遂行하기 爲하여 家庭訪問을 施行한바, 여기에 家族들에 結核檢診을 中心으로 그것이 完全히 끝난 100名 通院患者에 對한 家庭訪問의 結果를 檢討하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

① 患者의 家庭을 訪問한바, 大部分의 家庭에 있어서 작은房에 多數家族이 同居하고 있었으며 그중 實房이 38%나 되었다.

② 經濟的인 面에서 볼때 貧困層에 많았으며 거이 半數에 該當하는 患者는 家計에 全責任을 지고 있었다.

③ 通院患者의 安靜狀態는 入院患者에 比하여 不良하나 47%에 該當하는 患者가 Modified Bed Rest를 32%가 Absolute Bed Rest를 하고있어 全然 安靜이 不可能한 患者는 21%이었다.

④ 家庭訪問에 있어서 History taking에 依하여 感染源을 발견할 수 있었던 境遇가 54%이였으며 그중 家族內에 感染源을 찾을 수 있었던 것이 가장 많았다. 家族內에 感染源을 가진 27例中 19例는 家族歷으로 結核死를 認定할 수 있었다.

⑤ 患者와의 同居狀態를 보면 隔離가 可能한 것이 19%에 不過하였으며 10歲以下の 兒童과 隔離되어있는 例는 44%로서 거이 半數의 患者가 10歲以下の 兒童과 同居하고 있는 셈이다.

⑥ 家族들의 感染狀態를 보면 約90%에 있어서 T. 反應陽性을 보여주고있어 一般成人의 그것과 큰 差異를 認定할 수 없었으나 10歲以下の 兒童에 있어서는 거이 70%나 되는 높은 陽性率을 보여주고 있었다.

⑦ 患者家族에 있어서의 發病率은 25%나 되는 高率을 나타내고 있으며, 病名別로는 Primary TB가 最優位에 있고 年齡別로는 10歲以下에서 約 34%의 發病率을 나타내고 있었다.

⑧ 隔離可否別, 咯痰檢査別, 肺結核分類別, 結核死有無別 등으로 나누어 各感染及 發病狀

態를 볼때 OT. 陽性率에는 一般的인 그것과 그리 큰 差異를 認定하기 困難하나 發病에 있어서는 有意의 差異를 認定할수 있으며 各豫防醫學의 見地에서 劣等한 條件에 있을때 發病率이 顯著하게 高率임을 確認하였고 이들 相關關係中 가장 發病率及 感染率이 높은것은 家庭內에 結核死가 有한 患者의 家族들이었다.

⑨ 夫婦間의 感染及 發病狀態는 發病感染 共히 20歲以上の 患者家族의 平均値보다도 낮

았으나 10歲以下の 兒童과 比較할때 10歲以下 兒童層이 發病率에 있어서는 顯著한 高率임을 볼수 있었다.

⑩ 以上の 몇가지로 볼때 肺結核의 通院治療에는 患者의 治療面에만 置重한 것이 아니라, 同時에 患者家族에 對한 啓蒙 乃至는 結核檢診이 要求되며 이것은 오로지 家庭訪問을 通해서만 可能한 것으로 肺結核通院治療과 家庭訪問과는 不可分의 關係가 있는것으로 믿는 바이다.

Home Visiting

Kwan Hi Lee, M.D.

Hai Won Pyun, M.D.

Eung Soo Han, M.D. FCCP.

National T. B. Center
Seoul, Korea

There are several indispensable Problems for the treatment of Pulmonary T.B. Patients on the ambulatory basis. The most important things of them, to carry out the ambulatory treatment efficiently, are home care and case finding. The home care must be done carefully in order to prevent the T.B. infection among the members of patient's family as well as the patient himself.

The case finding is also significant for the aforementioned purpose. It is because we can not expect the perfection in T.B. control on the ambulatory basis other than finding T.B. patients as early as possible.

Therefore we have conducted Home visiting for the patients who were diagnosed to have T.B. and given them knowledge on home care. On the other hand we have tested tuberculin reaction for their families, positive cases of whom had been X-rayed also.

Here is our report on the home visiting

conducted for 100 cases being under our treatment.

1) The most of the patients are living with their families together in their small rooms and 38% of them are living in the rented rooms.

2) Many patients are living in the poor condition and almost half of them are supporters of their family.

3) 47% of them are keeping modified rest, however, which is not considered enough for care of their sickness, 32% of them are keeping sufficient rest, and 21% of them have not any rest.

4) We could find out the source of infection on 54% of the patients through our visits of their home. 50% of it has its source with their family.

5) 19% of them are isolated completely, 81% of them are living in same room with their families, and over half of them are living with the children younger than 10 years old.

6) For result of tuberculin test on their

family, 90.4% are positive it is a significant result that about 70% of the tested children younger than 10 years old is positive.

7) 25% of their families are active T.B. patients, primary T.B. is 40.2% of them the highest rate.

8) There is no remarkable difference in Tuberculin reaction on some view point such as Isolation, Sputum Examination, Classification of Pulmonary T.B. and

T.B. death etc. However, we could find remarkable difference in incidence of active T.B. among them. The rate of incidence of active T.B. is higher under the unfavorable condition.

9) The rate of infection and incidence of T.B. among the couples is not considerable. However, it is remarkably higher among children younger than 10 years old comparing with that of them.