原發性肺癌의 臨床的 考察

延世醫大 內科

李昱龍 · 金俊明 · 張祥浩 · 金璟來
孫喜英 · 金誠圭 · 李沅泳 · 金起鎬

=Abstract=

Clinical Study on Primary Lung Cancer

Uk Yong Lee, M.D. June Myung Kim, M.D., Sang Ho Jang, M.D., Kyung Rae Kim, M.D.,
Hee Young Sohn, M.D. Sung Kyu Kim, M.D., Won Young Lee, M.D., Ki Ho Kim, M.D.

Department of Internal Medicine Yon Sei University, College of Medicine

A clinical study was made on 200 cases of primary lung cancer at Severance Hospital from January 1980 to June 1982. The male to female ratio of the patient was 4.4 : 1 and over 90 percent of the cases were beyond the age of 40 years.

The chief complaints in the order of frequency were cough(44.0%), chest pain and discomfort(34.0%), dyspnea(31.5%), sputum expectoration(15.5%) and hemoptysis(15.5%). Abnormal bronchoscopic finding were noted in 101 cases and the frequent sites of bronchogenic carcinoma in the order of frequency were right upper lobe bronchus(31.7%), left upper lobe bronchus(18.8%) and left main bronchus(12.9%).

Metastasis was noted in 65% of the cases and the frequent site of metastasis in the order of frequency were extrapulmonary lymphnodes(36.2%), bone(33.1%), pleura(27.7%) and mediastinum(16.9%). The 11 cases(5.5%) of the total of the 17 thoracotomies were resectable.

서 론

폐암은 금세기 초기만 하더라도 비교적 드문 질환이었으나 지난 40여년 동안 급격히 증가하여 이제는 미국 뿐만 아니라 전 세계적으로 커다란 보건문제로 대두되고 되었다. 현재 미국에서 폐암이 악성종양으로서 남자에서는 제 1위, 여자에서 제 4위로 기록되고 있고¹⁾, 한국에서 악성종양에 대한 전체적인 정확한 통계는 없지만 金등¹⁵⁾은 남자에서는 간암, 위암에 이어 제 3위, 여자에서는 생식기암, 위암, 간암, 백혈병, 유암 다음으로 제 6위로 남녀를 불문하고 그 빈도가 높다고 하였다. 한국에는 아직까지 폐암의 발생률 및 사망률에 대한 정확한 통계자료는 없고, 이 질환이 점차로 증가하고 있다는 산발적인 보고만^{2,3,4)} 있을 뿐이다.

본 교실에서도 1971년에 10년간에 걸쳐 경험하였던 218예의 폐암에 관해 보고한 적이 있었다⁵⁾. 당시에는 10년에 218예를 경험하였으나 금번에는 30개월 동안에 200예를 경험하였으므로 그 동안 폐암환자가 급격히 늘었다는 것을 알 수 있겠다.

관찰 및 방법

1980년 1월부터 1982년 6월까지 30개월간 연세대학교 의과대학 부속 세브란스병원에 내원하여 객담세포진검사법, 기관지생검, 경기관지폐생검, 임파절생검 및 개흉술등에 의해 병리조직학적으로 원발성 폐암으로 확진된 200예를 대상으로 임상증상, 세포유형, 원발병소부위, 전이부위 및 치료방식에 따라 임상 관찰을 실시하였다.

Table 1. Sex and Age Distribution

Age	Male		Female		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
~30	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31~40	7	4.3	5	13.5	12	6.0
41~50	29	17.8	7	18.9	36	18.0
51~60	53	32.5	8	21.6	61	30.5
61~70	65	39.9	14	37.8	79	39.5
71~	9	5.5	3	8.1	12	6.0
Total	163	100.0	37	100.0	200	100.0

M : F = 4.4 : 1

관찰성적

1. 연령과 성별

최연소자는 32세, 최고령자는 78세로서 200예중 188예(94%)가 41세 이상에서 발생하였으며, 60대가 39.5%, 50대가 30.5%, 40대가 18.0%이었고, 성별분포는 남자가 163예, 여자가 37예로서 남녀의 비는 4.4 : 1로 남자에서 월등히 발생하는 것을 알 수 있었다(제 1 표).

2. 주 소

내원시 주소로는 기침이 88예(44.0%)로 가장 공통된 증상이었고, 흉통 및 흉부 불편감 68예(34.0%), 호흡곤란 63예(31.5%), 객담 및 혈담이 각각 31예(15.5%)의 순이었고, 체중감소는 불과 7예(3.5%)에 서만이 호소하였다(제 2 표).

3. 주소의 기간

초발증상의 발현부터 내원시 까지의 기간은 3개월이 내가 123예(61.5%)로 가장 많았고, 일년이상이 되는 경우도 12예(6.0%)에서 있었다(제 3 표).

4. 조직학적 분류

조직학적 분류는 남녀 전체적으로 편평상피암이 110예(55.0%)로 가장 많았고, 미분화소세포형암 44예(22.0%), 선암 31예(15.5%), 미분화대세포형암 3예(1.5%)의 순이었으나, 여자에서는 선암이 13예(35.1%)로 가장 많았고, 편평상피암 11예(29.7%), 미분화소세포형암 10예(27.0%)의 순이었다(제 4 표).

5. 흡연과의 관계

환자의 병력상 흡연의 기왕력이 있는 예가 178예(89

Table 2. Chief Complaints in 200 Cases

Symptoms	No. of Cases	%
Cough	88	44.0
Chest pain or discomfort	68	34.0
Dyspnea	63	31.5
Sputum expectoration	31	15.5
Hemoptysis	31	15.5
Shoulder pain	20	10.0
Hoarseness	11	5.5
S.V.C. syndrome	10	5.0
Generalized weakness	9	4.5
Dysphagia	9	4.5
Weight loss	7	3.5
Fever	7	3.5
Mass on neck and chest	5	2.5

Table 3. Duration of Chief Complaints

Months	No. of Cases	%
~3	123	61.5
4~6	39	19.5
7~12	26	13.0
12~	12	6.0
Total	200	100.0

%)로 비흡연자의 8배에 달하였으며 세포유형별 백분율비(percent reference)를 보면 편평상피암군에서 흡연자가 비흡연자에 비해 2.1배정도이며 여타 세포유형군에서는 유의한 차이가 없었다(제 5 표).

Table 4. Histologic Types and Sex Distribution

Cell type	Male		Female		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
EpidermoidCa.	99	60.7	11	29.7	110	55.0
Small cellCa.	34	20.9	10	27.0	44	22.0
Adenocarcinoma	18	11.0	13	35.1	31	15.5
Large cell Ca.	3	1.8	0	0.0	3	1.5
Combined	2	1.2	0	0.0	2	1.0
Unclassified	7	4.3	3	8.1	10	5.0
Total	163	100.0	37	100.0	200	100.0

Table 5. Smoking History and Cell Types of Lung Cancer

	smoker		Non-smoker		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Epidermoid Ca.	104	58.4	6	27.3	110	55.0
Small cell Ca.	38	20.3	6	27.3	44	22.0
Adeno Ca.	26	14.6	5	22.7	31	15.5
Large cell Ca.	2	1.1	1	4.9	3	1.5
Combined	1	0.6	1	2.7	2	1.0
Unclassified	9	5.0	1	4.9	10	5.0
	178	100.0	22	100.0	200	100.0

Table 6. Location of Lesions

Location	No. of Cases	Percent(%)
Right	59	58.4
Main bronchus	8	7.9
Upper lobe bronchus	32	31.7
Middle lobe bronchus	6	5.9
Lower lobe bronchus	5	5.0
Intermediate bronchus	8	7.9
Left	42	41.6
Main bronchus	13	12.9
Upper lobe bronchus	19	18.8
Lower lobe bronchus	10	9.9
Total	101	100.0

Right : Left = 1.4 : 1

6. 병소의 부위

기관지경점사에 의하여 병소가 발견된 101예에서 병

소의 부위는 우폐가 59예(58.4%), 좌폐가 42예(41.6%)로서 우폐가 좌폐에 비하여 1.4배정도 많았고, 전체적으로는 우상엽기관지가 32예(31.7%)로서 제일 많았고 그 다음이 좌상엽기관지 19예(18.8%), 좌측주기관지 13예(12.9%)의 순이었다(제 6 표).

7. 전이부위

원발성폐암이 타장기로 전이가 확인된 130예(65.0%)에서 장기별로 전이부위를 살펴보면, 폐문 이외의 임파선전이가 47예(36.2%)로 제일 많았고 전예가 생점으로 확인되었으며 그 다음이 골 43예(33.1%), 늑막 36예(27.7%), 종격동 22예(16.9%)의 순이었다(제 7 조).

8. 치 료

200예중 17예(3.5%)에서만이 개흉술을 시행하였고 이중 11예(5.5%)에서 폐절제술을 실시하였다(제 8 표).

고 안

폐암의 발생을 및 사망율은 급격히 증가하고 있는

Table 7. Sites of Metastasis in 130 Cases

Sites	No. of Cases	%
Lymph node, extrapulmonary	47	36.2
Bone	43	33.1
Pleura	36	27.7
Mediastinum	22	16.9
Recurrent laryngeal nerve	12	9.2
Liver	10	7.7
Brain	8	6.2
Phrenic nerve	8	6.2
Chestwall	2	1.5
Pericardium	2	1.5
Esophagus	1	0.8
Kidney	1	0.8
Contralateral lung	1	0.8

Table 7. Operability and Resectability

Operation	No. of Cases	Percent(%)
Non-operable	183	91.5
Operable	17	8.5
Explo. thoracotomy	6	3.0
Resection	11	5.5
Total	200	100.0

추세이며 미국의 경우 남자 10만명당 폐암으로 인한 사망률이 1930년 때에는 3.6명이었으나, 1969년에는 63.2명으로 급증하였다. 1974년 한 해에만 83,000명의 새로운 환자가 발생하였으며^{1,6)} 1978년에는 102,000명의 신환과 폐암으로 92,400명의 사망자가 있었다. 그리고 전 악성종양 발생률의 15%(남자 22%, 여자 12%)와 사망률의 23%(남자 33%, 여자 12%)를 차지하였다^{7,8)}. 이와같이 폐암은 나날히 급격히 증가하고 있는 추세이며 한국에서도 폐암은 증가한다고 김등⁴⁾은 보고하고 있고, 저자들도 30개월에 200예를 경험하였던 것은 1971년에 10년간 218예를 보고하였던 것⁵⁾과 비교하면 폐암의 발생률이 급격히 신장하고 있다는 하나의 지표가 될 수 있겠다.

폐암의 남녀별 발생빈도는 Ochsner등⁹⁾, Sabour등¹⁰⁾, Jones 등¹¹⁾ 및 Gibbon 등¹²⁾은 약 7:1 내지 14:1, 김³⁾ 및 김등⁴⁾은 6:1 내지 10:1,李등⁵⁾, 孫등¹³⁾은 5:1이라고 하였고 김¹⁴⁾등은 4.2:1로서 본 고찰과 비슷하

였다.

연령분포는 40세 이상이 94%로서 김등⁴⁾의 90%, 金등¹⁵⁾의 88.9는 물론이고, 외국의 Sabour 등¹⁰⁾, 및 Cohen¹⁶⁾ 등 White¹⁷⁾의 보고성과도 비슷하였다.

초발증세 이후 내원까지의 기간은 3개월 이내가 61.5%로서 김등⁴⁾의 32%, 李등⁵⁾의 37% 및 MacFarlane¹⁸⁾ 등의 48%보다는 빨랐고 Sabour 등¹⁰⁾의 60.3%와는 비슷하였다.

폐암의 조직학적 유형에 따른 보고는 보고자마다 정도의 차이는 있지만 편평상피암이 제일 많은 것으로 되어 있다. 본 고찰에서 편평상피암이 55%로서 그 빈도가 가장 많았으며 李⁵⁾등의 41%보다는 많았고 김⁴⁾등의 51.6%, 金¹⁵⁾등의 59.6%와 비슷하였다. 미분화암은 23.5%로서 李⁵⁾등의 30%, 김⁴⁾등의 32.8%, 金¹⁵⁾등의 29.8%, Rivkin 등¹⁹⁾, Ochsner 등⁹⁾, Sabour 등¹⁰⁾의 29% 내지 35.1%보다는 적었고, 미분화암중 소세포형과 대세포형의 비는 14.6:1로서 金¹⁵⁾등의 2.6:1, Auerbach 등²⁰⁾의 1.7:1에 비하여 현격한 차이를 보였다. 선암의 빈도는 15.5%로서 Raymond 등²¹⁾의 14.3%, Rienhoff²²⁾등의 12.1%와 비슷하였으나 김⁴⁾등의 6.2%, 金¹⁵⁾등의 10.5%, 李⁵⁾등의 6%, Sabour 등¹⁰⁾의 2.5%보다는 상당히 높았고, Farber 등²³⁾의 22.2%, Auerbach 등²⁰⁾의 25.2%보다는 상당히 낮았다.

기관지경검사에 의하여 병소가 확인이 된 101예에 있어서 병소부위를 보면 우폐가 58.4%, 좌폐가 41.6%로, 金¹⁵⁾등의 우폐 60.8%, 좌폐 38.2%는 물론 외국의 보고^{9,24)}와 마찬가지로 우폐가 많았다. 폐야별로는 우상폐야가 31.7%로 제일 많았고 중폐야 및 하폐야에서의 발생률은 적어서 金¹⁵⁾등의 보고와 일치하였다.

폐암에서 전이여부가 환자의 치료방법의 선택 및 예후에 큰 영향을 미치는 것으로 되어있다. 본 고찰에서 65%에서 전이가 확인되었고 金¹⁵⁾등의 70%와 비슷하였다. 그러나 부검에 따른 폐암의 전이에 관한 외국의 보고 즉 Auerbach 등²⁰⁾의 96.3%, Senoo 등²⁵⁾의 99.1%보다는 적었다. 장기별 전위부위로는 폐문 이외의 임파선 전이가 36.2%로 제일 많았고, 이것은 金¹⁵⁾등, 李²⁶⁾등, Auerbach 등²⁰⁾ 및 Baum 등²⁷⁾의 임상적 및 부검성적과 일치하였다. 그 다음 순위로는 골, 늑막종격동의 순으로 金¹⁵⁾등의 늑막, 간, 늑골동의 순서와는 차이가 있었다.

폐암의 치료로는 항암약물요법, 면역요법, 방사선치료 및 외과적 치료가 있고 그 중 외과적치료로서 개흉 및 폐절제에 관한 보고들을 보면 1949년 Mason²⁸⁾은 대상환자의 20%에서 폐절제를 하였다고 하였고, 1955

년 Bignall²⁹⁾은 개흉율이 25%이하라고 하였고, 1963년 Raymond²¹⁾는 개흉 32.9%, 폐절제 29.2%, Reihoff³⁰⁾등은 62%의 개흉 32%의 폐절제, 孫¹³⁾등은 35%의 개흉 17%의 폐절제, 李¹⁵⁾등은 49%의 개흉 12%의 폐절제를 각각 보고하여 외국에서는 근년에 이를 수록 폐절제율이 증가하는 추세를 보이니 본 고찰에서는 불과 8.5%의 개흉 및 5.5%의 폐절제술을 보여 주고 있는 점이 특기할 만하다. 김⁴⁾등은 한국에서 폐암의 외과적 치료성적이 좋지 못한 것은 조기진단이 안되는 점, 경제적 여건 등이 문제가 된다고 하였으나 본 고찰에서 전산화단층촬영, 전신골주사등 진단 및 전이 여부를 확인할 수 있는 검사기술의 발달로 불필요한 개흉 및 폐절제를 삼가하기 때문인 것으로 생각되어진다.

결 론

1980년 1월부터 1982년 6월까지 연세대학교 의과대학부속 세브란스병원에 내원하여 병리조직학적 소견에 의하여 원발성폐암으로 확진된 200예를 대상으로 하여 임상적 고찰을 하였다.

1) 연령별 빈도는 60대가 39.5%, 50대가 30.5%, 40대가 18.0%이었으며 남녀의 비는 4.4 : 1이었다.

2) 초발증상으로부터 내원시 까지의 기간은 3개월이 내가 61.5%로 가장 많았으며 내원시 주소는 기침(44.0%), 흉통 및 흉부불쾌감(34.0%), 호흡곤란(31.5%)의 순이었다.

3) 조직학적 분류로는 편평상피암(55.0%), 미분화소세포형암(22.0%), 선암(15.5%), 미분화대세포형암(1.5%)의 순이었다.

4) 기관지경검사에 의해 병소가 확인된 101예에 있어서 호발부위의 빈도는 우폐가 좌폐에 비하여 1.4배 정도 많았고, 전체적으로는 우상엽기관지(31.7%), 좌상엽기관지(18.8%), 좌주기관지(12.9%)순이었다.

5) 원발성폐암의 타장기로의 전이율은 65.0%이었으며 장기별로는 폐문 이외의 임파선(36.2%), 골(33.1%), 늑막(27.7%), 중격동(16.9%)의 순이었다.

6) 200예중 17예(8.5%)에서 개흉술을 시행하였고 이중 11예(5.5%)에서 폐절제술을 실시하였다.

REFERENCES

- 1) Beamis, J.F.Jr., Stein, A. and Andrews, J.L. Jr.: Changing epidemiology of lung cancer,

Med. Clin. N. Amer. 59:315, 1975.

- 2) 金敬植: 肺癌에 對한 臨床의 考察. 結核, 12:82, 1962.
- 3) 金炳基, 柳會性: 肺癌에 對한 臨床의 考察. 結核, 12:87, 1962.
- 4) 김정석, 김선호, 서경필, 이영균: 폐암의 임상적 고찰. 大韓外科學會誌, 12:27-33, 1970.
- 5) 李沅永, 林隆義, 金起鎬: 韓國人 肺癌의 臨床. 대한내과학회잡지, 14:1-5, 1971.
- 6) Silverberg, E., and Holleb, A.I.: Cancer Statistics, 1974-World wide epidemiology. Ca, 24: 2-6, 1974.
- 7) Burbank, F., and Fraumeni, J.F.: J. Natl Cancer. Inst. 49:649, 1972.
- 8) Lee, E.S. et al.: Cancer 38:2551, 1976.
- 9) Ochsner, A., Ochsner, A. Jr., H'Doubler, C. and Blalock, J.: Bronchogenic carcinoma, Dis. Chest, 37:1, 1960.
- 10) Sabour, M.S., Osman, Glen, J., Fahy, T. and Lamb, P.: Carcinoma of the lung, Dis. Chest, 41:530, 1962.
- 11) Jones, J.C., Robinson, J.L. and Meyer, B.W.: Primary bronchogenic carcinoma of lung: Statistical study of seven hundred four private patients, Arch. Surg. 70:265, 1955.
- 12) Gibbon, J.H. Jr., Arbritten, F.F.Jr., Templeton, J.Y. III. and Nealon, T.F. Jr.: Cancer of the lung. Ann. Surg. 138:489, 1958.
- 13) 孫光鉉, 金世煥, 李根永, 洪弼勲: 肺惡性腫瘍 84 例. 大韓外科學會雜誌, 6:21-26, 1964.
- 14) 金永旭, 朴重根: 肺癌의 疫學的 考察. 結核 및 호흡기질환, 21:69, 1965.
- 15) 金能守, 金玄徹, 李誠羽, 朴義顯, 文鍾雄, 朴熙明: 原發性肺癌의 臨床的 觀察. 대한내과학회잡지, 19:324-334, 1976.
- 16) Cohen, S.: Primary carcinoma of the lung. Dis. of Chest 49:67, 1966.
- 17) White, T.J.: Primary carcinoma of the Bronchus. JAMA. 118:862, 1941.
- 18) MacFarlane, J.C.W., Doughty, B.J. and Crosbie, W.A.: Carcinoma of the lung, An analysis of 362 cases diagnosed and treated in one year, Brit. J. Dis. Chest, 56:57, 1962.
- 19) Rivkin, L.M. and Sayer, J.M.: Bronchogenic

- carcinoma in men under 40 years of age, Dis. Chest. 34:521, 1958.
- 20) Auerbach, O., Garfinkel, L and Parks, V.R.: Histologic types of lung cancer in relation to smoking habits, year of diagnosis and sites of metastases, Chest, 67:382, 1975.
 - 21) Raymond, J.B.: Primary Carcinoma of the Lung; Experience with 1312 patients, J Thoracic & cardiovascular Surg, 16:292-297, 1963.
 - 22) Rienhoff, W.F. Jr.: A clinical analysis and follow-up study of five hundred and two cases of carcinoma of the lung, Dis. Chest, 17:33, 1950.
 - 23) Farber, S.M.: Lung Cancer, C.C. Thomas, Publisher, Springfield, Illinois, 1954.
 - 24) Anel, I.M., Avery, E.E., Kanter, L., Head, J.R. and Langston, H.T.: Primary carcinoma of the lung, Aclinical study of 1205 cases, Cancer, 3: 229, 1950.
 - 25) Senoo, T.: Metastasis of 400 necropsy cases of bronchogenic carcinoma: Statistical and morphological studies, Med, J. Osaka, Univ. 7:515, 1956.
 - 26) 李泰權, 李根永, 丁乙三, 蘇文錫, Seel, D.J.: 肺癌性腫瘍(106例 報告). 大韓外科學會雜誌, 11:47, 1969.
 - 27) Baum, G.L.: Textbook of pulmonary disease, 2 nd Ed., Little, Brown and Company, Boston, 1974.
 - 28) Mason, J.R.: Bronchogenic Carcinoma: Review of a Thousand cases, Lancet, 2:287, 1949.
 - 29) Bignall, J.R.: Bronchogenic carcinoma: Survey of 517 patients. Lancet, 1:786, 1955.
 - 30) Reinhoff W.F.: Bronchogenic Carcinoma. A Stucy of cases treated at Johns hospital from 1933 to 1958. Ann. Surg. Vol. 161:674-687, 1965