Roentgenogram of the Issue

長期間 咯血을 同伴한 孤立性 肺結節

연세대학교 의과대학 내과학교실

손희영 · 박해심 · 이강석 · 허 미 · 김성규 · 김기호

증 례

본 환자는 28세 가정주부로서 3개월간의 간헐적인 작혈을 주소로 연세대학교 의과대학 부속 세브란스병원 내과에 입원하였다. 과거력상 폐결핵을 비롯한 호흡기질환의 병력이 없었고 건강한 편이었으며 가족력에도 특기할 만한 사항이 없었다. 환자는 입원 3개월 전부터 가벼운 기침을 동반한 작혈이 있어 본원에 내원하여 흉부X선상 좌상엽에 종괴양 음영이 있어 입원을 권유받았으나 지체하고 있다가 모병원에서 폐결핵의 진단하여 항결핵제를 복용하던중 입원당일 한킬 정도의 작혈을 하여 본원에 입원하게 되었다. 이학적 소견상 환자는 비교적 건강해 보이고 영양상태는 양호하였다. 혈압은 120/80 mmHg 맥박분당 96회 체온은 37°C였으며 폐의 청진상 호흡음감소, rale 및 천명음 등의 이상소견은 없었고 경부임파선은 촉진되지 않았다. 입원당시 혈색소가 12.8%, 백혈구수 9,100/mm³ (중성구 60%, 임파구 25%), 혈소판수 327,000/mm³.

그리고 prothrombin time 을 포함한 혈청 SMA 검사는 모두 정상범위였다. 입원당시에 촬영한 흉부X선상 좌상엽의 apico-posterior segment에 약 2.5×3.5 cm의 난원형 종괴음영이 있으며 낭포나 공동은 없었다(Fig. 1). 초진당시부터 시행한 객담 결핵균도말 및 배양검사는 3회에 걸쳐 모두 음성이었고 3회의 객담세포진에서도 암세포는 검출되지 않았다. 객담 Aspergillus 배양 및 혈청학적검사도 모두 음성이었다. 기관지경 검사상 기관지내의 병변은 발견할 수 없었고 기관지세척액의 결핵균도말, 배양 및 세포진은 모두 음성이었다. 이후 환자는 폐결핵(결핵증)에 대한 therapeutic trial의 계획하에 INH 400 mg, EMB 800 mg Rifampin 600 mg의 처방으로 퇴원하였다. 환자는 퇴원후 3개월동안 체위변화나 운동여부에 무관하게 빈번한 작혈이 있어 재입원하게 되었다. 흉부X선소견은 3개월이전과 별 변화가 없었고 흉부 전산화 단층촬영을 시행한바 폐문 및 종격동임파절 종대는 없고 좌상엽에 병변이 다소 불규칙한 종괴가 있어 폐암의 의심하에 입원 제12일째, 시험개흉을 시행하였다.

Fig. 1. Roentgenogram of the chest disclosed 2.5×3.5cm sized homogenous mass shadow surrounded by normal appeared lung parenchyma in apico-posterior segment of left upper lobe.

고 찰

좌상엽절제술을 시행하여 제 2 도에서 보는 것과 같은 2×3 cm 크기의 난원형 종괴였음을 확인하였는데 이 종괴는 폐실질에 둘러싸였으며 단면이 cheese 양인(Fig. 3) Aspergilloma 로 확진되었던 예였다(Fig. 4).

Fig. 2. Computed tomography of the chest showed a mass with irregular margin without surrounding cavity.

Aspergillus 의 인체감염은 1928년 Pasteur 등이 hypersensitivity pneumonia(과민성폐염)의 예로, 1938년에 Deve 등의 공동내 균종(mycetoma)의 예로, 그리고 1959년에는 Hinson 등이 allergic bronchopulmonary aspergillosis의 예로 각각 최초보고 하였다¹⁾. Aspergillus는 많은수의 conidia와 spore를 대기중에 방출하므로 호흡기에 흡입되기 쉽다. 그러나 대부분의 사람에게서는 질환을 일으키지 않고 면역능이 저하되어 있거나 폐나 기관지에 선행질환이 있는 경우, 혹은 동 진균에 과민성체질을 가진 사람에게서는 여러가지 유형의 질병을 일으킬수 있다^{1~5)}. 폐 Aspergillus 중은 Table 1에 도시된 것과 같은 여러가지 유형의 질환을 일으킬 수 있으나 본란에서는 mycetoma(균종)에 관해서 고찰하고자 한다.

폐-기관지의 선제성질환으로 인한 공동이나 낭포, 기포(bullae)같은 dead space에 발생하는 균종(mycetoma)은 Candida를 비롯한 몇가지 진균이 있으나 가장 흔한 것이 Aspergilloma이다. 이 Aspergillus species 중 fungus ball(mycetoma)의 형태로 잘 나타나는 것이 Aspergillus fumigatus이며 드물게는 A. niger, A. terreus 및 A. flavus등도 올 수 있다. 이 공동내 Aspergilloma는 폐-기관지 질환으로 인해 손상된 폐조직이나 공동에 saprophytic colonization

Fig. 3. Multiple cross section of the specimen through the bronchus revealed a mass which was located in the parenchyma and had small connection to the bronchus. The mass which measures 2 cm in diameter, is oval and well demarcated, containing soft, yellow-gray cheese like material in the central portion.

Table 1. The Spectrum of Pulmonary Aspergillosis

Suppurative infection	Disseminated disease	Hypersensitivity syndromes	Saprophytic colonization
1. Aspergillus pneumonia a. Primary(normal host) b. Secondary (immunosuppressed host)	1. Septicemia	1. Extrinsic asthma 2. Allergic bronchopulmonary aspergillosis (mucoid impaction syndrome)	1. Intracavitary aspergilloma 2. Fluid-filled cysts
2. Empyema		3. Extrinsic alveolitis

Fig. 4. Microscopic structure of the aspergilloma revealed tangled mass of vesicles and hyphae(H & E ×200)

을 일으킨 것으로써 가장 흔한 것이 결핵성공동이며^{2,3)} 그외에 sarcoidosis⁴⁾, 폐경색증⁴⁾, 기관지확장증⁵⁾ 폐농양⁵⁾, 폐암⁶⁾, 폐기종성 기포⁷⁾ 기관지낭포(brochogenic cyst)⁷⁾, pulmonary alveolar proteinosis⁷⁾ Norcardiosis 같은 타 진균질환⁷⁾, 백혈병이나 악성임파종⁸⁾, 부신피질호르몬이나 항생제의 장기투여시^{9,10)} 등이 그 선행질환이나 상황으로 보고되고 있다. 공동은 대개 thin wall 이고 상피조직형성(epithelialization)이 되어 있는 것이 보통이며 크기는 약 2 cm 으로부터 무려 20 cm 에 이르기 까지 다양하다¹⁾. 폐 Aspergilloma 의 특징적인 X선소견은 원형 혹은 난원형의 종괴가 공동의 일부 혹은 대부분을 차지하고 균종과 공동벽 사이에 crescentic airspace(초생달모양의 공기음영)를 나타내는 것이다. 균종은 그 일부가 공동의 벽에 붙어있는 수도 있지만 대개는 유리되어 있어 측와위흉부X선상 균종의 위치가 이동하는 소견을 보게 된다^{11~13)}.

이러한 소견이 가장 잘 보이는 것은 역시 흉부단층촬영이며 Aspergilloma 가 있는 공동부근의 늑막이 비후되어 있는 것을 함께 관찰할 수 있다¹³⁾. 공동과 기

관지의 통로는 너무 작아서 기관지조영술로는 동병만을 조영하기는 힘들다¹⁾. 본 증예의 경우는 단층촬영을 포함한 X선 검사상 공동이 관찰되지 않았고 고립성폐결절(solitary pulmonary nodule)처럼 보였으며 수술 조직의 육안소견으로도 비교적 정상적인 폐실질에 둘러싸여 있었고 선행 폐-기관지 질환으로 인정될만한 소견이 없었다는 점이 매우 특이한 점이라고 하겠다. 폐 Aspergilloma 의 자연병력에 대해서는 잘 규명되어 있지 않다. 저절로 용해되어 없어진 예도 보고된바 있고^{3,4,14)} 점차 커지는 경우^{1,12)}도 있으나 수술적으로 제거하지 않는한 계속해서 잔존하는 것이 보통이다^{1,8)}. 공동내 잔류하는 Aspergilloma 의 임상적인 가장 중요한 문제점은 각혈이며, 때로는 대량실혈이나 질식으로 사망하기도 한다¹⁾.

Aspergilloma 환자에서 각혈의 빈도는 55% 내지 85%라고 한다^{5,15,16)}. 동 질환에서 출혈의 정확한 원인은 규명되지 못했으나 공동내에서 점점 커지는 균종이 공동벽과 마찰하여 점막 혹은 점막하층의 혈관을 유발하여 출혈할 것이라는 설이 있고¹⁷⁾ 또 한가지는 Asper-

gillus가 분비하는 trypsin-like proteolytic enzyme 이나 용혈성을 가진 endotoxin, 혹은 어떤 antioagul-an-like material 등이 대량출혈을 야기한다는 설도 있다^{3,18)}. 폐 Aspergilloma 는 각혈외에는 특이한 증상을 일으키지 않으며 어떤 상황에서도 invasive aspergillosis 로는 진행하지 않는 것으로 알려져 있고³⁾ 동 질환의 예후는 오히려 그 underlying disease 인 기관지-폐 질환의 종류나 정도에 의해 좌우된다고 한다^{1,8)}.

폐 Aspergilloma 는 만성 낭포성, 공동성 폐-기관지 질환이 있는 환자가 반복적인 각혈을 일으키고 단층촬영을 포함한 X선 검사에서 공동내 종괴음영을 발견할때 의심할 수 있다¹⁾. 객담의 도말이나 배양검사는 그다지 도움이 없으며 최근 민감하고 정확도가 높은 ELISA technique 을 이용한 혈청학적 검사가 각광을 받고 있다^{1,19)}.

폐 Aspergilloma 의 치료는 내과적으로 amphotericin B 의 정맥주사, amphotericin B 혹은 sodium iodide 등의 기관지내 주입(endobronchial instillation)과 같은 내과적 방법이 시도된 적이 있으나^{20,21)} 별 효과를 거두지 못하였고, 현재로서는 외과적 절제만이 유일한 근치술이다. 대량각혈, 즉 24시간내 600cc 나 혹은 그 이상의 각혈이 있을시는 응급수술의 대상의 되나¹⁾ 출혈양이 적을 때에 수술대상을 선정하는 때는 아직 논란이 많다. Solit 등³⁾처럼 Aspergilloma 가 진단되고 폐기능과 전신상태가 양호하면 모두 수술하는 것이 좋다는 극단적인 견해도 있으나 근래에는 심한 각혈이 한번이상 일어났고 단일균종(single mycetoma)이 단층성 병변(예-기관지질환)내에 있으며 폐기능이 허용되는 환자를 수술하는 것이 가장 무리가 없는 것으로 알려져 있다. 양측성으로 underlying disease 가 있는 경우는 출혈의 근원을 확증하기 힘들고 수술후 반대측 폐에 Aspergilloma 가 새로 발생할 수도 있기 때문이다. 소량이나 중등도 이하의 각혈을 자주 반복하는 폐 Aspergilloma 환자는 환자의 성격, 생활적응능력, 선행폐질환의 종류와 정도 및 폐기능상태 등을 고려하여 수술의 적기를 선정하기 위해 노력해야 할 것이다. 우리나라에서도 대량각혈을 동반하였던 김등²²⁾의 보고외에 적지않은 증례가 문헌에 보고된 바 있다.

REFERENCES

- 1) Atkinson GW, Israel HL: Pulmonary Aspergillosis. Update I Pulmonary disease and

disorders.

- 2) Reddy PA, Christianson CS, Brasher CA et al: Comparison of treated and untreated pulmonary Aspergilloma. Am Rev Respir Dis 101: 929, 1970
- 3) Israel HL Ostrow A: Sarcoidosis and Aspergilloma. Am JMed 47:243, 1969
- 4) Aslam PA, Eastridge CE, Hughes FA: Aspergillosis of the lung. Chest 59:28, 1971.
- 5) Solit RW Mckeown JJ, Smullen S, et al: The surgical implication of intracavitary mycetoma. J Thorac Cardiovasc Surg 62:411, 1971
- 6) Mays EE, Hawkins JA: Cavitory bronchial carcinoma with an intracavitary Aspergilloma. Am Rev Respir Dis 95:1056, 1967
- 7) Freundlich IM, Israel HL: Pulmonary Aspergillosis. Clin Radiol 24:248, 1973
- 8) Argen RJ, Leslie EV, Leslie Buffalo: Intracavitary fungal ball-pulmonary Aspergillosis. JAMA 24:106, 1962
- 9) Finegold S, Will D: Aspergillosis. Am J Med 27:463, 1959
- 10) Naji AF: Bronchopulmonary Aspergillosis. Arch Pathol 68:282, 1959
- 11) Twining EW, Kerley PA: Textbook of X-ray diagnosis. London, HK Lewis 1951, p441
- 12) Varkey B, Rose HD: Pulmonary Aspergilloma. Am J Med 61:626, 1976
- 13) Libshitz HI, Atkinson GW, Israel HL: Pleural thickening as a manifestation of Aspergillosis superinfection. Am J Roentgen 120:883, 1974
- 14) Hammwrman KJ, Christianson CS, Huntington I, et al: Spontaneous lysis of Aspergillomata. Chest 64:698, 1973
- 15) Pecora DV, Toll M.W.: Pulmonary resection for localized Aspergillosis. N Eng J Med 263: 785, 1960
- 16) Kilman JW, Ahn C, Andrew NC, et al: Surgery for pulmonary Aspepergillosis. J Thorac Cardiovasc Surg 57:642, 1969
- 17) Pimental JC: Pulmonary calcification in the tumor-like form of Aspergillosis. Am Rev Respir Dis 94:208, 1966
- 18) Vilar TG, Pimental JC, Costa MF: The tumor-

- like form of Aspergillosis of the lung. Thorax 17:22, 1962
- 19) Rosenberg M, Patterson R, Mintzer R, Cooper BJ, Roberts M, Harris K: Clinical and immunological criteria for the diagnosis of allergic bronchopulmonary Aspergillosis. Ann Int Med 86:405, 1977
- 20) Hammerman KJ Sarosi GA, Toshi FE: Amphoterin B in the treatment of saphrophytic forms of pulmonary Aspergillosis. Am Rev Respir Dis 109:57, 1974
- 21) Ramirez RJ: Pulmonary Aspergilloma-endo-bronchial treatment. N Eng J Med 271:1281, 1964
- 22) 김성규, 이수곤, 정남식, 이강용, 이원영, 김기호, 대량각혈을 동반한 폐결핵·결핵 및 호흡기질환 27:114, 1980

=Abstract=

Solitary Pulmonary Nodule with Recurrent Hemoptysis

Hee Young Sohn, M.D., Hae Sim Park, M.D., Kang Suk Lee, M.D., Mi Hur M.D.

☞Sung Kyu Kim, M.D. and Kiho Kim, M.D.

Department of Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine

A mycetoma is a mass of intertwined fungal hyphae within a pulmonary cavity. It may be the result of colonization of *Candida* or by other fungal species. However the most common invader is *Aspergillus*. The most common underlying causes of the cavity are tuberculosis and then sarcoidosis, bronchiectasis, emphysematous bullae, bronchial cyst, pulmonary infarct, lung abscess, hematologic malignancies and prolonged use of corticosteroid or antibiotics. Chest tomogram taken in the upright position provide the best in subjects of the Aspergilloma and of the surrounding air-crescent. The major clinical problem associated with Aspergilloma is pulmonary hemorrhage. Surgical excision is the only effective treatment and should be utilized after a second bout of severe hemorrhage in the patient who has unilateral diseases with a single obvious Aspergilloma, and who has no major impairment of pulmonary function.

A 28 year-old housewife was admitted with many bouts of mild to moderate amount of hemoptysis. There was no history of previous bronchopulmonary disease and any clinical and laboratory evidence of active pulmonary tuberculosis. Roentgenogram of her chest showed ovoid homogenous mass without cavity or air-crescent in left upper lobe. Sputum examinations for tubercle bacilli, malignant cell and *Aspergillus* culture were all negative. Serologic test(immunodiffusion method) for Aspergillosis was negative. Anti-tuberculous therapeutic trial yielded no alteration of the symptoms and roentgenographic feature. Left upper lobectomy was performed, and the specimen removed was found to contain 2×3 cm sized ovoid mass surrounded by lung parenchyme. Its cross section showed cheese-like material. Microscopic examination revealed fungal mycelia of *Aspergillus* species.