□ 원 저 □

폐결핵 환자에서 혈청 ACE활성도에 관한 연구

서울대학교 의과대학 내과학교실

기 만 덕 · 우 준 희 · 심 영 수

= Abstract =

A Study On Angiotensin Converting Enzyme Activity
in Pulmonary Tuberculosis

Mahn Deok Kee, M.D., Joon Hee Woo, M.D. and Young Soo Shim, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine,
Seoul National University, Seoul, Korea

Serum angiotensin converting enzyme(ACE) activity was measured monthly for average 9 months during antituberculous chemotherapy to evaluate the effect of treatment on serum ACE activity.

The serum ACE level of 12 nonmiliary pulmonary tuberculosis patients and 20 normal control subjects were 3.38 ± 2.07 u/ml(mean $\pm$ S.D.) and 4.59 ± 1.65 u/ml respectively.

The serum ACE activity seems to be apparently lower in the patient group than in the control group, but without significant statistical difference($p > 0.05$).

There was no statistically significant alteration of serum ACE activity during 9 month antituberculous chemotherapy in 12 nonmiliary pulmonary tuberculosis patients($p > 0.05$).

We concluded that the serum ACE activity is not a useful indicator for the evaluation of clinical status in pulmonary tuberculosis patients during chemotherapy.

서 론

폐결핵 환자의 관리를 위해서는 조기진단과 함께 항결핵치료중 환자상태의 추적이 중요하다. 치료중 환자상태의 추적은 증세의 호전여부와 객담검사, 흉부 X-선상변동양상 등을 파악하므로써 가능하였으나 시일이 많이 소요되는 등 난점을 지니고 있어 예민한 면역학적 방법의 개발에 따라 손쉽게 결핵환자의 상태를 추적하기 위한 면역학적 연구가 활발히 시도되었다¹⁾. 여러가지 결핵항원을 사용한 연구보고들이 있었으나 그 결과는 일치하지 않았으며²⁻⁵⁾, 현재까지 항결핵 요법중 환자상태의 호전 또는 악화를 관찰할 수 있는 유용한 혈청내의 지표는 아직 확립되지 않았다.

혈청 Angiotensin Converting Enzyme(이하 ACE로 약함)이 폐에서 순환혈액내 Angiotensin I을

Angiotensin II로 전환시키는데 필요하다는 것이 입증된 이래⁶⁾, Lieberman 등⁷⁾에 의하여 유육종증(sarcomatosis)의 진단과 치료성과의 판정에 유용한 지표로 쓰이고 있음은 이미 잘 알려져 있다.

유육종증에서는 육아종(granuloma)으로부터 ACE가 생산되어⁸⁾ 질병의 활동성을 반영한다고 한다⁷⁾. 결핵도 유육종증과 같이 육아종을 형성하는 만성질환이므로 결핵환자에서도 ACE에 관한 연구가 진행되었다. 현재까지 보고된 바로는, 속립성 결핵에서 혈청 ACE치가 상승되어 있는 반면, 비속립성 폐결핵에서는 정상이거나 혹은 정상범위내에서의 저하를 보이는 것으로 보고되었다⁷⁻¹¹⁾.

항결핵요법후 ACE의 변화에 대해서는 Römer 등¹⁰⁾이 치료에 의한 임상상의 호전과 함께 저하되었던 ACE치가 점차 상승하여 정상화된다고 보고하였다. 그러나 항결핵 요법중의 혈청 ACE의 변동양상에 대한 보고는 없었다.

저자들은 비속립성 폐결핵 환자와 정상인의 혈청 ACE

본 연구는 1986년도 서울대학교병원 특진 연구비의 보조로 이루어진 것임.

활성을 비교하고, 항결핵요법중 혈청 ACE 활성의 변동 양상을 추적하여 혈청 ACE와 비속립성 폐결핵의 임상상(clinical status)과의 관련성을 조사하기 위하여 본 연구를 시행하였다.

대상 및 방법

1. 대 상

1986년 3월부터 1987년 2월까지 서울대학교병원 내과 외래에서 활동성 결핵으로 진단되어 항결핵제 투여중인 환자중 정규적 혈액채취가 가능했던 폐결핵 환자를 대상으로 하였다. 대상군의 성비는 남자 8명, 여자 4명 이었으며, 연령은 20세에서 71세 사이로 평균연령은 41.67 ± 17.86 이었다(Table 1).

폐결핵의 진단은 전신증상 및 호흡기증상과 전형적인 흉부 X-선 소견 및 객담 검사상 결핵균 양성을 기준으로 하였다.

흉부 X-선 소견상 중증도의 분류에 의하여 중등증이 10명, 중증이 2명이었고, 기관지 내시경에 의한 기관내 결핵(endobronchial tuberculosis)이 2명 이었다. 객담 검사상 도말 양성인 환자는 10명, 음성인 환자는 2명이었다. 객담 검사상 음성인 2명은 증상과 흉부 X-선 소견으로 활동성을 인정하여 검사대상에 포함시켰다.

대조군은 질병의 과거력이 없는 남자 8명, 여자 12명이었고, 이들의 연령은 22세에서 34세 사이로 평균연령은 28.90 ± 12.53 이었다. 환자군 및 대조군은 모두 20세 이상으로서 혈청 ACE치의 연령에 따른 차이를 배제하였다¹²⁾.

ACE의 측정에 필요한 표본혈액은 항결핵제 투여직전과 투여후 약 1개월 간격으로 정맥혈을 채취한 후 혈청을 분리하여 -20°C 에 보관하였다가 연구에 사용하였다.

2. 방 법

혈청 ACE의 측정은 Cushman과 Cheong⁶⁾의 방법을 변형한 Lieberman¹²⁾의 방법을 이용하였다.

기질은 0.1 ml의 hippuryl histidyl leucine을 사용하였으며, 여기에 0.15 ml의 혈청을 혼합하여 37°C 의 물속에서 1시간 동안 incubation 시킨다. 그후 0.25 ml의 1 N HCL을 넣어 반응을 중단시키고 5분 후 1.5 ml의 ethyl acetate를 tube에 넣고 정확히 15초간 vortex mixer에서 잘 혼합시킨다. 이것을 분당 2500 rpm으로

5-10분간 원심분리 한다. ethyl acetate 층(상층)을 1 ml pipetting하여 직경 1 cm 길이 7.5 cm의 tube에 넣고, ethyl acetate를 증발시키기 위해 120°C 에서 15분간 가열한다. 증발이 끝난 후 3 ml의 1M NaCl을 각 시험관에 첨가하여 잔여 hippuric acid를 모두 용해시킨다. 그 다음 1 cm cuvettes속에서 1M NaCl용액의 absorbance를 228 nm에서 15분후 reading한다. zero hour reading은 혈청을 넣지않은 독립된 기질에 0.25 ml의 1 M HCL을 첨가한 tube를 사용하여 비교하였다. 농도의 단위는 unit/ml(u/ml)로 ACE 1 u/ml은 37°C 에서 1분 동안 1 ml의 혈청에 의해 형성된 hippuric acid의 nanomole이 된다.

3. 통 계

통계는 ACE를 항결핵 치료직전과 치료중 농도의 차이를 산출하여 Student t-test와 Wilcoxon signed rank test로 유의성 여부를 판정하였다.

결 과

20명의 정상 대조군에서 혈청 ACE농도는 4.59 ± 1.65 u/ml이었고, 12명의 비속립성 폐결핵 환자에서 항결핵요법 시행직전 측정된 혈청 ACE농도는 3.38 ± 2.07 u/ml로서 환자군이 대조군보다 낮은 값을 보였으나, 양자간에 통계적으로 유의한 차이는 없었다($p > 0.05$) (Fig. 1).

Table 1. Clinical Information of Patient Group

Case No.	Sex	Age	Severity	Sputum AFB
1	M*	54	FA+	numerous
2	M	53	FA	rare
3	M	62	MA**	numerous
4	F†	71	MA	few
5	F	56	MA	numerous
6	M	44	MA	numerous
7	F	43	MA	numerous
8	M	21	MA	numerous
9	M	27	MA	numerous
10	F	29	MA	few
11	F	20	MA	negative
12	M	20	MA	negative

* : Male, † : Female, + : Far advanced,

** : Moderately advanced

12명의 비속립성 폐결핵 환자에서 월별로 측정한 혈청 ACE농도는 Table 2와 같으며 Wilcoxon signed rank test 결과 각환자의 월별 혈청 ACE농도간에 통계적으로 유의한 변동은 없었다(Fig. 2).

고 안

ACE는 신장의 근위부세뇨관(proximal convoluted

Fig. 1. Comparison of serum ACE activity between normal control subjects and nonmiliary pulmonary tuberculosis patients before and after antituberculous chemotherapy.

Table 2. Serum ACE Level in 12 Nonmiliary Pulmonary Tuberculosis Patients after Chermotherapy

No. of month Case No.	0*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.98	0.88	3.64	2.53	4.41	3.39	1.76	3.49	5.33	5.35	9.14	6.74	—
2	2.27	0.46	1.02	—	1.40	1.20	1.23	1.92	0.93	1.39	—	—	—
3	7.64	3.58	4.92	—	3.13	5.26	2.73	5.88	3.67	3.58	—	—	—
4	1.53	2.02	1.84	2.10	2.09	2.65	3.52	2.30	3.59	—	2.80	—	—
5	1.42	2.62	1.66	1.23	2.76	2.01	5.56	1.29	2.07	1.70	—	—	—
6	2.59	2.32	—	—	3.20	3.66	—	3.74	—	2.33	—	—	—
7	3.10	3.24	—	1.75	1.99	2.47	—	1.86	2.43	—	—	—	—
8	2.04	2.37	1.45	2.92	—	1.96	2.49	4.48	2.93	1.67	1.78	3.13	—
9	6.07	4.08	4.75	3.45	4.81	4.76	4.02	4.11	6.17	5.81	2.84	—	—
10	4.30	—	—	3.54	—	3.27	3.01	4.04	3.07	4.67	—	—	—
11	3.87	2.97	5.54	4.17	—	—	2.53	3.05	2.97	—	—	—	—
12	5.46	6.75	7.08	5.71	—	4.93	6.37	8.32	—	—	—	—	—

* Pretreatment ACE level

Fig. 2. Serum ACE activity during antituberculous chemotherapy.

tubules of the kidney) 표면을 이루는 상피세포내에서, 그리고 대부분의 모세혈관, 소장맥 및 일부의 동맥내면을 이루는 내피세포 표면에서 가장 많이 발견된다⁸⁾.

ACE가 angiotensin I을 angiotensin II로 전환시키는 것이 폐에서 이루어짐은 폐가 신체의 기관중 모세혈관망(capillary bed)을 가장 많이 소유하는 기관이므로 ACE가 순환혈액내 기질에 대하여 작용하는 장소가 되기 때문이다⁸⁾.

Angiotensin의 전환은 혈관내피세포의 주요 작용중 하나이며, 따라서 ACE 활성도는 혈관내피손상의 정도를 나타내는 지표가 될 수 있다¹³⁾. 한편 ACE는 유육종증(sarcoidosis) 및 Gaucher씨 병에서 증가되어 이들 질환의 활동성을 반영하기도 한다. 특히 유육종증의 치료 반응을 추적하는 데는 매우 중요한 지표로서 이용된다^{7,8,12,14)}.

유육종증 및 Gaucher씨병 이외에 혈청 ACE농도가 상승하는 것으로 알려진 질환들로는, 나병, 활동성 폐결핵의 일부(5%정도), 베릴리움증, 특발성 담도성 간경변(primary biliary cirrhosis), 규폐증, 석면증, 당뇨병 환자의 일부(특히 망막합병증이 있는 경우), 갑상선 기능항진증 등이며, 감소하는 것으로 알려진 질환들은, 만성 폐색성 폐질환, 성인성 호흡부전증후군, 폐암, 악성 임파종등이 있고^{8,13,15,16,17)}, 저산소증¹⁴⁾에서도 감소한다고 보고되고 있다.

유육종증에서 ACE농도 과다의 기전은, 유육종증에서의 비식회화 육아종(noncaseating granuloma)의 총체

라고 할 수 있는 단핵구-대식세포계열의 상피양세포(monocyte macrophage derived epithelioid cell)에 의한 ACE의 생산으로 믿어지며, ACE농도가 비식회화 육아종의 질량과 활동성을 반영하는 것으로 생각되고 있다⁸⁾. 이 때문에 혈청 ACE농도를 유육종증의 진단과 치료반응도의 판정에 이용하게되었다. 결핵도 유육종증과 같은 만성 육아종성질환임에 착안하여 결핵에서의 혈청 및 조직내 ACE농도에 관한 연구가 진행되었으며^{9,10,11)}, 우리나라에서도 오등¹⁸⁾에 의해 보고된 바 있다.

Lieberman은 활동성 폐결핵환자의 5%에서 혈청 ACE활성도가 증가됨을 보고하였고, 이 결과는 Fanburg 등, Gronhagen 등, Rohatgi 등, Silverstein 등, Studdy 등, Turton 등이 더 많은 대상환자로 평균 6%로 보고한 것과 일치한다⁸⁾. Thomas 등¹⁹⁾은 결핵균 배양 양성인 중증 폐결핵환자 14명에 대한 연구에서 폐에 국한된 경우 6예에서는 혈청 ACE활성도가 모두 정상이었으며, 급성 또는 아급성 속립성 결핵에서는 8예중 7예에서 증가한 것을 관찰하였다. 속립성 결핵에서 혈청 ACE활성도가 증가함은 Abe 등⁹⁾도 보고하고 있으며, 이들은 속립성 결핵시에는 전신의 망상계(reticuloendothelial system)가 활성화 되어 혈청 ACE농도가 증가한다고 제안하였다. 본 연구는 비속립성 폐결핵의 경우에만 국한하여 12예중 1예에서만(8%) 혈청 ACE가 증가해 있음을 관찰하였으며, 대상환자수를 더 늘리면 다른 저자들의 보고와 거의 일치할 것으로 생각된다. 이들의 보고와 본 연구에서 또 하나의 공통된 점은 비속립성 폐결핵의

대부분에서 혈청 ACE가 낮은 값을 보이지만 모두 정상범위에 속한다는 것인데, 이는 비속립성 폐결핵에서 혈관내피손상의 정도가 성인성 호흡부전 증후군과 같이 심하지 않음을 의미할 수도 있으며, 한편으로는 결핵의 석회화 육아종(caseating granuloma)이 ACE를 생산하지 않는 것을 의미할 수도 있다. 그러나, Tsuda 등¹¹⁾이 폐결핵 환자의 폐실질 병변의 상피양세포부위에서 ACE 농도가 증가해 있다는 것을 관찰한 사실을 근거로 생각해 보면, 비속립성 폐결핵시 폐조직내 혈관손상과 함께 혈청 ACE농도가 떨어지지만, 상피양세포에 의해 ACE가 생산되므로써 조직 ACE농도가 증가하고 이것이 혈액내로 유입되는 정도에 따라 혈청 ACE농도가 결정되는 것으로 보인다. 저자들의 생각으로는, 결핵에서의 상피양세포가 유육종증에서처럼 많은양의 ACE를 생산하지는 못하기 때문에 약 5%정도의 소수에서만 증가된 양상을 보이고, 나머지 대부분은 정상범위내의 증감을 보이는 것이 아닌가 생각된다.

폐결핵환자에서 11개월간 항결핵 치료후 혈청 ACE농도를 측정하여 치료전과 비교한 Römer 등¹⁰⁾에 의하면, 치료전에 비하여 치료후 증가함을 보고하였으나 이것도 역시 정상범위내에서의 변화였으며, 정확한 변화시기에 관한 언급은 없었다. 본 연구는 초기 9개월 동안의 변화를 관찰하였던 것으로 이 기간내에 혈청 ACE가 완전히 정상으로 돌아오지는 않았으며, Römer 등의 환자는 치료후 11개월로서 대조군과 차이가 나지 않을 정도로 정상화됨을 보고하였는데, 치료중에는 변화가 없다가 치료후 일정기간이 지나면서 혈청 ACE농도가 서서히 증가할 가능성이 크다.

위의 결과로, 혈청 ACE에 있어서 치료전에 정상과 차이가 없고, 치료중 변화 없으므로 결핵의 진단 및 치료 경과의 판정에 유용성은 없는 것으로 보아야 하겠다.

본 연구에서는 12명의 환자에서 초기결핵 치료 기간중 혈청 ACE활성도의 변동에 관하여 조사하였기 때문에 대상이 작고 관찰기간이 짧다는 제약을 받고 있어 앞으로 더 많은 대상환자와 더 오랜 연구기간을 두고 조사되어야 하며, ACE농도와 항결핵항체간에 연관된 연구도 필요할 것으로 생각된다.

결 론

1986년 3월부터 1987년 2월까지 서울대학교 병원 내

과 외래에서 치료받은 비속립성 폐결핵 환자 12명을 대상으로 매일 혈청 ACE치를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1) 20세 이상의 정상인 대조군 20명에서 혈청 ACE치는 4.59 ± 1.65 u/ml이었고 비속립성 폐결핵 환자로서 항결핵 치료전 혈청 ACE치는 3.38 ± 2.07 u/ml로서 폐결핵 환자군에서 혈청 ACE활성도가 낮게 나타났으나 정상 대조군과 통계적으로 유의한 차이는 없었다($p > 0.05$).

2) 12명의 비속립성 폐결핵 환자에서 항결핵 치료중 매일 혈청 ACE치를 측정비교한 결과 임상적인 호전에 따른 의미있는 변동은 없었다($p > 0.05$).

이상의 결과로 혈청 ACE활성도가 임상적으로 비속립성 폐결핵 환자의 치료성가를 판정하는 지표로서 이용되기에 적합하지 않을 것으로 사료되었다.

REFERENCES

- 1) Grange JM: The humoral immune response in tuberculosis: its nature biological role and diagnostic usefulness. In: Fox W. Serology of tuberculosis and BCG vaccination. Vol. 21, p 1, New York Karger Co 1984
- 2) Kaplan MH, Chase MW: Antibodies to mycobacteria in human tuberculosis I. Development of antibodies before and after antimicrobial therapy. J Inf Dis 142:852, 1980
- 3) Daniel TM, Debanne SM, van der Kuyp F: Enzyme linked immunosorbent assay using mycobacterium tuberculosis antigen 5 and PPD for the serodiagnosis of tuberculosis. Chest 88:388, 1985
- 4) 윤광선, 이춘택, 심영수, 한용철, 조명제, 차창용, 장우현: 폐결핵 치료에 따른 항결핵 항체가의 변화에 관한 연구. 결핵 및 호흡기질환 33:79, 1986
- 5) Khomenko AG, Auerbach MM, Litvinov VI, Gergert VJ: Effects of chemotherapy on the immunological characteristic of patients with primary destructive pulmonary tuberculosis. Bull WHO 62:763, 1984
- 6) Cushman DW, Cheong HS: Spectrophotometric assay and properties of angiotensin-converting enzyme of rabbit lung. Biochemical Pharmacology 20: 1637, 1971
- 7) Lieberman J, Nosal A, Schlessner LA, Foken AS: Serum angiotensin converting enzyme for diagnosis

- and therapeutic evaluation of sarcoidosis. *Am Rev Resp Dis* **120**:329, 1979
- 8) Rohatgi PK: Serum angiotensin converting enzyme in pulmonary disease. *Lung* **160**:287, 1982
 - 9) Abe Y, Mizuki M, Tsuda T, Sugisaki K, Yoshimatsu T: Elevated serum angiotensin converting enzyme in miliary tuberculosis. *Kekkaku* **60**:11:13, 1985
 - 10) Römer K, Harving H: Changes of SACE during antituberculous chemotherapy. *Lung* **161**:307, 1983
 - 11) Tsuda T, Yoshimatsu T, Onizuka O, Aoki T, Abe Y, Sugisaki K: Tissue angiotensin converting enzyme activity in various tuberculous lesions. *Kekkaku* **60**:12:17, 1985
 - 12) Lieberman J: Elevation of serum angiotensin converting enzyme level in sarcoidosis. *Am J Med* **59**:365, 1975
 - 13) Fourrier F, Chopin C, Wallaert B, Wattre P, Mangalaboyi J, Durocher A, Dubois D, Wattel F: angiotensin converting enzyme in human adult respiratory distress syndrome. *Chest* **83**, 4:593, 1983
 - 14) Ashutosh K, Keighley John FH: Diagnostic value of serum angiotensin converting enzyme activity in lung diseases. *Thorax* **31**:552, 1976
 - 15) Römer K: Angiotensin converting enzyme and its association with outcome in lung cancer. *Br J Cancer* **43**:135, 1981
 - 16) 한동철, 양동호, 김태준, 황성규, 박춘식, 공현호, 심영수, 한용철 : 성인성 호흡장애증후군에서의 angiotensin converting enzyme. *결핵 및 호흡기질환* **32**:46, 1985
 - 17) Bedrossian Carlos WM, Woo J, Miller WC, Cannon DC: Decreased angiotensin converting enzyme in the adult respiratory distress syndrome. *Am Soc Clin Pathologists* **70**, 2:244, 1977
 - 18) 오강렬, 최은영, 유관희, 안관용, 이양근, 박성희 : 폐결핵환자에서 혈청 Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE) 활성도의 변동에 관한 연구. *대한내과학회지* **30**:1, 1986
 - 19) Thomas AV, Ansari A, Khurana M, Niden AH: Elevated serum angiotensin converting enzyme in miliary tuberculosis. *Am Rev Resp Dis* **19**:83, 1979