담배와 肺疾患의 臨床

— 肺癌을 除外한 —

연세대학교 의과대학 내과학교실

金 起 鎬

Smoking and pulmonary diseases

Kiho Kim, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea

序 論

담배와 肺癌과의 관계는 그 命題 자체가 흥미롭고, 또 분명한 相關이 입증되기 때문에 그간 많은 학자들의 연구 조사 결과가 보고되어 왔다. 그러나 폐암 이외의 다른 호흡기질환과의 관계는 그다지 많이 알려져 있지 않은 것으로 생각되어, 본 종설에서는 우선 담배와 만성 폐쇄성 폐질환과의 관계를 다루고, 다음 그 밖에 몇가지 폐질환과의 관계에 대해 언급하고자 한다.

1. 담배와 慢性 閉鎖性 肺疾患

慢性氣管枝炎과 肺氣腫, 이 두가지 病은 그 觀念上的 혼란 때문에, 1959년 Ciba Guest Symposium이 열렸을 때, 肺氣腫은 순전히 形態的인 病變이 있는 것만으로 국한한다는 견해 때문에, 임상적으로 기침, 가래, 호흡곤란을 호소하고, 慢性氣管枝炎 이외의 원인이 생각되지 않는 경우에는 chronic nonspecific lung disease (CNSLD)라고 표현하자고 제의했다. 그 후 Williams (1963)는 임상적으로 肺氣腫을 진단하기가 어렵다는 이유로, 지속성 호흡곤란을 主症狀으로 하며, 臨床病態生理學的으로 기도폐쇄를 일으키는 질환을 chronic obstructive pulmonary disease (COPD)라고 명명했다. 이 COPD의 발병요인으로 흡연이 또한 가장 주목을 받고있다.

1) 여러 外國文獻에 대한 考察

1959년 Higgins¹⁾는 55~64세의 393명 남자를 대상으로, 1년에 3개월이상 기침과 가래가 나오는가 與否를 조

사한 결과, 그러한 증상이 비흡연자는 6%인데 비하여, 매일 1~14g의 담배를 피우는 사람은 20%, 매일 15g 이상인 사람은 42%까지 올라갔다고 보고하였다. 이 보고에서는 파이프, 여송연(呂松煙, cigar) 등 그 종류에 대해서 언급하고 있지 않지만, 1961년 Hammond²⁾는 30세 이상의 남자 18,697명, 여자 24,371명에게 앙케이트를 보내, 흡연습관과 여러가지 증상과의 관계를 조사하여 기침, 숨참, 식욕부진은 흡연과 有意한 相關이 있는 것을 밝혀냈다. 또 파이프나 여송연을 피우는 사람에 비해, 권연(捲煙, cigarette)을 태우는 사람은 모든 증상의 頻度가 높으며, 흡연량에 따라 증가했다. 한편 tar와 nicotin의 함량이 적은 담배 흡연자에는 기침하는 사람이 적었다.

다음 해인 1962년, Anderson³⁾도 만성호흡기질환과 권연과의 관계를 보고하고 있다. 즉 慢性氣管枝炎은 흡연이 나이보다 더 중요한 因子이긴 하지만, 비가역성 폐쇄성 폐질환(irreversible obstructive lung disease)에는 나이, 흡연 兩 因子가 모두 관계하고 있다. 또 그는 나이와 흡연 두가지의 영향을 나타내는 指標로서, 흡연을 시작했을 때부터의 聰吸煙量이 중요하다고 말하고 있다. 같은 해, Brinkman⁴⁾은 Detroid 근방 공장노동자 1,317명을 대상으로 조사했는데, 이는 1일 吸煙個數×吸煙年數를 指標(이것을 Brinkman指數 또는 pack/year로 표시해, 현재 널리 쓰여지고 있다)로, 0은 비흡연자, 1~199는 輕度 흡연자, 200~599는 中等度 흡연자, 600 이상은 高度 흡연자(heavy smoker)로 분류하였다. 그리고 과거 6개월이상 매일 기침과 가래가 계속된 자를 慢性氣管枝炎으로 定義하여 조사해 본 결과, 慢性氣管枝炎

은 高度 흡연자가 비흡연자에 비해 거의 3배에 달한다고 보고하고 있으며, 나이보다 흡연의 영향을 더 強調하고 있다. 1962년, New England Journal of Medicine⁵⁾은 그 논설에서 慢性氣管枝炎, 肺氣腫과 흡연과의 관계는 이전보다 더 확실히 입증되었다고 하면서 兩者의 밀접한 관계를 강조하고 있는데, 그 후에도 이와 비슷한 보고는 계속 나오고 있다. Wendel^{6,7)}은 肺氣腫환자, 慢性氣管枝炎환자 및 正常 對照群의 吸煙歷을 분석하여, 肺氣腫, 慢性氣管枝炎 보다 흡연군에 有意하게 많았다고 보고하면서 그 원인으로 흡연의 영향을 강조하고 있다.

Golli(1970)⁸⁾는 2,492명을 대상으로 Fletcher의 定義에 의한 慢性氣管枝炎 환자의 빈도를 조사하여, 비흡연군에서는 30세미만 0.8%, 30~50세 3.6%, 50세이상 10.9%였는데 반해, 흡연군에서는 각각 12.1%, 25.1%, 35.5%로 증가해, 慢性氣管枝炎에 있어서 나이와 흡연의 영향이 적지 않은 것을 보고하고 있다.

Higgins(1977)⁹⁾는 3,837명의 남녀를 대상으로 같은 조사를 실시해, 비흡연자 또는 前吸煙者(ex-smoker)에 비해, 권연 흡연자는 慢性氣管枝炎에 더 많이 걸렸다고 보고하고 있다. 그러나 파이프 또는 여승연 애호가들은 慢性氣管枝炎에 걸리는 빈도가 낮아서, 비흡연자와 거의 비슷하다고 했다. 이것은 권연에 비해 파이프나 여승연 흡연자들은 폐속까지 연기를 들여 보내는 소위 肺臟吸煙者는 드물고, 입 안에만 연기를 머물게 하는 口腔吸煙者가 많기 때문인 것으로 풀이하고 있다.

2) 高齡 吸煙者와 慢性氣管枝炎

Milne(1972)¹⁰⁾는 62세이상의 노인 남녀 487명을 대상으로, 호흡기 증상과 흡연을 조사하였다. 그에 따르면 지속성 기침, 가래는 남성 흡연군 38%, 남성 비흡연군 7%, 여성 흡연군 18.6%, 여성 비흡연군 6.1%에서 볼 수 있었으며, 흡연군의 경우 남자는 여자보다 약 2배 많았지만, 비흡연군에서는 남녀의 差를 볼 수 없었다. 또 천명(喘鳴, wheezing)도 비흡연군의 남녀 각각 25.6%, 31%인데 비해, 흡연군에서는 55.6%, 46%로 남녀 모두 흡연의 영향이 뚜렷한 것을 볼 수 있었다. 또한 기침, 가래와 흡연사이에 有意한 관계를 볼 수 있었으나, 천명과 흡연 사이에는 별 상관 없었다고 말하고 있다.

3) 女性 吸煙者와 慢性氣管枝炎

Woolf(1974)¹¹⁾는 25~54세의 건강한 여성 500명의 호흡기 증상, 객담 검사, 호흡기능을 검사해 흡연습관과의 관계를 조사하였다. 그 결과 기침, 가래의 빈도는 비흡

연자, 前吸煙者 보다 흡연자에서 有意하게 높은 것을 보였으며, 또 흡연량과 平行해 증가하였다. 또한 慢性氣管枝炎의 빈도는 흡연에 따라 급속히 증가 하였으며, 소위 heavy smoker(140 個/週 이상의 흡연자)에서는 약 반수(46%)가 慢性氣管枝炎이었다. 또 前吸煙者의 호흡기 증상, 理學的 이상소견은 예상보다 드물었는데, 이것은 흡연에 의한 기능장애는 斷煙으로 개선되는 可逆性인 것을 示唆한다고 말하고 있다.

한편 Carilli(1973)¹²⁾는 호흡기질환의 既往症과 粉塵歷이 없는 여성의 흉부 X-선을 검토한 결과, 흡연자에는 彌慢性 線狀陰影과 小結節狀 陰影 즉 慢性氣管枝炎의 X-線像과 類似한 像을 나타내는 사람이 많았다고 보고하고 있다. 이와 같이 남자에 비해, 여자에게는 慢性氣管枝炎이 적은 것으로 되어 있지만, 흡연자 특히 高度 흡연자인 경우는 慢性氣管枝炎의 男女差는 거의 없었다. 앞으로 흡연여성이 날로 늘어가고 있는 오늘날의 世態로 보아 언젠가는 여성흡연이 큰 社會문제로 대두할 날이 오리라고 생각한다.

4) 吸煙 方法과 慢性氣管枝炎

이상으로 흡연자에는 慢性氣管枝炎 환자가 많다는 것이 분명해 졌으며, 다음에는 여러가지 흡연의 방법과 慢性氣管枝炎의 발생빈도에 대해서 말하고자 한다.

Rimington(1972)¹³⁾는 Lancashire지방의 흉부X-선 집단검진을 받은 40세 이상의 남자 10,414명을 대상으로, 그 吸煙歷, 吸煙量, 담배의 종류, 흡연의 방법을 조사하였다. 그리고 과거 2년간에 걸쳐 기침, 가래가 1년중 거의 대부분에 걸쳐 있는 자 및 1년에 3개월 이상 있는 자로서, 흉부 X-선상 다른 基礎疾患이 없는 자를 慢性氣管枝炎으로 단정 하였다. 10,414명 중 흡연자는 5,438명, 비흡연자는 4,976명이었는데, 5세 간격으로 묶은 연령별 그룹을 조사해 본 결과, 나이가 많아짐에 따라 慢性氣管枝炎 환자는 증가하며, 또 흡연량과도 平行해 증가를 나타냈는데, 이는 다른 조사결과와도 일치하는 것이다.

(1) 필터(Filter)의 效果

Rimington은 여러가지 흡연법 가운데 우선 필터 담배와 보통 담배와를 구별해서 매일 가래의 발생빈도에 차이가 있는가 여부를 조사 하였다. 이에 의하면 3,045명이 필터 담배를, 2,393명이 필터가 없는 보통담배를 피우고 있었는데, 매일 가래를 호소한 자는 필터군에서는 31.9%, 보통군 37.2%로 有意하게 적었다. 이것은 나이, 흡연량을 고려했을 때에도 같은 결과를 보였는데, 이러

한 결과로 그는 필터 담배를 피우면 慢性氣管枝炎과 같은 증상은 덜 생긴다고 필터의 효과를 강조하고 있다.

(2) 口腔吸煙과 肺臟吸煙

Rimington¹⁴⁾은 또 담배 연기를 깊이 들이마시는 사람과 들이마시지 않는 사람에 대하여 비교하였다. 대체로 입으로 들어가는 主煙氣중의 nicotine과 tarr의 양은 구강흡연시에는 10%미만이 체내에 殘留하게 되지만, 폐장흡연시에는 95%가 체내에 잔류하는 것으로 알려져 있다.

그에 의하면 5,438명의 흡연자 중 4,619명(85%)이 연기를 깊이 빨아 들이는 소위 inhaler(폐장흡연자)였고, 나머지 819명(15%)은 가슴 안까지 들어 보내지 않는 non-inhaler(구강흡연자)라고 대답하였다. Inhaler에서는 흡연량에 比例해 慢性氣管枝炎 환자가 증가 하였지만, non-inhaler에서는 흡연량과 慢性氣管枝炎 사이에 相關이 없었다. 한편 나이와 흡연량을 고려해 보면, inhaler의 慢性氣管枝炎의 빈도는 37.9%에 達해 non-inhaler의 25.7%에 비해 높았으며, 따라서 폐장흡연은 대단히 위험한 흡연법인 것을 알 수 있다.

(3) Drooping

흔히 담배를 피울 때, 연기를 내 뿜을 때에도 계속 입에 물고 떼지 않는 사람이 있는데, 이런 버릇을 영어로 drooping라고 한다.

Rimington의 조사¹⁵⁾에 보면 5,438명의 흡연자 중 460명(8.4%)이 drooping의 습관을 가지고 있었다고 한다. Drooping군에서는 慢性氣管枝炎의 빈도가 상당히 높아서, 다른 정상흡연군의 33.6%에 비해 41.5%로 높았으며 이 差異는 나이와 흡연량을 고려했을 때에도 變動이 없었다. 한편 Drooping 군에는 필터가 없는 보통담배 흡연자가 많았으며, 또 사회적으로도 저소득층에 많은 것 같이 보였다. 좌우간 drooping은 慢性氣管枝炎의 進展과 肺癆 사망률의 증가라는 점에서도 대단히 위험한 흡연법이라고 말할 수 있다. 그 밖에 後述하는 受動性吸煙의 입장에서도, 主煙氣외에 항상 생담배 타는 연기인 副煙氣를 함께 흡입한다는 것도 큰 문제라고 말할 수 있다.

(4) Re-lighting

또 다른 흡연습관으로 re-lighting이라는 것이 있다. 이것은 피우던 담배를 일단 꺾다가, 얼마 후 다시 불을 부쳐 피우는 것으로 우리 주위에서 얼마든지 볼 수 있다. 이 re-lighting群의 慢性氣管枝炎 빈도는 39.7%로 다른 흡연자의 32.9%에 비해 유의하게 높다($p < 0.001$). Re-lighting하는 사람들 중에는 필터가 없는 담배를 피

우는 사람이 많으며, 또 사회적으로 저계급층이 많다는 것도 원인의 하나로 생각되고 있다. 즉 피우다 남긴 담배 공초를 끝까지 태우기 때문에, 같은 한 가치의 담배라 할지라도 더 많은 양의 tarr와 nicotine을 마시게 된다고 볼 수 있다.

이상 말한 여러가지 흡연의 방법을 생각해 볼 때, 담배 한대를 피울 때에도, 되도록 필터가 달린 담배를 택해서, 너무 가슴 깊숙히 들이마시지 않을 것과, 태우지 않은 담배가 어느정도 남아있는 상태에서 버리는 것이 慢性氣管枝炎에 덜 걸리는 방법이라고 말할 수 있다. 이러한 흡연습관은 특히 여성흡연자에 많으며, 여성흡연자에게 慢性氣管枝炎이 적은 것도 이런데 원인이 있지 않은가 생각된다.

5) 受動的 吸煙

지금까지 말한 것은 흡연자 자신이 받는 흡연의 영향이었지만, 흡연자 주위의 사람들에게 주는 흡연의 영향도 무시할 수 없을 정도로 크다. 이것을 흡연자의 active smoking에 대해 passive smoking 수동적 흡연이라고 부르고 있다. 쉽게 말해 담배 연기에는 點火部에서 담배를 통과해 口腔에 이르는 主煙氣(main stream smoke)와 점화부에서 직접 타오르는 副煙氣(side stream smoke)의 둘로 크게 나눌 수 있는데 수동적흡연에서는 이 부연기의 영향을 크게 받게된다. 최근 “嫌煙權”이라는 말을 자주 듣게 되고, 비행기나 기차 안에 금연석을 따로 마련하는 것은 다 이 수동적 흡연의 영향을 피하기 위한 조치라고 볼 수 있다. 수동적흡연은 성인에게 보다 적먹이 또는 어린 아이들에게 주는 영향이 더 크다. Harlap 등¹⁶⁾은 乳兒의 생후 1년간의 입원상황을 조사해, 母親이 흡연자인 경우 乳兒가 기관지염 혹은 폐염으로 입원하는 빈도는 비흡연자의 경우에 비해 有意하게 높았으며, 다시 흡연량의 증가에 따라 입원율이 높아진다고 말하면서 이러한 경향은 특히 겨울 철에 현저했다고 한다.

Colley¹⁷⁾는 신생아 2,205예를 대상으로, 생후 5년간에 걸쳐 폐염과 기관지염의 이환율조사와 동시에 양친의 흡연습관과 호흡기증상을 조사하였다. 그 결과, 생후 1년간의 폐염, 기관지염 이환율은 양친의 흡연습관과 밀접한 상관이 있으며, 양친 모두가 흡연자인 경우 가장 높았고, 양친 모두 비흡연자인 경우 가장 낮았다. 양친 중 어느 한쪽 만이 흡연자인 경우는 그 중간에 해당됐다. 그러나 생후 2년이 지난 후에는 이러한 관계가 뚜렷하지 않았는데 이는 授乳期를 지나 부모로부터 떨어지는 기회

가 많아져, 자연 수동적흡연에서 멀어지기 때문으로 생각된다.

2. 담배와 그 밖의 肺疾患

지금까지 말한 담배와 폐암, COPD 특히 慢性氣管枝炎과 肺氣腫과의 관계는 이제 어느정도 定設이 되어 있지만, 거기에 비해 그 밖의 기관지염, 폐질환과 담배와의 관계는 현 시점에서 분명치가 않다. 따라서 여기서는 주로 기관지, 폐질환과 담배와의 관계에 대한 지금까지의 知見을 말하고자 한다.

1) 담배와 肺結核

담배와 결핵과의 관계는 아주 오래된 문제로서 결핵환자에게 흡연을 허가해야 되는가 안되는가는 임상의의 일상 당면하는 고민이었다. 그러면서도 이 양자를 대상으로 한 연구논문은 그리 많지 않다. 화학요법의 진보와 예방의학의 발달로 선진국에서는 담배소비량의 증가에도 불구하고, 결핵의 사망율과 有病率은 激減하고 있다. 이 사실은 마치 흡연이 결핵을 악화시키는 중요한 인자가 아니라는 것을 입증하는 듯이 보이지만, 한편 흡연자에게 결핵이 많다는 보고도 없는 것은 아니다.

1956년 Lowe¹⁸⁾는 결핵환자 1,200명, 대조군 979명에 대해 흡연습관을 검토하여 30세 이상의 남녀에서는 대조군에 비해 결핵환자에게 흡연자가 많았다고 보고했다. 또 Adelstein 등(1967)¹⁹⁾은 76,587명의 檢診受診者에 대해 흡연과 폐결핵의 관계를 조사했다. 거기에 따르면 남녀 모두 폐결핵 유병율은 비흡연자에 비해 흡연 특히 권연 흡연자에게 많았으며, 前吸煙者, 파이프 흡연자는 그 중간이었다. 또 흡연자에서는 그 흡연량이 증가함에 따라 유병율도 증가하였다. 排菌과의 관계는 X-선상 폐결핵으로 진단된 비흡연 환자 12예 중 배균자는 1예 뿐인데 반해, 흡연환자 70예 중 배균자는 22예에 달했다고 말했다.

그러나 답답한 것은 흡연이 어떠한 機轉으로 결핵에 영향을 미치는가에 대해서는 거의 조사된 바가 없다. 기관지 粘膜의 纖毛運動이 담배 연기로 저하된다고 하는 것은 잘 알려져 있는 사실인데, 그것이 사실이라고 하면 결핵균이 들어있는 가래가 氣道에 停滯하여, 吸引으로 다른 부위에 채 병변을 일으킬 가능성이 높을 것이며, 기관지결핵도 생기기 쉽다는 것을 추측할 수 있다. 다만 그러한 과정이 현행 화학요법하에서 어느 정도의 의미를 갖게 되는가는 아직도 의문으로 남아 있다. 최근에는 담배

와 면역과의 관계도 문제가 되고 있다.

이상과 같이 담배와 결핵에 대하여는 보고도 적고, 분명치 않은 점도 많아 앞으로의 연구가 기대된다.

2) 담배와 肺纖維症(Diffuse Pulmonary Fibrosis)

Auerbach 등(1963)²⁰⁾은 1,582예의 부검예를 검토한 결과, 흡연에 의한 병리학적 변화로서 다음의 4항목을 들었다. 즉 ① 肺泡隔壁의 파괴, ② 폐포격벽의 肥厚, 섬유화, ③ 소동맥벽의 비후, ④ 細小動脈의 비후 등이다.

이러한 사실로 Weiss(1969)²¹⁾는 흡연과 폐섬유증의 관계를 조사하였다. 즉 그는 흉부 X-선상 정상에 비해 肺紋理가 증강되고, 폐 말초에까지 파급된 것을 미만성 폐섬유증(diffuse pulmonary fibrosis)으로 정의했다. 그리고 2,825명을 대상으로 70 mm 간접촬영과 問診을 시행한 결과 diffuse pulmonary fibrosis는 40예 (1.4%)에서 볼 수 있었다. 또 흡연과의 관계는 비흡연자 0.6%에 대해, 권연 흡연자는 2.1%로 증가되어 있었다. 한편 흡연기간이 20년 이하인 경우에는 비교적 적었지만, 30년 이상에서는 현저히 증가 했다고 보고하고 있다. 그리고 그는 炭素가 NO₂의 carrier 작용도 한다는 실험결과와 剖檢肺에 있어서 black pigment와 肺氣腫, 肺纖維症과의 상관을 들어 다음과 같이 고찰하였다. 즉 탄소등의 微粉子物質이 담배의 유독가스와 자극물질을 폐조직에 침착시키는 carrier로 작용해, 국소에 고농도로 침착시키는 결과, 국소과파, 섬유화를 이끈다는 것은 충분히 생각할 수 있으며, 따라서 흡연은 diffuse pulmonary fibrosis의 원인이 될 수 있다고 말하고 있다.

3) 담배와 石棉肺

석면폐 환자에게 폐암이 많이 생긴다는 것은 周知의 사실이며, blue asbestos(crocidolite)의 癌原性이 의심받고 있다. Selikoff 등(1968)²²⁾은 4년간에 걸쳐, 석면공장 남자종업원 370명의 폐암사망과 흡연의 관계를 조사했다. 그 결과에 의하면, 87명의 비흡연자에는 폐암사망이 하나도 없었지만, 권연 흡연자 238명중 24명이 폐암으로 영향이 더 해질 때, 일반주민 비흡연자에 비해 92배나 더 폐암사망의 위험이 있다고 볼 수 있다. 그러면서 그는 石線폭로 만으로 폐암의 합병을 설명하기는 곤란하다고 말하고 있다.

한편, Berry 등(1972)²³⁾도 비슷한 조사를 한 결과, 석면폭로가 輕度내지 중등도인 경우에는, 흡연자와 비흡연자 사이에 폐암합병에 유의한 차가 없었지만, 장기간, 고농도의 폭로를 받은 흡연자에서는 유의하게 고율의 폐암

합병을 볼 수 있었다. 또 Berry 등은 특히 석면공장에 서는 석면과 담배라는 두 carcinogen이 폐암발병에 相乘的으로 작용하는 것을 시사하고 있다. 이와 같이 석면 폐와 폐암의 합병은 석면분진흡입 이외에 흡연이 co-factor로서 작용하는 모양이다.

4) 담배와 自然氣胸

자연기흉은 젊은이에게 많이 오는 병으로, 그 원인으로는 bulla, bleb 등의 파열로 일어나는 것이 대부분이라고 말하고 있다.

Bulla, bleb의 發生機序는 아직 잘 모르지만, 先天的 素因設, 炎症設, 전신성 질환설 등에 더해서, 최근에 대기오염설도 주목을 받고 있다. 그런 관계인지는 모르나 최근 자연기흉이 많아지는 경향을 보이고 있는데, personal pollution이라고도 말할 수 있는 흡연 또한 어느 정도 관계가 있지 않을까 흥미를 끄는 命題라고 생각한다. Zivy(1970)²⁴⁾는 자연기흉 환자 40예 중 흡연자는 90%로, 대조군 69.7%에 비해 많았다고 한다. 한편 Jansveld 등(1975)²⁵⁾도, 본증환자에 흡연자가 많은 것을 지적하여, 흡연이 자연기흉의 한 원인이 된다고 말하고 있다. 그 밖에, 흡연자에 bulla, bleb이 고율로 나타난다는 보고²⁶⁾도 있다.

REFERENCES

- 1) Higgins ITT: Tobacco smoking, respiratory symptoms, and ventilatory capacity. *Brit Med J* **II**:257, 1959
- 2) Hammond EC: Smoking in relation to physical complaints. *Arch Environ Health* **3**:146-164, 1961
- 3) Anderson DO, Ferris BG: Role of tobacco smoking in the causation of chronic respiratory disease. *New Eng J Med* **267**:787-794, 1962
- 4) Brinkman GL, Coates OE: The prevalence of chronic bronchitis in an industrial population. *Amer Rev Resp Dis* **86**:47-54, 1962
- 5) Editorial: Tobacco and respiratory disease. *New Eng J Med* **267**:834-835, 1962
- 6) Wendel VH: Beziehungen zwischen Nicotinabusus und Lungenemphysem. *Zshr inn Med* **21**:777-780, 1966
- 7) Wendel VH: Zur Bedeutung des Rauchens für die chronische Bronchitis. *Zshr inn Med* **23**:147-151, 1968
- 8) Golli V: L'influence de l'usage du tabac et de l'émoussierage sur la fréquence des bronchitis chroniques. *Presse Méd* **78**:1542-1543, 1970
- 9) Higgins WH, Keller JB, Metzner HL: Smoking, socioeconomic status, and chronic respiratory disease. *Amer Rev Resp Dis* **116**:403-410, 1977
- 10) Milne JS, Williamson J: Respiratory symptoms and

smoking habits in older people with age and sex differences. *Respiration* **29**:359-370, 1972

- 11) Woolf CR: Clinical findings, sputum examinations, and pulmonary function tests related to the smoking habits of 500 women. *Chest* **66**:652-659, 1974
- 12) Carilli AD, Kotzen LM, Fischer MJ: The chest roentgenogram in smoking females. *Amer Rev Resp Dis* **107**:133-136, 1973
- 13) Rimington J: Phlegm and filters. *Brit Med J* **II**:262-264, 1972
- 14) Rimington J: Cigarettes smoker's chronic bronchitis: Inhaler and non-inhalers compared. *Brit J Dis Chest* **68**:161-166, 1974
- 15) Riminton J: Chronic bronchitis Method of cigarette smoking. *Brit Med J* **I**:776-778, 1973
- 16) Harlap S, Davis AM: Infant admission to the hospital and maternal smoking. *Lancet* **I**:529-532, 1974
- 17) Colley JRT, Holl, WW Corkhill RT: Influence of passive smoking and parental phlegm on pneumonia and bronchitis in early childhood. *Lancet* **II**:1031-1034, 1974
- 18) Lowe CR: An association between smoking and respiratory tuberculosis. *Brit Med J* **10**:1081-1086, 1959
- 19) Adelstein AM, Rimington J: Smoking and pulmonary tuberculosis An analysis based on a study of volunteers for mass miniature radiography. *Tubercle* **48**:219-226, 1967
- 20) Auerbach O, Stout AP, Hammond EC, Garfinkel L: Smoking habits and age in relation to pulmonary changes. *New Eng J Med* **269**:1045-1054, 1963
- 21) Weiss W: Cigarettes smoking and diffuse pulmonary fibrosis. *Amer Rev Resp Dis* **99**:67-72, 1969
- 22) Selikoff IJ, Hammond EC, Churg J: Asbestos exposure, smoking, and neoplasia. *JAMA* **204**:106-112, 1968
- 23) Berry G, Newhouse ML, Turok M: Combined effect of asbestos exposure and smoking on mortality from lung cancer in factory workers. *Lancet* **II**:476-479, 1972
- 24) Zivy P: Le pneumothorax spontané des fumerus. Le poumon tabagique. Tabagisme alvéolaire et troubles métaboliques. *Rev Tuberc Pneum* **34**:125-158, 1970
- 25) Jansveld CAF, Dijkman JH: Primary spontaneous pneumothorax and smoking. *Brit Med J* **4**:559-560, 1975
- 26) Stolof IL, Samuel B: Another hazard of smoking Bullous disease of the lung. *Arch Environ Health* **25**:415-419, 1972