거대 미만성 전 종격동 음영

고려대학교 의과대학 내과학교실

권 현 민 · 최 동 섭 · 유 세 화

증 례

60세 여자환자로 내원 약 3일전 부터 시작된 구토 호흡곤란 증상이 악화되고 의식이 흐려져 내원하였다. 과거력상 약 15년전에 류마치성 관절염으로 진단을 받고 자의로 부신피질 호르몬을 복용해 오고 있었으며, 약 7년동안 해소기침의 병력 있는것 외에는 특이한 병력은 없었다.

입원시 이학적 검사상 안면 혈관확장, buffalo hump, 중심비만, 사지근 위축등의 쿠싱증후군의 모습이었고 흉부청진상 호흡음은 전체적으로 감소되었고 특히 우측에서 더욱 감소되어 있었으며 천명이 양폐야에서 광범위하게 들렸다. 복부 진찰상 복부가 팽만되어 있는 외에는 종괴나 압통은 없었고, 사지에서도 곤봉상 수지나 청색증의 소견은 없었다.

흉부 단순 X-선촬영에서 우측 심장연에 따라 음영증

가와 상부 및 전종격동의 확대소견을 보였다(Fig. 1,2).

진 단

내원시 대기중에서 검사한 동맥혈가스분석은 PaO_2 61.6 mmHg, PaCO_2 36.7 mmHg였고, 폐기능검사에서는 FVC는 정상추정치의 29%, FEV_1 은 28%였고, 기류양환으로도 심한 제한성 장애 유형의 환기장애를 보였다. 심전도검사는 저전위를 보였다. 오전 8시에 측정된 cortisol, ACTH농도는 각각 $1.5 \mu\text{g/dl}$, 23.12 pg/ml 로 저하되어서 의인성 쿠싱증후군에 합당한 소견을 보였다. 전종격동 종양이나 흉막저류를 의심하여 흉막천자를 시행하였으나 dry tap이 되었다. 전산화단층촬영에서 전종격동의 지방종증이 의심되어(Fig. 3,4) 흡인침생검을 시행하여 성숙된 지방세포를 주로 관찰할 수 있었다(Fig. 5).

이상의 결과로서 광범위한 피하지방조직의 과발육과

Fig. 1. Chest PA; Rt heart margin, diaphragm are ill defined and widening of superior mediastinum is seen.

Fig. 2. Chest Lt lat; The relatively decreased density is seen between the sternum and heart. The heart is posteriorly displaced.

Fig. 3.4. Chest CT; Well demarcated low density lesion is seen in the anterior mediastinum and this lesion extends to right side. Diffusely increased subcutaneous fat in chest wall is well seen.

전산화 단층촬영에서 지방음영의 증가, 조직소견을 토대로 부신피질호르몬의 장기 사용으로 유발된 종격동 지방종증(steroid induced mediastinal lipomatosis)으로 진단하였다. 환자는 부신피질 호르몬을 최소로 감량하고 대증치료를 하면서 외래 추적중이다.

고 안

종격동 지방종증은 단순 흉부 X-선에서 관찰되는 종격동 확장의 흔한 원인으로 알려져 있다. 중요 원인으로 는 비만, 쿠싱증후군이 있으며 또한 교원질 혈관질환을 치료하거나, 장기이식후 부신피질 호르몬을 장기 복용 하는 경우에도 올수 있는것으로 되어 있으며 그외의 경우에도 보고된 바 있다^{1,3,5}.

저자에 따라서는 종격동의 확장을 보일수 있는 일일 평균 prednisone의 용량이 44 mg이며 일일 평균 30 mg 이하로 복용하는 경우엔 종격동 확장이 관찰되지 않았음을 보고한 바 있다².

종격동 지방종증의 발생부위를 보면 전, 중, 후 종격동 모두에서 발생하며 전 종격동에서 가장 흔히 관찰되고 있다. 종격동 이외의 장소에서도 지방 축적이 있을 수 있으며 소위 "dewlap" tumor로 불리는 것으로 상흉골에 지방의 과 성장이 있는 경우를 말하며, 천골 전방에 지방 축적이 되는경우 직장의 전방 전위를 야기하기도 한다. 그외 심방 인접부위, 우심방, 심횡격막각, 척추주위에서도 지방의 침착이 관찰되고 있다^{2,4,7}.

Fig. 5. Mature adipose tissue (H & E. x400)

본 증례에서도 전 종격동 외에도 광범위한 피하지방의 발달과 심낭주위에서도 지방축적이 관찰되었다.

종격동 지방증증을 갖고 있는 환자에서는 임상적으로 증상이 없는 경우가 대부분이나 지방종의 크기에 따라선 호흡곤란, 기침, 흉통, 체중감소등이 보고되기도 하였다⁷⁾. 본 증례에서는 호흡곤란과 동반되어 종격동 및 우 폐에 광범위하게 증가된 음영으로 인하여 입원 당시는 흉막 삼출액을 의심하여 흉막천자를 시행하였었다.

단순 흉부X-선상 종격동 음영의 증가는 중앙, 임파선의 비대, 갑상선비대, 식도나 대혈관의 확장등 여러가지 원인에 의해 올 수 있기 때문에 이들 원인과 지방종증과의 감별이 필요하다^{2,5)}

대개의 지방종증의 경우 흉부 단순X-선촬영에서 종격동 상부의 음영증가를 보이며 일정 기간동안의 관찰을 통하여 음영의 변화를 관찰할 수 있다.

지방종증에 의한 종격동 음영 증가를 의심할수 있는 소견으로는 (1) 의인성 쿠싱 증후군이 존재시 (2) 서서히 증가하는 무증상의 종격동 종괴 (3) 두드러지게 보이는 심외막 지방 패드 존재시 (4) 부신피질 호르몬의 투약중단이나 감량과 더불어 종격동의 넓이나 심외막 지방 패드 크기의 감소등이 있을때 등이다^{3,4,8)}.

과거에는 감별을 위한 특수 진단방법으로 바륨식도조영, 기관지경검사, 종격동경검사, 방사성 동위원소주사, 혈관조영술등이 이용되었었다. 현재 종격동 음영증가가 있을때 널리 사용되고 있는 손쉽고 정확한 진단방법은 전산화 단층 촬영법으로 지방종증의 경우 지방특유의 CT감쇄상수(attenuation coefficient: $-100 \sim -30$ HU)로써 확인할 수 있으므로 거의 대부분의 경우 개흉

술과 같은 침습적인 진단방법을 피할 수 있다^{1,6,9)}.

종격동 지방종증은 양성종양으로서 부신피질 호르몬의 투약중지나 체중 감량에 의해 종양크기의 감소가 오는 것으로 보고되고 있다⁹⁾.

REFERENCES

- 1) Homer MJ, Wechsler RJ, Carter BL: Mediastinal Lipomatosis, CT confirmation of a normal variant. *Radiology* 128:657, 1978
- 2) Price JE, Rigler LG: Widening of the mediastinum resulting from fat accumulation. *Radiology* 96:497, 1970
- 3) Bodman SF, Condemni JJ: Mediastinal widening in iatrogenic Cushing syndrome. *Annals of Internal Medicine*, Volume 67 No. 2 1967
- 4) Cohen SL: The right pericardial fat pad. *Radiology* 60:391, 1953
- 5) Teates CD: Steroid induced mediastinal lipomatosis. *Radiology* 96:501, 1970
- 6) Santini LC, Williams JL: Mediastinal widening (presumably lipomatosis) in Cushing syndrome. *N Engl J Med* 284:1357, 1971
- 7) Lucena GE, Bennett WM, Pierre RV: Dewlap: a corticosteroid induced episternal fatty tumor. *New Eng J Med* 275:834, 1966
- 8) Drasin GF, Lynch T, Temes, GP: Ectopic ACTH production and mediastinal lipomatosis. *Radiology* 127:610, 1978
- 9) Putte LBA van de, Wagenaar JP, San KH: Paracardiac lipomatosis in exogenous Cushing syndrome. *Thorax* 28:653, 1973

== Abstract ==

A Huge Increased Density in the Anterior Mediastinum

Hyun Min Kyeon, M.D. Dong Soub Choi M.D. Se Hwa Yoo M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Korea University, Seoul, Korea

Mediastinal lipomatosis is a common benign cause of mediastinal widening. While it may be associated with exogenous obesity, steroid ingestion or Cushing syndrome, these factor are often not present. Evaluation of the mediastinum by CT should be the initial diagnostic study in the work-up of patients with abnormalities of the mediastinal contour.

We report a case of extensive anterior mediastinal lipomatosis induced by steroids, with brief review of the literatures.