□ 원 저 □

폐암의 수술수기에 대한 임상적 고찰*

연세대학교 의과대학 흉부외과학교실

이 두 연

내과학교실

김 성 규

방사선과학교실

김 귀 연

= Abstract =

Operative Methods for the Treatment of Lung Carcinoma

Doo Yun Lee, M.D.

Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

Sung Kyu Kim, M.D.

Department of Internal Medicine

Key Yen Kim, M.D.

Department of Radiology

We have reviewed 200 cases of primary carcinoma of the lung for 14 years from March, 1976 to February 1990 at the Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea.

There were 60 males & 40 females with 77% ranging above 50 years old. There were 133 (26.6%) cases of squamous cell carcinoma, 37 (7.4%) cases of adenocarcinoma, 9 (1.8%) cases of bronchoalveolar cell carcinoma, 8 cases of large cell carcinoma and 4 cases of adenosquamous cell carcinoma.

There were one carcinoma in situ, 80 cases in stage I, 35 cases in stage II, 73 cases in stage IIIa, 10 cases in stage IIIb, one cases in unclassified with new international staging for lung cancer.

Preoperative mediastinoscopy and or mediastinotomy were performed in 45 cases in recent. There were 3 partial rib resection and one wedge resection of right middle lobe (RML) in 16 cases of right upper lobe (RUL) lobectomy & one wedge resection of right lower lobe (RLL) in 3 cases of right middle lobe (RML) & one wedge resection of RUL in 12 cases of right lower lobe (RLL) lobectomy.

One sleeve lobectomy in 6 cases of right upper lobe (RUL) & right middle lobe (RML) bilobectomy, & one sleeve pneumonectomy and one partial rib resection in 39 cases of right pneumonectomy were

*본 논문은 1990년 제70차 대한결핵 및 호흡기학회 춘계학술대회에서 특별강연으로 발표 되었음.

*본 논문은 1990년 연세대학교 의과대학 흉부외과 프로젝트 연구비로 조성되었음.

performed.

One sleeve lobectomy & wedge resection of RML in 14 cases of RUL lobectomy. Sixty cases of left pneumonectomy were performed. There were 26 cases of post-operative complications; 6 cases of empyema thoracis, 7 cases of carcinoma invasion to bronchial stump, 3 cases of hemothorax, one case of cylothorax, 3 cases of vocal cord paralysis, one phrenic N. palsy, one upper gastrointestinal bleeding (UGI bleeding), wound infection in one, renal failure in one, myasthenic syndrome in one, carina stenosis in one.

There were 5 operative mortalities; 4 cases of respiratory; failure due to myasthenic syndrome in one, empyema thoracis in one, explo-laparotomy due to UGI bleeding in one and carinal repair for carinal stenosis after left pneumonectomy in one, one case of brain metastases.

There were 28 cases of N₂ metastases without N₁ metastases in 47 mediastinal sites. The 3-year survival rate were 70% in stage I and 39% in stage II, and the 2-year survival rate were 43% in stage IIIa.

We have concluded that we have to perform complete resection with radical mediastinal lymphnode dissection in the surgical treatment of bronchogenic carcinoma even though no N₁ metastases.

서 론

한국인에서 폐암의 발생빈도는 1970년대엔 남자에서 7위, 여자에선 10위였으나, 1984년 보건사회부 보고에 의하면 남자에선 3위, 여자에선 7위로 보고되었고¹⁾ 1988년 경제기획원 보고에 의하면 1986년 1년간 남녀별 암사망자 분포에서 남자에서 3위, 여자에선 4위로 급속히 증가되고 있는 추세이다²⁾. 이와 같이 폐암환자의 급격한 증가는 흡연인구의 증가 및 산업발달에 따른 환경 공해의 증가에 그 원인이 있다고 본다³⁾.

최근 폐암의 조기발견에 많은 관심이 고조되고 있으며 폐암조기진단을 위한 초진치의 노력과 흉부전산화 단층촬영, 객담세포진 검사, 기관지경 검사 등에 의한 폐암의 조기 발견과 조기치료로서 치료후의 성적이 크게 향상되었다.

또한 수술중 보다 정확한 병기설정을 위하여 개흉전 종격동 검사에 의한 종격동 임파절 생검 및 종양절제 더 붙어 종격동 임파절 완전제거는 폐암의 보다 정확한 병기설정 뿐만 아니라 폐암의 장기 생존율을 증가시킴이 여러 학자의 연구보고에서 증명되고 있으나 아직도 나라에 따라 또는 연구기관에 따라 다소 그 성적이 다르다.

연세대학교 의과대학 흉부외과에서는 1976년 3월부터 1990년 2월까지 14년간 폐암으로 진단되어 개흉수술을 시행하였던 200예를 대상으로 연령 성별분포 및 수술전 암병력, 수술방법, 수술후 합병증, 수술사망원인 추적

조사결과등을 분석하였기에 보고하는 바이다(Table 1).

관찰 성적

1. 연령 및 성별

환자의 연령분포는 최소 연소자는 24세 여자였으며 최고령자는 77세 남자였고 이중 남자는 160예, 여자는 40예로써 4.0:1로서 남자에서 많았다. 또한 50세 이상에서 154예로써 전체의 77%를 차지하여 고령환자에 집중되어 있음을 알 수 있다.

2. 발생부위 및 세포형

폐암의 발생부위별 분류에선 좌상엽(LUL)이 62예로 가장 많았고, 우하엽(RLL)이 49예, 좌하엽(LL)이 33예, 우상엽(RUL)이 32예, 우중엽(RML)이 23예 순이었다(Table 2).

폐암의 세포학적 분류에서 상피세포폐암이 133예, 선암이 37예, 기관지폐포암이 9예, 대세포암이 8예, 소세포암이 3예, 미분화세포암이 1예, 점막상피세포암(mucoepidermoid cell ca)이 2예, 선상피세포암(adenosquamous cell ca)이 4예, 대세포암과 선암의 혼합형이 2예, 소세포암, 대세포암, 선암의 혼합형이 1예였다(Table 3). 그외 카시노이드암 1예, 악성신경초종 1예, 원인불명 전이암 1예, 융모암 2예, 전이성 granulosa cell ca 1예, 전이성 이하선암 1예, 도합 7예는 본 연구

Table 1. Age and Sex

	≤ 30	30 < ≤40	40 < ≤50	50 < ≤60	60 < ≤70	70 <	Total
M	0	4	23	69	59	5	160
F	1	2	16	13	8	0	40
	1	6	39	82	67	5	200

Table 2. Tumor Sites (N=200)

Site	RUL	RML	RLL	LUL	LLL
M	31	22	40	51	31
F	2	1	9		2
	33	23	49	62	33

조사에서 제외하였다. 병기별분류에 의하면 제 1기가 80예, 제 2기는 35예, 제IIIa가 74예, 제IIIb는 10예, 병기설정이 불확실한 경우가 1예 있었다 (Table 4).

3. 병 력

환자의 과거력상 암으로 수술처치를 받은 3예가 있었고 이중 2예는 각각 1년 11개월과 2년 4개월전 후두암으로 완전 후두절제수술을 시행하여 영구 기관절개 상태였으며 수술후 방사선치료 및 약물치료를 받았다. 이들 각각은 2차성 원발성 폐암으로 판명되었었다.

4. 수술방법

폐암의 수술방법에는 개흉전 종격동경 검사 및 종격동 절개가 45예에서 시행되었으며 모두 최근에 시행되었

다. 위상엽절제를 시행한 16예중 3예는 늑골절제가 병용되었으며 2예에선 Marlex mesh를 이용한 흉곽재건 수술이 시행되었다. 이중 1예는 pancoast tumor로써 위상엽절제 및 1, 2, 3 늑골절제가 동반되었고 1예에선 우중엽의 췌기절제가 병용되었다.

우중엽절제가 3예에서 시행되었으며 1예에서 우하엽 췌기절제가 병용되었다. 우하엽절제가 12예에서 시행되었으며 1예에서 췌기절제가 병용되었다.

위상엽 및 우중엽절제가 6예, 이중 1예는 소매절제 수술이 필요하였으며 우중엽 및 우하엽절제는 12예에서 시행되었다. 우측전폐절제수술은 39예에서 시행되었으며 이중 소매절제가 1예, 늑골절제가 1예에서 필요하였다. 좌상엽절제는 14예에서 시행되었으며 소매절제 및 좌중엽 췌기절제가 각 1예에서 병용되었다. 좌하엽절제는 7예가 있었다.

좌전폐절제 수술은 60예에서 시행되었으며 종격동경 검사에서 반대측 기관주위 임파절 전이 양성인 예가 1예로 절제불가능이었으나 좌하엽에 공동성 상피세포암으로 방사선치료중 파열되어 농흉발생가능성이 높으며 방사선치료 효과가 경감되리라 믿어 고식적 좌전폐절제수술을 시행한 1예가 포함되었다. 그러나 기관지절단면에

Table 3. Med. L-N Metastases Along to the Cell Type

(N=200)

	epid.	mucoepid	adeno.	ad+squ.	B-A	lar+adeno.	large	un.	small	S+L+A
No	68	2	20		5		2	1	1	1
N1	35		6	2		1	3			
N2	29		11	2	4	1	3		2	
N3	1									
	133 (67%)	2	37 (19%)	4	9	2	8	1	3	1

epid ; epidermoid cell ca.

mucoepid ; mucoepidermoid cell ca.

adeno ; adenocarcinoma

ade+squ ; adenocarcinoma + squamous cell ca.

B-A ; bronchoalveolar cell ca.

lar+adeno ; large cell ca + adenocarcinoma

large ; large cell ca

un. ; undifferentiated cell ca.

small ; small cell ca.

S+L+A ; small cell ca. + large cell ca. + adenocarcinoma

Table 4. TNM Classification (due to new international staging for lung ca)

Stage	TNM	N
	?	1
Stage I	T1 No Mo T2 No Mo	8 72
		80 (40%)
Stage II	T1 N1 Mo T2 N1 Mo	4 31
		35 (18%)
Stage IIIa	T3 No Mo T3 N1 Mo T1 N2 Mo T2 N2 Mo T3 N2 Mo Tx N2 Mo	19 9 6 31 7 1
		74 (37%)
Stage IIIb	T3 N3 Mo T4 N1 Mo T4 N2 Mo	1 3 6
		10 (5%)

Table 5. Med. L-N Along to the Sites of Tumor

	(N=X)					Total
	RUL	RML	RLL	LUL	LLL	
No	22	9	32	37	15	124
N1	4	9	19	12	10	53
N2(SN1)	9(6)	10(5)	12(5)	22(9)	13(3)	54(28)
N3					1	1
						1

암전이가 발견되었으며 수술후 방사선치료를 시행하였
다.

심막전폐절수술이 6예에서 시행되었으며 췌기절제만
시행하였던 예가 2예가 있었다. 시험개흉수술은 20예에
서 시행하였으며 중격동경검사의 기관분기줄하 임파
절생검에서 소세포폐암으로 진단된 1예에선 개흉수술하
지 않았다(Table 6).

5. 수술후 합병증

수술후 발생한 합병증에는 농흉이 6예가 있었고 이중
3예는 우측 전폐절제수술후 였으며 후하엽절제, 우상엽
및 우중엽, 우중엽 및 우하엽절제가 각각 1예가 있었다.
혈흉 및 출혈성 속이 3예 있었으며 3예 모두 재개흉하였

Table 6. Operative Treatment Diagram

	---	W (1)
	---	R (2)
	---	RiM (1)
	---	W (1)
	---	W (1)
Med (45)	---	
	---	S (1)

	---	S (1)
	---	R (1)
	---	W (1)
	---	S (1)
[] 155	---	

	---	Rt. (2)
	---	Lt. (5)

	---	Rt. (12)
	---	Lt. (9)

	---	O (1)

* [] ; no mediastinoscopy or mediastinotomy
Med ; mediastinoscopy or mediastinotomy
RUL ; right upper lobectomy
RML ; right middle lobectomy
RLL ; right lower lobectomy
Rt. PNT ; right pneumonectomy
LUL ; left upper lobectomy
LLL ; left lower lobectomy
Lt. PNT ; left pneumonectomy
Peri PNT ; pericardial pneumonectomy
Wedge ; wedge resection
Explo ; explothoracotomy
o ; no thoractomy
W ; wedge resection
R ; rib resection
D ; resection of diaphragm
RiM ; rib resection + Marlex Mesh.
Rt ; right
Lt ; left
S : sleeve resection

고 1예는 지혈시간의 지연으로 저산소뇌손상으로 5개월
째 의식불명상태이며 나머지 2예는 경과 양호하였다. 유
미흉이 1예 있었으나 고식적 치료로 치유되었고 성대마
비가 3예 있었으나 기관삼관에 의한 성대손상 1예는 3개
월후 호전되었고 2예는 회귀성 후두신경손상이었다. 이
중 1예는 목선소리 그대로이며 1예는 4개월후 갑상연골
성형수술하여 호전되었다.

횡격막 신경마비에 의한 호흡곤란이 1예, 창상감염이 1예 있었고, 1예에서 십이지장 궤양천공출혈이 발생하여 개복수술이 필요하였다. 항생제등에 의한 신부전이 1예 있었고 복막투석 및 혈액투석으로 호전되었다.

그외 절단면 기관지의 암세포 잔존이 7예에서 있었고 4예는 폐엽절제후, 3예는 주기관지 절제후였다. 그외 근무력증후군(myasthenic syndrome)이 1예, 기관분기절부위 협착이 1예 있었다(Table 7).

6. 수술 사망

수술직후 혹은 수술후 30일이내에 사망하였던 예는 5예에서 있었으며 1예는 수술 직후 근무력증후군(myasthenic syndrome)의 악화에 의한 호흡부전증으로 사망하

였으며 소매 전폐절제 수술(sleeve pneumonectomy)을 시행하였던 1예에선 호흡부전증으로 사망하였다. 1예는 수술후 경과 양호하였으나 십이지장궤양 출혈로 개복수술하였으나 호흡부전증으로 사망하였다.

1예는 좌전폐절제수술에서 기관지절단시 기관분기절 일부분을 절제하여 반대측 주기관지의 협착이 발생하였고 그 다음날 다시 심폐기를 이용하여 기관 수정봉합하였으나 수술후 신부전으로 사망하였다. 1예는 수술후 임상증상의 변화에 따라 두부전산화 촬영에서 뇌전이가 발견되었다(Table 8).

7. 종격동 전이양상

종격동 전이양상인 N₂ 전이는 편평상피세포암 133예 중 30예, 선암은 37예 중 11예, 기관지폐포암 9예 중 4예, 선상피세포암(adenosquamous cell ca.)에서 4예 중 2예, 대세포암+선암(larg+adeno ca.) 혼합형에선 2예 중 1예, 대세포폐암은 8예 중 3예, 소세포폐암에선 3예 중 2예였다(Table 3).

폐암의 부위에 따른 종격동 전이양상은 우상엽병소(RUL) 32예 중 9예, 우중엽병소(RML)에선 23예 중 7예, 우하엽병소(RLL)는 49예 중 10예, 좌상엽(LUL)은 62예 중 19예, 좌하엽(LL)에선 33예 중 9예에서 N₂ 이상의 전이를 보였으며 전 200예 중 51예가 N₂ 병변이었다(Table 5).

N₁ 전이없이 N₂ 전이가 있었던 예도 28예나 있었고 이 중 1예는 N₁ 전이 없이 2부위에 N₂ 전이가 5예, 3부위에 N₂ 전이가 1예 있어 병소크기 및 임파절 N₁ 전이에 관계없이 종격동 임파절 완전제거가 필요하다고 본다(Table 9).

Table 7. Operative Complication

	No.
Infection	7
Empyema th.	6
Wound infection	1
Bleeding	4
Hemothorax	3
UGI bleeding	1
Neural complication	5
Vocal cord palsy	3
Phrenic N palsy	1
Myasth syndrome	1
Others	10
Cylothorax	1
Carinal stenosis	1
Renal insufficiency	1
Carcinoma marginal invasion	7

Table 8. Operative Mortalities

Number.	Age (yr)	Sex	TNM	Op. name.	Op. complication	COD
1	52	M	T2NoMo	Right lower lobectomy	myasthenic synd.	resp. failure
2	53	M	T2N1Mo	Sleeve pneumonectomy	empyema th. Rt.	resp. failure
3	66	M	T3NoMo	Pneumonectomy, Rt.	UGI bleeding & explo lapa.	resp. failure
4	65	M	T2N2Mo	Pneumonectomy, Lt.	Contralateral br. stenosis & repair with C-P bypass	resp. failure
5	63	M	TxN2Mo	explothoracotomy, Lt.		brain metastasis

COD ; cause of death

Table 9. N2 Positive & N1 Negative

Sites	RUL	RML	RLL	LUL	LLL	Total
tracheobronchial	6	2	1	5		14
subcarinal	1	1	4	1	2	9
para esophageal		2	1		2	5
subaortic				4	1	5
para aortic				3		3
para tracheal		2	1			3
inf. pul. lig.			1	1		2
ant. tracheal		1				1
ant. med.		1	2	2		5
cont. paratracheal					1	1
	7	9	9	16	6	48

ant ; anterior lig ; ligament med ; mediastinal . cont ; contralateral

Inf. pul. lig : inferior pulmonary ligament

Table 10. No. of Survivors and Deaths

Follow (yr)	1	2	3	4	5	Total
Stage						
I	13(10)	8(1)	7(5)	2	4	9 59
II	9(4)	8(1)	3(2)	1		28
IIIa	4(19)	8(5)	4	5		1 46
IIIb	3(1)	(1)		(1)		6

() : No. of death

8. 추적 관찰

수술시행하였던 200예중 6개월이상 추적관찰은 가능한 예가 146예로써 매우 저조하였다. 이중 1년이상인 76예였으며 최고 12년 2개월 생존하여 추적되어 있으며 제 1기 폐암으로 수술후 농흉이 발생하였던 예도 현재까지 농흉치료 중이다. 수술후 본 연세의료원 암센터에서 방사선치료가 시행되었던 예 69예, 항암치료가 19예가 있었다.

추적관찰이 가능하였던 예에서 3년 생존율은 제 1기 예선 70%, II기에선 39%이었으며, 제IIIa에서 2년 생존율은 43%, IIIb에선 42%이었고, IIIb의 5년 생존자는 없었다(Table 10, Fig. 1~3).

고 안

폐암의 수술적 치료는 1933년 Graham에 의해 폐암의

Fig. 1. Survival rate.

전폐절제수술이 시행되었고 N₂로써 장기간 생존하였으며 이후로 폐암치료의 전기가 마련되었다³⁾.

폐암의 정확한 기술과 분류는 폐암치료의 계획, 예후 판정, 치료 결과등의 암연구소 및 병원간의 정보교환에 매우 중요하다. TNM 분류는 1979년 Union Internationale Contrele Cancer⁵⁾ 1979년 American Joint Committee on Cancer에서 제창되어 UICC 분류와 AJCC 분류로 나누어지게 되었다⁶⁾. 그후 1984년 Meeting for Unification of Staging, 1985년 American Joint Committee, Task Force for lung cancer revi-

Fig. 2. Survival rate.

Fig. 3. Survival rate.

sion meeting, UICC Annual meeting, Final Liasion metting, 1986년 TNM project meeting 등이 개최되었다. 1986년 4월 Dr. Mountain은 이들을 종합 정리 보완수정하여 new international staging system을 수립하였다^{7,8)}.

New international staging system for lung cancer의 주요 차이점은 $T_1N_1M_0$ 가 stage II로 변경되었으며 이 중 Contralateral hilum, mediastinum, supraclavicular node (ipsilateral, contralateral)는 N_3 로 재분류

되었고 T_3 는 superior sulcus tumor를 포함한 흉벽의 직접침습, 횡격막, 종격동늑막 및 심낭과 기관분기줄에서 2cm까지 접근한 경우로 국한하였고 T_4 는 심장, 대혈관, 기관, 식도, 척추의 침습이 있는 경우와 malignant pleural effusion을 새로 분류하였고 stage III가 stage IIIa, stage IIIb로 분리되었다⁹⁾.

1988년 Dr. Naruke는 이 분류에 따라 1737예의 폐암환자를 분류하여 각각의 5년 생존율은 stage I이 65.0%, stage II가 52.9%, stage IIIa가 22.2%, stage IIIb가 5.6%, stage IV가 7.5%임을 보고하였다. I, II, IIIa, IIIb간에 통계적 차이가 있었으나 stage IIIb와 stage IV간에 특별한 차이가 없었다⁹⁾.

많은 흉부외과의는 폐암치료의 가장 적절한 방법은 완전절제라고 간주하고 있으나 아직까지 stage III 이상의 경우 치료의 결과는 비관적이며 수술적치료 견해가 정립되어 있지는 않다. 그러나 stage III에서 선택적인 경우 수술치료하여 좋은 결과를 보고하고 있는 실정이다¹⁰⁾.

1988년 Naruke등은 특히 T_3 비소세포폐암에서 5년 생존율은 23%이나 완전절제인 경우 42%임을 보고한 바 있다^{9,11)}. 1984년 McCaughan등은 125예의 흉벽침습이 있는 폐암환자에서 수술절제하였고 $T_3N_0T_0$ 인 경우엔 5년 생존율이 56%, $T_3N_1M_0$, $T_3N_2M_0$ 인 경우엔 5년 생존율이 21%로써 크게 차이가 있었다. 즉 완전절제인 경우도 임파절 전이가 없는 경우 생존율이 뚜렷하게 호전됨을 보여주었다¹²⁾.

1982년 Martini등은 폐암의 종양절제와 보다 정확한 병기설정을 위해 완벽한 종격동 임파절제거를 시도하였으며 그 결과 완전한 종양절제 및 완벽한 종격동 임파절제거는 비소세포암의 치료성적을 향상시킬 수 있음을 보고한 바이다¹⁰⁾.

저자들은 원발성 폐암 200예를 추적조사하면서 New international staging에 입각하여 재 분류하였으며 선택적인 경우 과감한 종양절제와 종격동 임파절제거를 시도하였다. 저자의 경우 16예의 Wedge resection과 4예의 늑골절제가 있었고 이중 1예는 marlex mesh를 이용하여 흉곽성형수술을 시행하였다. 폐기능저하가 우려되는 3예에선 그의 Sleeve resection을 시도하였다. wedge만 시행한 예가 2예 있었고 pericardial pneumonectomy가 7예, 시험개흉만 실시한 예도 21예가 되었다.

수술전 보다 정확한 진단과 불필요한 개흉을 줄이고자

최근 45예에선 종격동경 검사를 시행하였다. 수술전 chest PA, chest C-T, magnetic resonance imaging (MRI) 등에서 종격동 임파절 전이가 의심되는 경우 종격동검사를 시행하여 high paratracheal, contralateral paratracheal L-N. extranodal 전이인 경우엔 수술 금기로 간주하였다.

그러나 CT scan의 Sensitivity & Specificity가 68%, 57%이며 accuracy가 61%로써 효율적은 아니었다. 13예에 저자는 특별한 이유가 없는한 종격동경검사를 권하고 있으며 저자의 경우 45예에서 개흉전 종격동경검사를 시행하였다. 1예에서 반대측 기관주위 임파절 전이가 되어 수술을 취소하였으나 좌하엽의 Cavitory epid. cell ca로 RT 중 종양의 파열을 염려하여 1주일 후 다시 고식적 전폐절제수술 하였다. 기관지 절단면에 (+)에 판명되었으나 sleeve pneumonectomy는 하지 않았으며 현재 방사선치료중이다.

가감한 절제수술을 시행하였음에도 수술직후 수술사망은 통상적인 수술사망율과 차이점은 없었으며 수술합병증 역시 증가 되지는 않았다. 폐암치료의 장기성적은 완벽한 수술적 제거에 크게 의존하게 되며 종격동임파절 전이 및 원격전이에 좌우되리라 믿는다.

2기 이상의 폐암 118예중 49예에선 수술후 보강치료를 시행하였으며 25예에선 방사선치료, 18예에선 항암제치료, 6예에서 방사선치료와 항암약물치료를 병용하였다. 각 치료에 대한 성적비교는 현재 추적관찰중이다. 추적관찰중 전이가 발견된 예가 20예 있었고 이중 상공정맥주후군과 절단면 국소재발이 각각 1예가 있었다.

그의 1예는 3개월후 신장선암으로 신장정출 수술을 시행하였으며 1예는 26개월후 자궁경부암 발생으로 방사선치료를 시행하였다. N₁의 전이없이 N₂ 전이가 발견된 예는 28예로써 14%에 해당하였다. 폐에서 림프관은 기관지와 폐동맥계와의 주행에 있어 동반주행하고 있으며 폐소엽간 격막에서는 폐정맥계와 동반주행하고 있다. 이들 림프의 주행방향은 대체로 폐문을 향하고 있으며 림프관내에는 1~2mm마다 판막이 존재하여 주행방향을 일정하게 해준다.

폐암에서 림프절 전이 유무는 매우 중요한 예후 판정인자로 생각되고 있으며 특히 종격동 림프절로의 전이는 예후판정에 매우 중요하다. 이와 같은 이유로 수술전 기관지경 검사뿐만 아니라 종격동경 검사를 통한 림프절 전이 확인은 매우 중요하다고 본다.

1969년 Libshitz등은 상피세포암에서 보다는 선암에서 종격동 임파절 전이율의 빈도가 훨씬 높다고 했으며¹⁴⁾ 1983년 Martini는 세포별 N₂ 전이율을 비교하였으며 선암이 42%, 상피세포암이 34%로써, 선암에서 N₂ 전이가 높다고 하였다. 특히 엽간, 폐문부림프절 전이없이 직접 종격동 림프절로의 전이율이 높다고 보고하였다^{15,16)}.

저자의 경우 선암이 37예중 11예로 29%, 상피세포암은 133예중 30예로 22.6%로써 선암에서 전이빈도가 높음을 알 수 있었다. 그외 증례는 적었으나 기관지폐포암이 9예중 4예, 대세포암이 8예중 3예, 소세포암이 3예중 2예로써 빈도가 많음을 알 수 있었다.

폐암의 위치에 따른 N₂ 림프절 전이를 보면 좌상엽 병소인 경우 분기줄림프절, 기관기관지 림프절, 좌우기관주위 림프절, 전기관림프절의 전이가 있는데 이는 1965년 Baird가 동측 상부 기관기관지 유출로, 동측기관주위 유출로에 의해 전이됨을 보고한 바 있다¹⁷⁻¹⁹⁾.

이밖에도 좌상엽 병소에선 대동맥주위 림프절과 대동맥하의 림프절로의 전이가 있는데 이들 중에는 N₁ 림프절 전이없이 직접 N₂ 림프절전이로 나타나는 경우가 많다고 하였다. 특히 좌상엽병소에서의 종격동 림프절로의 전이는 늑막, 심외막, 심장, 흉선 및 좌폐의 직접 유출림프관을 통해 전이된다고 하였다. 그의 식도 주위림프절, 하부폐인대 림프절로의 전이 역시 직유출로가 존재한다고 하였다^{20,21)}.

1967년 Barker등은 좌하엽병소인 경우 대부분에선 동측 기관기관지 유출로를 따라 주행하여 좌 전사각근 림프절로 유출되나 소수에선 하부폐인대림프절, 분기줄하 림프절에서 반대측 기관기관지 림프절로 유출됨을 확인하였다^{22,23)}

저자의 경우 1예에서 좌하엽에 발생한 상피세포폐암에서 우하기관주위 림프절 전이가 있었으나 Cavitory lesion으로 방사선치료의 합병증을 줄이기 위하여 좌전폐절제수술 및 동측 림프절을 완전제거 하여 세포전이 검사를 하였으나 동측 종격동 림프절전이가 없었다.

우상엽병소인 경우 역시 우측 기관기관지 림프절, 분기줄하 림프절로 전이되며, 유출로는 우폐의 전방 및 상부, 후 기관지림프절과, 분기줄하 림프절과 관계있는 림프관, 주위 혈관상과 관계가 있다고 본다^{18,19)}.

병소부위에 관계없이 분기줄하 림프절전이가 많은 데 분기줄하 림프절은 흉곽내의 여러 기관으로부터 유출되

는 림프관이 기관지 및 폐에서의 림프관과의 교통지이기 때문이다.

저자의 경우도 이와 동일하였다. 병소위치에 따른 림프절전이를 보면 좌상엽병소인 경우 N_2 림프절에는 16예중 1예가 기관지 분기줄하 림프절이었고, 좌측 기관지관지 림프절 5예, 좌측 기관주위 림프절 1예, 좌측하부폐인대림프절 1예, 중격동림프절 2예, 대동맥주위 림프절 3예, 대동맥하 림프절 4예가 있었다.

좌하엽병소인 경우엔 6예의 N_2 전이 림프절중 기관분기줄하 림프절 2예, 대동맥하 림프절 1예, 좌하부폐인대 1예 좌측 식도주위 림프절 2예 반대측 우기관주위 림프절전이 N_3 1예가 있었다.

우상엽병소에선 7예의 N_2 전이림프절중 분기줄하 림프절 1예 전이가 있었다. 우중엽병소인 경우 9예의 N_2 전이림프절중 분기줄하 림프절 1예, 우측기관지관지 림프절 2예, 우측기관주위 림프절 2예, 식도주위 림프절 2예가 있었다.

우하엽병소인 경우 9예의 N_2 전이림프절 중 분기줄하 림프절 전이가 4예, 전중격동 림프절 2예, 우측기관지관지 림프절이 1예, 우측 식도주위 림프절이 1예, 우측하부폐인대 림프절로의 전이가 1예 있었다.

N_1 이 없는 N_2 전이는 Libshits는 약 51%, Martini는 27%, Kirsh는 20%로 보고된 바 있으며 저자의 경우 N_1 전이없이 N_2 전이가 있었던 예가 28예가 발견되었으며 N_1 전이없이 2군데 N_2 가 5예, 3군데 N_2 가 1예, N_3 전이가 발견된 예도 1예가 있었다.

이와 같이 지역 주위림프절전이 없이 직접 N_2 림프절로의 전이가 상당수 발견되어 병소완전절제뿐만 아니라 동측중격동 림프절 역시 완전제거가 필요하다고 본다.

결 론

1) 연세대학교 의과대학 흉부외과에서는 1976년 3월부터 1990년 2월까지 14년간 폐암으로 진단된 200예를 개흉수술하였다.

2) 폐암의 세포학적 분류에서 상피세포암이 133예, 선암이 37예, 기관지 폐포암이 9예, 대세포암이 8예, 소세포암이 3예, 선암 및 상피세포 혼합암이 4예, 대세포암과 선암의 혼합암이 2예, 소세포암, 대세포암, 선암의 혼합형 1예 등이 있었다.

3) 이중 제 1기가 80예, 제 2가 35예, 제IIIa가 74예,

IIIb가 10예, 병기설정이 불확실한 경우가 1예 있었다.

4) 45예에선 개흉 수술전 중격동경검사가 실시되었고 우상엽절제가 16예, 이중 썬기절제 1예, 늑골절제가 3예 있었다. 우상엽 및 우중엽절제가 6예, 우하엽절제가 12예, 우전폐절제수술이 39예였다. 좌상엽절제가 14예, 좌하엽절제가 7예, 좌전폐절제수술이 6예, 심막전폐수술이 7예 있었다.

5) 소매절제수술은 3예였으며 각각은 우상엽 및 우중엽절제, 우전폐절제수술 및 좌상엽절제였다. 각각 1예에선 소매절제 수술방법을 병용하였다.

6) 시험 개흉이 21예였으며, 썬기절제만 시행한 예도 2예가 있었다.

7) 수술합병증에는 농흉이 6예, 출혈 및 혈흉이 3예, 기관지절단부위 암세포침습이 7예있었고, 그외 유미흉, 성대마비, 십이지장궤양천공, 신부전등이 있었다.

8) 수술 사망에는 5예가 있었고 원인에는 근무력증악화 1예, 기관지절단후 분기줄 부위협착 1예, 신부전 1예, 전폐절제수술후 농흉 및 기관지늑막루 1예, 뇌전이 1예가 있었다.

9) 수술후 제 I 병기에선 3년생존율이 70%, 제II병기에선 3년생존율이 39%, 제IIIa병기에선 2년 생존율이 43%, 제IIIb병기에선 2년생존율이 42%이었으나 IIIb의 5년 생존예는 없었다.

REFERENCES

- 1) 한국인 암등록 조사자료 분석보고서. 대한 암학회지 16:73, 1984
- 2) 경제기획원보고 : 한국인의 10대 암사망자(1966), 1988
- 3) 이두연, 김해균, 조범구, 홍승록, 김성규, 김주황 : 원발성 폐암의 장기성적, 대한흉부외과 학회지 20: 328, 1987
- 4) Graham EA, Singer JJ: Successful removal of an entire lung for carcinoma of the bronchus. JAMA 101:1371, 1933
- 5) Harmer EMN: TNM classification of malignant tumors. Geneva: Union Internationale Contre le Cancer 41-5, 1978
- 6) American Joint Committee on Cancer: Task Force on Lung, Staging of lung cancer 1979. Chicago: American Joint Committee on Cancer, 1979
- 7) Mountain CF: A new international staging system for lung cancer. Chest 4:2255, 1989

- 8) Carr DT, Mountain CF: The staging of lung cancer, *Semin Oncol* 1:229, 1974
- 9) Naruke T, Goya T, Tsuchiya r, Suemasu K: Prognosis & survival in resected lung carcinoma based on the new international staging system. *J thorac Cardiovasc Surg* 96:440, 1988
- 10) Martini N, Beattie EJ Jr: The surgical treatment of lung cancer. *Semin Respir Med* 4:1-7, 1982
- 11) Nakahashi H, Yasumoto K, ishida T, Nagashima A, Nishino T, Olca T, Sugimachi K: Results of surgical treatment of patients with T₃ non-small cell lung cancer, *Ann Thoraic Surg* 46:178, 1988
- 12) McCaughan BC, Martini N, Bains MS, McCormack PM: Chest wall invasion in carcinoma of the lung. *J Thorac Cardiovas Surg* 89:836, 1985
- 13) Schil PEYV, Hee Rhggv, Schoots ELG: The value of mediastinoscoy in preoperative staging of bronchogenic carcinoma. *J thorac Cardiovasc Surg* 97: 240, 1989
- 14) Libshitz HI, Mckenna RJ Jr, Mountain CF: Pattern of mediastinal metastasis in bronchogenic cacinoma. *Chest* 90:229, 1986
- 15) Martini M, Flehinger BJ, Zaman MB, Beattie EJ Jr: Prospective study of 445 lung carcinomas with mediastinal lymph node metastases. *J Throac Surg* 80:390, 1983
- 16) Martini N, Flehinger BJ, Zaman MB, Beattie EJ: Results of resection in non-oat cell carcinoma of the lung with mediastinal lymph node metastases. *Ann Surg* 198:386, 1983
- 17) Nohl HC: The spread of carcinoma of the bronchus, Lloyd Luck (medical book), Ltd London, 17, 1962
- 18) Kirsh MM, Kabn DR, Gago O, Lampe I, Fayos JV, Prior M, Moores W, Haight C, Sloan H: Treatment of bonchogenic carcinoma with mediastinal metastases. *Ann Thorac Surg* 12:11, 1971
- 19) 김길동, 오중환, 정경영, 이두연, 조범구, 홍승록, 이원영 : 폐암의 조직학적 분류, 위치 및 크기와 주위림프절전이의 양상에 관한 연구, *대한흉부외과학회지* 22:1011, 1989
- 20) Baird JA: The pathways of lymphatic spread of carcinoma of the lung *Br. J Surg* 52:868, 1965
- 21) Rouviere H: Anatomy of the human lymphatic system. Ann Arbor Mich, Edwards Brothers Inc 83, 1938
- 22) Barker NH, Hill L, Ewy HG, Marable S: Pulmonary lymphatic drainage. *J thorac cardiovasc Surg* 54: 695, 1967
- 23) Nohl HC: An investigation into the lymphatic & vascular spread of the carcinoma of the bronchus. *Thorax* 11:172, 1956