폐암의 진단

경북대학교 의과대학 내과학교실

정 태 훈

Diagnosis of Lung Cancer

Tae Hoon Jung, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Kyungpook National University, Kyungpook, Korea

서 론

폐암의 진단은 암세포를 증명함으로써 확진이 되는 것이지만 필자는 편의상 임상증세가 나타나지 않은 시기 및 고위험군에게 시행하는 선별검사(screening test), 증세나 징후가 있을 때에 진단하기 위한 검사, 그리고 진단된 예에서 치료방침을 정하고 예후를 추정할 수 있는 병기판정(staging) 등의 세단계로 나누어서 기술하고자 한다.

1. 선별 검사

선별검사의 목적은 조기에 암을 발견하여 완전제제를 하는데 있다. 조기에 암을 발견한다는 것은 인접장기나 원격전이를 일으키지 않은 시기 즉 조기폐암¹⁾을 발견한다는 것이다(Table 1). 조기폐암의 발견을 위해서는 집단검진으로서 직장검진과 지역검진 등이 이용된다. 조

기진단을 위한 선별검사로는 이미 잘 알려진데로 말초폐야의 병변은 표준흉부 X-선 사진으로 발견하고 중심부의 병변은 자연배출되는 객담세포진검사로 한다. 최근 북미주 및 유럽의 유명 폐암진료소에서 폐암발견을 위한 선별검사는 건강진단의 하나로써 시행해야 하고 흉부 X-선 사진촬영이 가장 예민한 검사수기이며 객담세포진은 중심부의 조기 편평상피암의 발견에 가장 효과적인 방법이며 이렇게 발견된 조기암은 치료로서 수명이 연장되고 사망율도 감소된다고 하였다^{2~5)}. 그러나 그 후 이들 성적을 재검토하여 폐암의 선별검사에 대한 부정적인 견해를 발표하였는데⁶⁾ 그 이유로는 선별검사에 참여한 위험군과 대조군 사이에 폐암사망율의 차이가 없고 흡연자에서도 흉부 X-선 및 객담세포진검사의 양성율이 낮고 그 밖에 검사비용 등을 고려하면 폐암의 조기진단을 위한 선별검사는 권유할 것이 못된다고 하였으나 직접연구에 참여한 연구소에서는 즉각 반론을 제기하고 있다^{7,8)}. 이와같이 선별검사의 방법 및 유용성에 대해서는 아직 논란이 되고 있으나 현재로서는 40~45세 이상의 남자, 흡연력이 20 pack-year 이상인자, 유해환경에 근무하거나 자각증세가 있는 고위험군에서는 개별적으로 흉부 X-선 사진과 객담세포진검사를 매 6개월마다 시행하는 것이 유익한 것으로 인정되고 있다⁹⁾(Fig. 1). 그리고 폐암은 흡연자에서 월등히 발생율이 높고 이들은 폐쇄성 폐질환이 동반되기 때문에 진료실에서 간편하게 검사할 수 있는 호흡계로 검사를 하여 폐쇄성환기장애가 있는 경우에는 정밀한 검사를 하는 것이 좋다고 하는 학자도 있다¹⁰⁾. 한편 조기폐암 가운데 말초폐야의 병변은 흉부

표 1. 조기폐암의 정의

1. 폐문부 조기폐암
1) 두꺼운 구역기관지에 발생
2) 병소가 기관지벽내에 국한
3) No Mo
2. 폐말초부 조기폐암
1) 아구역기관지보다 말초폐야에 발생
2) 종괴의 직경이 2 cm 이하
3) Po No Mo
(P : 흉막, N : 임파절, M : 원격전이)

그림 1. 40세 이상 남녀의 폐암검색의 방법.

X-선상으로 비교적 쉽게 발견되고 또한 그 부위를 알 수 있으나 중심부기관지내의 병변은 부위의 확인이 어려운 경우가 있다. 특히 객담세포진검사에서는 암세포가 증명되나 흉부 X-선사진이나 기관지경검사에서 병변이 뚜렷하지 않는 예에서는 근래에 중앙친화성 광감수성물질 가운데 hematoporphyrin derivative (HpD)를 이용하여 위치확인을 할 수 있게 되었다^{11,12}. 즉 HpD를 정맥 주입하고 48시간이 지난뒤에 기관지경을 통해 argon dye laser를 비추면 HpD를 흡수한 암조직이 형광을 나타내므로 정확한 위치를 확인함과 동시에 laser photoradiation으로 중앙조직은 수술을 하지 않고도 제거하므로 치료까지 가능하게 되었다.

2. 폐암의 진단

증세를 가진 폐암의 진단은 먼저 암의 존재를 확인함과 동시에 세포형의 분류가 되어야 한다. 암의 존재의 확인은 먼저 의심되는 이상소견을 찾고 다음 비관혈적인 검사 및 조직학적인 진단을 위해 각종 검사를 하며 보조적으로 암표식자를 검사하기도 한다.

1) 의심되는 이상소견

폐암환자의 증세는 여러가지가 있으나 폐암에 독특한 것은 없으며 특히 흡연자에서는 의심되는 증세는 평소에도 흔히 있어온 흡연에 의한 것으로 간과해버리는 수가 많으므로 진행된 후에 발견되는 중요한 원인이 되고 있다. 임상증세는 조기의 기관지내병변에 의한 기침, 객담, 객혈, 통증 및 호흡곤란 등과 후기의 흉곽내파급에 의하여 생기는 쉼 목소리, 흉수, 흉통, 부정맥, 횡격막

상승, 연하곤란, 상대정맥증후군, Honer씨 증후군 등, 중앙수반증후군으로 대사성, 내분비성, 신경근육성, 결합조직성, 피부성, 맥관성, 및 혈액성 등, 비특이전신 증세로 체중감소, 전신권태감, 식욕부진 등 그리고 뇌, 간, 뼈 등의 원격전이에 의한 증세 등이며 초진시에 흔히 보는 증세는 Table 2와 같다^{13~17}.

2) 비관혈적인 검사에 의한 탐지

흉부 X-선 사진이 가장 기본이 되고 또한 중요하다. 소견은 암에 의한 직접 소견과 간접소견으로 다양하며 (Fig. 2, Table 3)^{18,19} 또한 심장의 상태와 흉곽의 골전이를 알 수 있다. 아직 폐결핵의 유병율이 높은 우리나라에서는 흉부 X-선 사진에 이상음영이 보일 때 결핵과 암을 구별하는 것이 필요하다. 폐첨부의 고립성결절을 결핵종으로 단정하여 수개월간 치료하는 사이에 인접장기에 전이가 된 상태에서 암으로 판명이 되는 예나 폐야에 이상음영이 나타났을 경우 원인균의 확인없이 결핵으로 치료하고 수개월이 경과한 후에 악화되어 조기에 수술을 할 수 있는 기회를 놓치는 예가 있으며 특히 선암가운데 고립성결절상으로 수개월간 원발병변에는 변화가 없다가 원격전이된 소견이 먼저 발견되는 예를 간혹 볼 수 있다. 익명의 방사선판독자가 모든 흉부 X-선 사진은 항산성염색을 한 안경을 쓰고 보아야 된다고 할 정도로 결핵이 많고 다양한 X-선 소견을 나타내었으나 앞으로는 한쪽에는 항산성염색 그리고 다른 쪽에는 세포진검사를 위해 염색을 한 안경을 착용하고 판독을 해야 할 정도로 폐결핵과 폐암은 확연히 구별하기 어려운 경우가 많으며 심지어 두가지의 병이 동시에 발병하는 환자로

표 2. 폐암환자의 초진시 증상의 빈도(%)

증상	Taylor & ¹³⁾ Waterhouse (1950) (1592 cases)	김 등 ¹⁴⁾ (1970) (101 cases)	김 등 ¹⁵⁾ (1976) (171 cases)	成毛 등 ¹⁶⁾ (1977) (467 cases)	이 등 ¹⁸⁾ (1983) (200 cases)
기침	28.7	82.5	82.5	35.3	44.0
객담	—	—	72.5	14.1	15.5
흉통	21.9	55.0	49.7	8.6	34.0
호흡곤란	12.8	43.7	49.7	0.6	31.5
객혈	7.7	43.7	46.8	22.9	15.5
전신쇠약	3.0	6.2	40.4	3.0	4.5
체중감소	1.2	33.7	36.3	0.9	3.5
목쉼	1.8	11.2	13.5	1.3	5.5
연하곤란	0.7	1.2	4.7	—	4.5
발열	0.4	13.7	33.9	9.2	3.5
기타	19.2	12.5	7.0	—	17.5

Table 3. X-ray Findings of a Representative 200-Case Series of Lung Cancer Cases

	No.	Per cent
Tumor in the periphery of the lung	79	39.5
Hilar tumor	39	19.5
Atelectasis	27	13.5
Pleural effusion	14	7.0
Hilar invasion	10	5.0
Normal	8	4.0
Infiltrative shadow in the periphery of the lung	6	3.0
Intrapulmonary disseminated shadows	6	3.0
Bone destruction	5	2.5
Mediastinal shadow	4	2.0
Pulmonary infection	2	1.0

(From Tokyo Medical College).

있고²⁰⁾ 폐암으로 진단된 환자가 확진되기 전에 일시적 진단으로 폐결핵이 가장 많았다는 점도¹⁵⁾ 이같은 사실을 뒷받침한다. 그 밖에 근래에 소개되어 보편화되고 있는 흉부전산화단층촬영(CT), 핵자기공명영상기(MRI), 폐 및 기관지동맥조영술, Gallium 폐주사, 관류 및 환기폐주사 등도 폐암진단에 이용되나 폐암자체의 진단보다는 병기분류에 더 많이 이용된다.

3) 세포조직학적진단

폐암의 확실한 진단은 병리해부학적 소견으로 가능하며 세포진검사와 조직화학적 검사가 있다. 이를 위해 가검물의 채취방법은 여러가지 있으며(Fig. 3) 세포진검

사를 위해서는 자연배출객담, 기관지경을 통해 얻은 객담, 경피 혹은 경기관지침흡인 및 각종 삼출물 등에서 시행한다. 객담세포진은 3일연속 혹은 격일로 3회 또는 3일간 계속 모아서 검사하도록 하며 한번 검사할 때 3매 정도의 슬라이드를 만들고 한 시리즈에 적어도 9장 이상의 슬라이드를 만들어서 관찰하는 것이 좋으며²¹⁾ cell block과 같은 방법을 병용하면 더 높은 진단을 할 수 있고²²⁾ 또한 기관지경검사 후의 자연배출객담도 양성율이 높다²³⁾고 한다. 폐의 병변에서 직접 조직을 얻는 방법으로서 중심부에 있으며 내시경으로 관찰되는 점막병변은 술이나 생검감자로 세포진 및 조직생검을 한다. 말초폐야의 병변은 경기관지폐생검(TBLB), 방사선투시 혹은 CT 유도하에서 경피침생검 등이 가능하다. 경기관지폐생검은 기관지경으로 보이지 않는 말초병변을 생검하는 것으로 폐암에서의 진단율은 미만성병변은 80~90%, 국한적인 병변은 70~80% 정도라고 한다^{24,25)}. 경피침생검은 TBLB로 도달하지 않는 중심부 및 말초병변에서 시행하며 CT가 보급되기 전에는 X-선 투시하에 주로 시행하였으나 근래에는 CT 유도하 경피침생검이 많이 시행되고 있으며 진단율은 75~90% 정도로 비교적 높으며 흉부 X-선상 중간폐야의 병변, CT 소견상에는 종격동내 혹은 종격동에 가까운 병변의 진단율이 높았는데 이는 호흡에 따른 운동성이 적고 비교적 고정이 잘 되는 부위이기 때문이다²⁶⁾. 사용되는 바늘의 종류에 따라서 진단율의 차이가 있는데 내경이 짧은 바늘을 사용하면 얻는 조직이 크고 진단율도 높으나²⁷⁾ 기흉, 출혈 등의 합병증의 빈도도 높다. 또한 흡인세포진에 가검물의

Fig. 2. The most frequent manifestations of bronchial carcinoma.

1. Hilar lung cancer with endobronchial growth.
2. Typical round focus.
3. Tumour cavern.
4. Subpleural focus infiltrating the chest wall.
5. Obstructive segmental discontinuation with retention in pneumonia.
6. Atelectasis, which is hidden behind the cardiac shadow.
7. Secondary bronchiectasis due to partial stenosis.
8. Focus near to the pleura, with effusion.
9. Necrotising tumour with draining bronchus.
10. Abscess formation.
11. Obstruction emphysema due to valve occlusion.
12. And 13. Outbreak of carcinoma into the mediastinum, e.g. in the direction of the vena cava or as pancoast tumour.
14. Lymph node involvement in the upper mediastinum and paratracheally, extending to the upper clavicular fossa.
15. And 16. Carcinoma spreading to the trachea and pericardium respectively.

채취가 어려운 경우에는 바늘끝에 특수하게 돌아가며 흡이 파인 것을 이용하면 가검물을 쉽게 얻을 수 있다²⁸⁾. 더우기 최근에 소개된 CT는 악성질환이 의심되는 고립성결절이 보일 때 결절의 성상, 종격동을 포함한 임파절 상태를 확인하는 병기결정을 하면서 침생검까지 병행하면 한번의 검사로 여러가지 정보를 얻을 수 있으므로 좋다고 생각된다. 그밖에 사각 및 쇄골상와임파절생검 그리고 종격동경에 의한 임파절생검 등이 이용된다. 흔히 미세침생검시에 흡인세포진에서 괴사성소견만 보일 때 진단에 어려움을 당하는 수가 있다. 특히 공동성병변일 때는 병변의 가장자리에서 생검을 하도록 해야 하며 반

그림 3. 폐암진단에 이용되는 조직생검, 세포채취방법.

- ① 직시하기관지경하생검
- ② 직시하기관지경하세포진
- ③ 폐야말초병소찰과세포진
- ④ 경기관지침생검 (TBLB)
- ⑤ 경기관지침흡인생검 (TBAB)
- ⑥ 기관지세정세포진
- ⑦ 사각근전임파절생검
- ⑧ 경피적침생검
- ⑨ 늑막생검
- ⑩ 늑막액세포진
- ⑪ 종격경하생검
- ⑫ 흉강경하생검

드시 균에 대한 철저한검사 즉 일반세균을 포함하여 항산균검사 및 곰팡이에 대한 검사를 한다. 늑막삼출액이 있을 때는 암세포가 증명되지 않으면 수술의 적응이 될 수 있기 때문에 적극적으로 조사해야 하며 삼출액에 대한 여러가지 검사와 조직생검도 같이 시행한다. 양성늑막삼출액이 있을 때의 늑막액에서의 암세포양성율은 58%이며 조직검사에서는 대체로 43%로서²⁹⁾ 세포진검사가 침생검보다 예민도가 높다. 그리고 몇몇 보고에서는^{30,31)} 세포진검사와 침생검을 동시에 시행하므로 진단율을 높인다고 하나 광범위한 조사에서²⁹⁾는 양성늑막액이 의심되는 예에서 세포진검사로 확진이 되지 않을 때만 생검을 하는 것이 좋다고 한다. 사각 및 쇄골상와임파절생검은 임파절이 축지될 때는 약 90%의 높은 진단율을 보이나^{32,33)} 축지되지 않을 때는 진단율이 낮기 때문에 하지 않는 것이 좋다고 한다.

4) 암표식자 검사

암표식자는 암조직에서 만들어지며, 암에 대해 특이성이 있고, 암세포와 비암세포에서 생산되는 것이 양적으

로 질적으로 차이가 있으며, 혈액중에 이행되어 정량이 가능하므로 암의 진단과 치료효과판정에 유효한 지표가 된다³⁴⁾. 폐암의 표식자로는 크게 5가지군으로 나눌 수 있다. 즉 부신피질호르몬(ACTH), 항이노호르몬(ADH), 칼시토닌 등의 호르몬성 표식자와 carcinoembryonic antigen(CEA), basic fetoprotein 등의 태아성항원, 항진된 세포대사의 결과로 증가되는 beta₂-microglobulin 등의 생화학성 표식자, tissue polypeptide antigen, isoferritin 등의 종양관련항원 그리고 neuron specific enolase(NSE), amylase, aldolase 등의 효소가 있으며 이 가운데 CEA가 가장 많이 이용되며 주로 선암에서 양성률이 높다³⁵⁾. 소세포암에서는 NSE가 진단에 도움을 주고 특히 치료로서 호전여부와 치료반응이 있는 환자에서 경과중에 재발여부를 아는 감시기구로써 가치가 있다고^{36,37)} 한다. 편평상피암에서는 편평상피세포와 유관된 항원이 흔히 이용된다.

3. 폐암의 병기판정

진단된 암은 계통적으로 분석하고 예후를 추정하고 또한 치료방침을 정하기 위하여 침범정도가 비슷한 것끼리 분류를 하는 것이 필요하다. 그리고 폐암의 병기는 암의 침범범위를 정하는 해부학적인 병기와 여러가지 치료를 받을 수 있는 능력 특히 절제수술에 견딜 수 있는지를 평가하는 생리학적인 병기로 나눌 수 있다.

1) 해부학적 병기 분류

폐암에서는 발견될 때 그 진행정도가 뚜렷이 다른 비소세포폐암과 소세포폐암을 구별한다. 비소세포암에서는 암자체의 크기 및 주위조직에 파급정도(tumor, T), 주위의 임파절에 파급정도(node, N) 그리고 원격전이(metastasis, M)에 따라 결정되는 TNM 병기분류를 하며 이에 는 과거 American Joint Committee on Cancer Staging(AJCC) 및 Union International Contre Cancer(UICC)에서 제정된 분류를 사용해 오다가 1986년에 AJCC, UICC 및 일본암위원회가 공동으로 신국제병기분류(New International Staging System)를 개정제안하였다³⁸⁾. 신국제분류에서는 종래의 병기분류내용가운데 특히 T₃와 N₂ 및 M₁의 개념에 수정을 하였는데 그 이유는 방사선종양학에서는 방사선치료로써 국한병변의 조절이 가능한 경우와 증세의 완화에 있는 경우로 나누고 수술종양학에서는 종래의 병기분류에서 수술이 불가능한 동일한 병기에 있는 예에서도 완전절제

가 가능한 경우가 있기 때문이다. 예를 들면 T₃ 가운데 제한된 흉벽이나 직접 인접 종격동이나 심낭에 파급된 경우, Pancoast씨 증후군이 없는 폐첨구암 그리고 근위 주기관지나 기관분지부에 침범이 되어도 절제가능한 예가 있고 과거의 N₂도 종격동에 침범된 것 가운데 절제가능한 동측종격동에 파급된 경우와 절제는 불가능하나 방사선요법으로 하나의 조사야로 치료를 할 수 있는 반대측 종격동이나 사각 및 쇄골상부임파절에 전이된 것은 과거의 병기에서는 M₁으로 분류하였으나 신분류에서는 N₃로 하였다. 그리고 신국제분류에서는 5병기로 나누고 전이가 없는 T₁ 및 T₂를 제 1 병기, 폐내임파선에 한정된 T₁ 및 T₂를 제 2 병기로, 제 3 병기는 절제가능한 것은 IIIa 병기로, 그리고 절제는 불가능하나 방사선치료로는 하나의 조사야로 가능한 IIIb 병기로 나누었으며 원격전이는 제 4 병기로 하였다(Table 4, 5).

한편 TNM 병기분류는 동일환자에서도 진단되는 과정이나 치료에 의한 호전 그리고 재발 및 악화 등에 의해 병기가 달라진다. 즉 아직 치료를 시작하기 이전에 임상적진단에 의한 병기분류(clinical-diagnostic staging, cTNM), 개흉수술을 받은 환자는 수술소견에 의한 병기분류(surgical-evaluative staging, sTNM), 또한 절제한 조직소견에 의해 정해지는 술후병리학적 병기분류(postsurgical resection-pathologic staging, pTNM), 치료중이거나 경과관찰 중인 환자에서는 재발 혹은 악화되었을 때에 다시 정하는 재치료병기분류(retreatment staging, rTNM) 그리고 사후에 부검을 하는 경우에는 모든 소견을 알 수 있기 때문에 가장 정확한 사후병기분류(autopsy staging, aTNM) 등이다.

소세포암의 병기는 limited disease와 extensive disease로 나누며 근래에 소세포암이라도 원격전이를 하지 않은 시기(TNM 병기로 I 과 II의 T₁N₁M₀)에 있는 예에서는 수술을 하고 동시에 합암요법이나 방사선요법을 병행하므로써 생존율이 연장된다는 성적들이 보고되고 있다^{39,40)}.

병기판정을 위한 검사는 관혈적 방법과 비관혈적 방법으로 나눌 수 있고 비관혈적 방법으로는 환자의 병력과 이학적소견이 가장 중요하다. 방사선학적 방법으로는 진단에서와 마찬가지로 후전 및 측면흉부 X-선 사진이 기본이 되고 가장 중요하며 단층촬영 특히 폐문부임파절의 상태를 알기 위해 사면폐문부단층촬영(oblique hilar tomography)이 쓰이나⁴¹⁾ CT의 보급으로 거의 이용하

Table 4. New International Staging System: TNM Classification

Primary Tumor (T)

TX Tumor proven by the presence of malignant cells in bronchopulmonary secretions but not visualized roentgenographically or bronchoscopically, or any tumor that cannot be assessed as in a retreatment staging.

TO No evidence of primary tumor.

Tis Carcinoma in situ.

T1 A tumor that is 3.0 cm or less in greatest dimension, surrounded by lung or visceral pleura, and without evidence of invasion proximal to a lobar bronchus at bronchoscopy*.

T2 A tumor more than 3.0 cm in greatest diameter or a tumor of any size that either invades the visceral pleura or has associated atelectasis or obstructive pneumonitis extending to the hilar region. At bronchoscopy, the proximal extent of demonstrable tumor must be within a lobar bronchus or at least 2.0 cm distal to the carina. Any associated atelectasis or obstructive pneumonitis must involve less than an entire lung.

T3 A tumor of any size with direct extension into the chest wall (including superior sulcus tumors), diaphragm, or the mediastinal pleura or pericardium without involving the heart, great vessels, trachea, esophagus, or vertebral body, or a tumor in the main bronchus within 2.0 cm of the carina without involving the carina.

T4 A tumor of any size with invasion of the mediastinum or involving heart, great vessels, trachea, esophagus, vertebral body or carina or presence of malignant pleural effusion†.

Nodal Involvement (N)

N0 No demonstrable metastasis to regional lymph nodes.

N1 Metastasis to lymph nodes in the peribronchial or the ipsilateral hilar region, or both, including direct extension.

N2 Metastasis to ipsilateral mediastinal lymph nodes and subcarinal lymph nodes.

N3 Metastasis to contralateral mediastinal lymph nodes, contralateral hilar lymph nodes, and ipsilateral or contralateral scalene or supraclavicular lymph nodes.

Distant Metastasis (M)

M0 No (known) distant metastasis.

M1 Distant metastasis present. Specify site(s).

* The uncommon superficial tumor of any size with its invasive component limited to the bronchial wall, which may extend proximal to the major bronchus, is classified as T1.

†Most pleural effusions associated with lung cancer are due to tumor. There are, however, some few patients in whom cytopathologic examination of pleural fluid (on more than one specimen) is negative for tumor, and the fluid is nonbloody and is not exudate. In such instances in which these elements and clinical judgement dictate that the effusion is not related to the tumor, the patient should be staged as T1, T2, or T3, excluding effusion as a staging element.

From Mountain CF: A new international staging system for lung cancer. Chest 89 (suppl): 225S-233S, 1986.

Table 5. AJCC vs New International System: Staging Comparison

AJCC Stage (1972)		International System Stage (1986)
Occult	TX N0 M0	Occult
I	Tis N0 M0	0
	T1 N0 M0 T2 N0 M0	I
	T1 N1, M0	II
II	T2 N1 M0	
III	T3 N0 M0 T3 N1 M0 T1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N2 M0	IIIA
	Any T, N3 M0 T4, any N, M0 Any malignant effusion	IIIB
	Any T, any N, M1	IV

Note: T, N, and M descriptors are based on definitions of New International Staging System.

지 않고 있다. 근래에 소개되어 보편화되고 있는 CT는 흉부 X-선 소견의 이상을 더욱 자세하게 관찰할 수 있을 뿐 아니라 폐문부 및 종격동의 구조와 임파절의 상태를 잘 알 수 있고, 이상음영의 밀도를 측정함으로써 어느정

도 악양성을 구별할 수 있다. 또한 흉부 CT검사시 상복부에 있는 간, 부신, 신장 및 복부임파절 등에 전이와 이 상여부까지도 알 수 있으므로⁴²⁾ 폐암의 병기판정에 가장 정확한 검사법으로 쓰이고 있다. 최근에는 MRI가 소개되어 사용되고 있으나 CT에 비해 가격이 바싸고 검사시간이 길고 폐조직에는 공간해상력이 낮아 CT보다 이용도가 떨어진다. 그러나 고형구조물과 혈관구조물의 구별에 조영제를 사용하지 않고도 가능하다는 것이 장점이므로⁴³⁾ 혈관조영제인 요드에 감수성이 있는 환자에게 특히 도움이 된다. 폐주사 및 Gallium 주사는 자주 이용되나 예민도와 특이도에 큰 차이가 있어서⁴⁴⁾ 통상적으로 이용하는데는 문제점이 있다. 또한 소세포암에서는 비록 증세나 증후가 없더라도 병기판정을 위하여 뇌, 상복부의 CT 혹은 MRI와 골주사 필요에 따라서는 골수흡인 혹은 생검도 하고 비소세포암에서는 흉곽을 벗어난 소견이 임상적으로나 검사소견으로 의심될 때 뇌CT, 간주사 및 골주사를 하도록 한다⁴⁵⁾. 관혈적 검사방법으로는 기관지경검사를 이용한 기관분기부하의 임파절흡인 생검⁴⁶⁾을 비롯한 여러가지 검사, 종격동경검사, 늑막이나 폐쇄성 임파절생검, 흉강경, 그리고 시험적 개흉 등이다. 흔히 폐문부나 종격동의 임파절에 침범여부가 불확실하여 수술결정에 어려움을 당하는 수가 많다. 만일 CT나 MRI로써 종격동의 침범이 없고 임파절의 크기가 1 cm 이하의 정상크기이면 종격경이 거의 필요치 않으나 1 cm 이상인 경우는 생리학적인 병기를 결정하기 전에 종격경이나 종격동절개를 고려한다^{47,48)}.

2) 생리학적 병기 분류

주로 폐절제술을 할 때에 신체적인 상태를 평가하는 것으로 수행상태 (performance status)와 더불어 심폐

기능을 평가한다. 수행상태는 주로 Karnofsky scale 및 ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) scale이 많이 쓰인다. 나타나는 증세에 따라서 증세가 없는 군 (asymptomatic), 6개월이상 지속된 장기간의 일차병변에 의한 증세군 (long primary), 6개월이내의 단기간의 일차병변에 의한 증세군 (short primary), 식욕부진 등의 전신증세군 (systemic), 그리고 뼈의 통증이나 신경증세 등의 원격전이증세군 (metastatic) 등으로 나누기도 한다⁴⁹⁾.

수술전의 상태를 평가하기 위한 검사로서는 주로 심폐기능의 평가를 한다 (Table 6). 심장검사로서는 심전도를 반드시 확인해야 하며 필요에 따라서 심초음파도 및 심도자술까지 고려해야 할 경우도 있다. 심근경색이 있는 환자는 3개월 이내는 사망율이 높기 때문에 절대금기이고 3~6개월 사이는 상대적인 금기이다⁵⁰⁾. 운동부하 검사에서 음성인 협심증은 수술을 해도 된다고 하며 운동부하검사서 양성이고 수술로써 교정이 가능하면 관상동맥조영술을 실시하여 폐절제술과 관동맥의 수술을 동시에 수술하는 것을 고려할 수 있다. 그 밖에 우각블록은 위험성이 거의 없으며 좌측후속성부속성블록과 양측성속성부속성블록은 위험성이 높다고 한다. 수술전 폐기능검사는 폐기능장애 뿐만 아니라 술후 폐합병증에 대한 위험도를 예측할 수 있다. 주로 이용되는 항목은 간단한 환기기능검사, 최대 환기량 (maximal voluntary ventilation), 그리고 동맥혈가스분석 등이다. 그러나 술전 폐기능의 평가는 수술중이나 수술후의 합병증을 예측 내지 처치하는 데도 필요하나 절제후의 남아있는 폐의 기능을 정확하게 평가하는 것이 중요하다. 이를 위해서 분할폐기능검사 (split pulmonary function test)가

Table 6. Preoperative Evaluation of Cardiopulmonary Function*

	Group I (very low risk)	Group II (very high risk)	Group III (moderate risk)
Cardiac Function	Normal size and function, blood pressure, and electrocardiogram	Intractable congestive failure and ventricular arrhythmias; uncontrolled malignant hypertension; recent myocardial infarction	Coronary artery disease; arrhythmias; systemic hypertension; myocardial dysfunction (low ejection fraction)
Pulmonary Function	Normal arterial blood gases and mechanical function (FEV ₁ > 70% of predicted)	Irreversible CO ₂ retention (PaCO ₂ > 45 mmHg); poor mechanical function (FEV ₁ < 35% of predicted); pulmonary hypertension	Hypoxia with normal PaCO ₂ ; reduced mechanical function (FEV ₁ 35% to 70% of predicted)

* (From Ali & Ewer: Preoperative cardiopulmonary evaluation of patients undergoing surgery for lung cancer. Cancer Bull. 32:100-104, 1980).

그림 4. 폐암의 진단과 수술적응결정의 단계.

필요한데 여기에는 Carlens관을 이용하여 좌우폐의 환기 기능 및 산소소모량 등을 구하여 건강한 폐의 기능을 알아보고 또한 절제할 폐동맥을 풍선으로 일시적으로 폐쇄를 시킨후에 반대측 폐동맥에서의 압과 산소포화도 등을 구하여 추정하기도 하지만 관혈적인 방법이기 때문에 임상에서 흔히 쓰기에는 문제점이 있다⁵¹⁾. 그래서 비관혈적인 방법으로 수술후의 예측노력성폐활량의 1초치 (FEV₁)가 가장 많이 쓰인다^{52~54)}. 환기 및 관류폐주사를 하여 절제폐야의 면적을 계산하므로써 술후 FEV₁을 계산할 수 있으며 그 공식으로는 수술후 예측 FEV₁=수술전 FEV₁×침범되지 아니한 폐조직의 관류폐주사의 백분율로 계산이 가능하다(Predicted post op FEV₁=preop FEV₁×%Tc^{99m} perfusion in noninvolved lung)^{55~56)}. 이렇게 하여 구한 것과 측와위환기검사(lateral position test)와 좋은 상관관계가 있고⁵⁶⁾ 일반

폐기능검사실에서 쉽게 시행할 수 있으나⁵⁷⁾ 검사자체의 변이성이 높은 것이 문제이다. 최근에는 폐의 전체 세분절(subsegment)을 42개로 보고 절제할 세분절 가운데 폐쇄된 세분절의 수를 알고(n), 절제할 세분절의 전체의 수(b)를 알 때에 predicted post op FEV₁={(1-(b-n)/(42-n))×(preop FEV₁)}라는 식에서 구하는 방법을 제안하였다⁵⁸⁾. 그러나 위와 같은 검사의 결과는 수술의 위험정도를 예측할 수 있는 계측치에 불과하고 수술적응여부를 결정하는 절대적인 지표가 아니라는 것을 알아둘 필요가 있다. 폐암의 확정진단과 수술적응결정단계를 도식화하면 Fig. 4와 같다.

결 론

폐암의 고위험군에서 주로 시행하는 선별검사의 의

의, 암의 발견을 위한 각종 관혈적 및 비관혈적검사, 그리고 해부학적 및 생리학적 병기 결정에 이용되는 각종 검사의 유용성과 문제점에 대하여 언급하였다. 폐암은 증세나 증후가 다양하고 폐실질의 특성과 호흡기의 큰 예비력으로 다른 장기의 종양에 비하여 비교적 증세의 발현이 지연되는 경향이 있다. 또한 근래에 의료제도의 개선으로 환자들이 쉽게 병원에서 진료를 받을 수 있음에도 진행된 환자들이 대부분이며 그리고 향후 여러가지 공해에 의해 폐암의 발생은 계속 증가될 전망이다. 폐암이 의심되는 예에서 적극적으로 진단을 함과 동시에 병기판정의 단계를 거쳐서 적절한 치료를 받도록 하여 나아가서 위험군에서는 조기발견을 위한 노력을 병행해야 할 것이다.

REFERENCES

- 1) 池田茂人: 早期肺癌. 癌の臨床 21:1073, 1975
- 2) Fontana RS, Sanderson DR, Woolner LB, Taylor WF, Miller WE, Muhm JR. Lung cancer screening: The Mayo program. J Occup Med 28:746, 1986
- 3) Melamed MR, Flehinger BJ, Zaman MB, Heelan RT, Perchick WA, Martini N. Screening for early lung cancer. Results of the Memorial Sloan-Kettering study in New York. Chest 86:44, 1984
- 4) Tockman MS: Survival and mortality from lung cancer in a screened population. The Johns Hopkins study. Chest 89:324S, 1986
- 5) Kubik A, Polak J: Lung cancer detection. Results of a randomized prospective study in Czechoslovakia. Cancer 57:2427, 1986
- 6) Eddy DM: Screening for lung cancer. Ann Int Med 111:232, 1989
- 7) Tockman MS, Mulshine JL, Smart CR: Screening for lung cancer. Ann Int Med 111:764, 1989
- 8) Merlamed MR, Flehinger BJ: Screening for lung cancer. Ann Int Med 111:764, 1989
- 9) Tockman MS, Levin ML, Frost JK, Ball WC Jr, Stitik FP, Marsh BR: Screening and detection of lung cancer, In Aisner (Ed.) lung cancer p 25, New York, Churchill Livingstone 1985
- 10) Petty TL: Screening for lung cancer. Ann Int Med 111:620, 1989
- 11) Hayata Y, Kato H, Konaka C, Ono J, Takizawa N: Hematoporphyrin derivative and laser photoradiation in the treatment of lung cancer. Chest 81:269, 1982
- 12) Dumon JF, Reboud E, Garbe L, Aucomte F, Meric B: Treatment of tracheobronchial lesions by laser photoresection. Chest 81:278, 1982
- 13) Taylor AB, Waterhouse JAH: Prognosis for bronchial carcinoma. Thorax 5:257, 1950
- 14) 김정석, 김성호, 서경필, 이영균: 폐암의 임상적 고찰. 대한외과학회지 12:27, 1970
- 15) 김능수, 김현철, 이성우, 박의현, 문종웅, 박희명: 원발성폐암의 임상적 관찰. 대한내과학회잡지 9:324, 1976
- 16) 成毛韶夫: 第2章 臨床症勢. 新内科学大系, p 98 東京, 中山書店 1977
- 17) 이육룡, 김준명, 장상호, 김경래, 손희영, 김성규, 이원영, 김기호: 원발성폐암의 임상적 고찰. 결핵 및 호흡기질환 30:79, 1983
- 18) Ingolf Vogt-Moykopf and Peter Drings: Pre-operative assessment of patients undergoing surgery for bronchial carcinoma. In Bates M (Ed): Bronchial carcinoma, p 115 Berlin, Springer-Verlag 1987
- 19) Amemiya R, Oho K: Chapter 2, X-ray diagnosis of lung cancer, In Hayata Y (Ed) Lung cancer diagnosis, p 7, Tokyo, Igaku-shoin 1982
- 20) 유남수, 김성진, 김성광, 이경덕, 김준호, 조동일, 김재원: 폐결핵을 동반한 폐암환자의 대한 임상적 고찰. 결핵 및 호흡기질환 33:35, 1986
- 21) 池田茂人: 肺門部早期癌圖譜, p 21 東京, 醫學書院, 1976
- 22) Dekker A, Bupp PA: Cytology of serous effusions. An investigation into the usefulness of cell blocks versus smears. Am J Clin Pathol 70:855, 1978
- 23) Solomon DA, Solliday NH, Gracey DR: Cytology in fiberoptic bronchoscopy. Comparison of bronchial brushing, washing and post-bronchoscopy sputum. Chest 65:616, 1974
- 24) Tsuboi E, Ikeda S, Tajima M, Shimosato Y, Ishikawa S: Transbronchial biopsy smear for diagnosis of peripheral pulmonary carcinomas. Cancer 20:687, 1967
- 25) 이국희, 김교선, 손명원, 유덕중, 이원식, 정태훈: 경기관지폐생검의 진단적 가치. 대한내과학회잡지 30: 154, 1986
- 26) 최광진, 김태형, 이경수, 박재기, 이병기, 이증기: 전산화단층촬영 유도하 경피폐생검의 유용성. 결핵 및 호흡기질환 36:328, 1989
- 27) 유관희, 송석현, 조광호, 안증기, 김원호, 이양근: 14 Gauge 절단침과 22 Gauge 흡인침을 사용한 경피적 폐침생검술의 비교. 대한내과학회지 32:355, 1987

- 28) Hayata Y, Oho K, Ichiba M, Goya Y, Hayashi T: Percutaneous pulmonary puncture for cytologic diagnosis-its diagnostic value for small peripheral pulmonary carcinoma. *Acta Cytologica* 17:469, 1973
- 29) Prakash UBS, Reiman HM: Comparison of needle biopsy with cytologic analysis for the evaluation of pleural effusion: analysis of 414 cases. *Mayo Clin Proc* 60:158, 1985
- 30) Salyer WR, Eggelston JC, Erozan YS: Efficacy of pleural needle biopsy and pleural fluid cytopathology in the diagnosis of malignant neoplasm involving the pleura. *Chest* 67:536, 1975
- 31) Winkelmann M, Pfitzer P: Blind pleural biopsy in combination with cytology of pleural effusions. *Acta Cytol* 25:373, 1981
- 32) Palumo LT, Sharpe WS: Scalene node biopsy: correlation with other diagnostic procedures in 550 cases. *Arch Surg* 98:90, 1969
- 33) 안원전, 손경선, 김선영: 폐암환자에서 경부림프절 생검의 임상적 의의. *결핵 및 호흡기질환* 33:51, 1986
- 34) 廣田正毅 原 耕平: 肺癌における 腫瘍マ-カ-. 呼吸 8: 846, 1989
- 35) 정영락, 기춘석, 이정희: 원발성 폐암환자에서 치료 전후의 혈청 carcinoembryonic antigen (CEA) 농도에 관한 관찰. *결핵 및 호흡기질환* 29:139, 1982
- 36) 김영환, 김준우, 공현호, 심영수, 김진열, 한용철: 미분화 소세포 폐암에서의 Serum Neuron Specific Enolase (NSE)의 변동에 관한 연구. *결핵 및 호흡기질환* 33:166, 1986
- 37) 이병수, 이원식, 정태훈, 이현우: 미분화 소세포폐암에서의 혈청 Neuron Specific Enolase의 임상적 이용 가치. *결핵 및 호흡기질환* 34:302, 1987
- 38) Mountain CF: A new international staging system for lung cancer. *Chest* 89:225S, 1985
- 39) Comis RL: The role of surgery in small cell cancer: a reappraisal. *Clin Oncol* 4:141, 1985
- 40) Graham BL, Balducci L, Khansur T, Dalton ML, Lambuth B: Surgery in small cell cancer. *Ann Thorac Surg* 45:687, 1988
- 41) Khan A, Khan FA, Gravey J, Steinberg H, Ross P, Baron MG: Oblique hilar tomography and mediastinoscopy, a correlative prospective study in 100 patients with bronchogenic carcinoma. *Chest* 86:424, 1984
- 42) Sandler MA, Pearlberg JP, Madrazo BL, Gitschlag KF, Gross SC: Computed tomographic evaluation of the adrenal gland in the preoperative assessment of bronchogenic carcinoma. *Radiology* 145:733, 1982
- 43) 정연태, 이명철, 한용철: 원발성 폐암의 Intrathoracic Staging에서 Ga⁶⁷-Scan의 의의. *결핵 및 호흡기질환* 32:191, 1985
- 44) Hooper RG, Beechler CR, Johnson MC: Radioisotope scanning in the initial staging of bronchogenic carcinoma. *Am Rev Resp Dis* 118:279, 1978
- 45) Wittes RE, Yel Samuel DJ: Indications for liver and brain scans. *JAMA* 238:506, 1977
- 46) Shure D, Fedullo PF: The role of transcarinal needle aspiration in the staging of bronchogenic carcinoma. *Chest* 86:693, 1984
- 47) Alazraki NP, Ramsdell JW, Taylor A, Friedman PJ, Peters RM, Tisi GM: Reliability of gallium scan chest radiography compared to mediastinoscopy for evaluating mediastinal spread in lung cancer. *Am Rev Resp Dis* 117:415, 1978
- 48) Fraiser RG, Peter Pare JA, Pare PD, Fraiser RS, Genereu GP: Diagnosis of disease of the chest. 3rd ed, p 1464, Philadelphia, WB Saunders Co, 1989
- 49) Feinstein AR: A new staging system for cancer and reappraisal of "early" treatment and "cure" by radical surgery. *N Engl J Med* 279:747, 1968
- 50) Tarhan S, Moffitt EA, Taylor WF, Giuliani ER: Myocardial infarction after general anesthesia. *JAMA* 220:1451, 1972
- 51) Gass GD and Olsen GN: Preoperative pulmonary function testing to predict postoperative morbidity and mortality. *Chest* 89:127, 1986
- 52) Boushy SF, Billig DM, North LB, Helgason AH: Clinical course related to preoperative and postoperative pulmonary function in patients with bronchogenic carcinoma. *Chest* 59:383, 1971
- 53) 이종태, 이성행, 송원영: 폐기능과 폐절제후 폐합병증과의 상관성. *경북의대잡지* 24:434, 1983
- 54) Olsen GN, Block AJ, Tobias JA: Prediction of postpneumonectomy pulmonary function using quantitative macroaggregate lung scanning. *Chest* 66:13, 1974
- 55) Wernly JA, DeMeester TR, Kirchner PT, Myerowitz PD, Oxford DE, Golomb HM: Clinical value of quantitative ventilation-perfusion lung scans in the surgical management of bronchogenic carcinoma. *J Thorac Cardiovas Surg* 80:535, 1980
- 56) Marion JM, Alderson PO, Lefrak SS, Senior RM, Jacobs MH: Unilateral lung function: comparison of the lateral position test with radionuclide ventilation-perfusion studies. *Chest* 69:5, 1976
- 57) Jay SJ, Stonehill RB, Kiblan SO, Norton J: Var-

iability of the lateral position test in normal subjects. *Am Rev Resp Dis* **121**:165, 1980

58) Nakahara K, Monden Y, Ohno K, Miyoshi S, Maeda H, Kawashima: A method for predicting postoper-

ative lung function and its relation to postoperative complications in patients with lung cancer. *Ann Thorac Surg* **39**:260, 1985