큰 공동을 동반한 미만성 폐 결절

고려대학교 의과대학 내과학교실

유 세 화

증 례

69세의 여자 환자가 7일전부터 발생한 기침과 호흡곤란을 주소로 입원하였다. 환자는 5년전부터 당뇨병으로 경구용 혈당강하제를 복용중 이었다. 최근 1개월동안 6 kg의 체중감소가 있었던것 외에는 비교적 건강하게 지냈으나 약 1주전부터 가슴이 답답하고 자극적인 마른 기침으로 잠을 이루기 어려워 입원하였다. 열은 없었고 혈담도 없었다고 한다. 지난 30년간 1일 1갑정도의 담배를 피워 온 흡연자였다.

입원당시 이학적 소견은 급성 병색을 보였고 의식은 명료하였고 체온 36.2°C, 맥박 80회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 130/70 mmHg였고 흉부진찰에서 폐하부에서

광범위한 수포음이 들렸고 특히 좌측에서 심하였다. 간장 및 비장은 촉진되지 않았고 곤봉상 수지나 사지부종은 없었다.

단순 흉부X선 검사에서 미만성 폐결절이 전폐에 비교적 균일하게 보였고, 좌폐하엽에 커다란 공동이 발견되었다(Fig. 1, 2). EKG는 저전위 및 제1도 방실블록 소견이 있었다.

혈액검사는 Hb 12.6 g/dl, Hct 38%, WBC 7200/mm³ 공복시 혈당 244 mg/dl, 전해질, 간, 신기능 검사는 정상 범위였다.

객담항산균 도말검사에서 3+여서 항결핵치료를 시작하고 당뇨병은 insulin으로 치료하였다. 약 2주후부터 위장증상 및 구역이 생기고, 간종대, 간기능이상, 황달이 발생하여 RFP, INH, PZA를 중지하고 SM, EMB

Fig. 1, 2. Chest PA and Lateral views. There are diffuse nodular shadows and a large cavitary lesion in the left lower lobe.

로 치료를 계속하였다. 이때에 객담세포진 검사에서 편평세포암 세포가 발견되었다(Fig. 4). 호흡기증세는 현저하게 호전되고, 치료 1개월째 균음전화가 이루어졌다. 흉부 X선 검사에서도 속립성 음영은 그 크기와 범위가 뚜렷이 감소되었으나 공동은 다소 증가되었다.

토 론

폐전체에 걸쳐 광범위하게 분포하는 바늘끝 크기부터 5 mm내외의 작고 동그란 음영은 다양한 폐질환에서 관찰할 수 있다. 매년 그 원인 목록은 점차증가하여 100개 훨씬 넘어서고 있다. 이러한 수많은 가능성에도 불구하고

Fig. 3. Chest CT. A cavity with thick wall and irregular inner surfaces are seen in the posterobasal segment

고, 방사선학적 특성이나 임상적 소견에 따라 그 감별의 가능성은 매우 축소시킬 수 있다. 특히 2~5 mm크기로 폐침을 비롯하여 전체 폐에 비교적 균등하게 분포할 때 속립성 음영이라 한다. 특징적으로 속립성 폐결핵, 히스토피라스마증 진폐증등에서 볼 수 있다(Table 1).

비교적 커다란 고리모양의 음영(ring shadow) 혹은 공동을 보이는 폐질환에서는 공동의 크기, 수효, 공동벽의 두께, 공동주변 음영의 크기등이 감별진단에 도움을 줄 수 있다. 머리카락 정도의 벽을 가진 고리모양의 음영은 결핵보다는 기포(fulla)일 가능성이 높고, 두꺼운 벽을 갖고 그 내부의 음영이 불규칙하면 종양일 가능성이 높다. 2-3 mm정도의 벽과 주변폐에 작은 원형과 짧은 선상음영이 섞여있으면 폐결핵의 가능성이 높다. 이러한 일반적인 규칙은 절대적인 것이 아니어서 두꺼운 벽의 공동도 결핵성인 경우도 있고 얇은 벽을 가진 종양성 공동도 있다. 그러므로 일반적으로 공동의 원인진단은 방사선학적 소견보다는 임상적, 미생물학적, 세포학적 소견이 더 확실하다.

본 증례에서는 양폐 전부에 비교적 균일한 2-3 mm크기의 속립성 음영과 두꺼운 벽을 가진 공동이 있었고, 객담도 말검사에서 항산균이 많이 발견되어 두병변이 모두 결핵에 의한 것으로 생각할 수 있었다.

속립성 폐결핵과 만성 폐결핵이 동시에 발생할 수 있는가에 대해서는 오래동안 논란이 있었다. 특히 19세기 말의 독일 학자들은 그 면역학적 특성으로 미루어 만성 폐결핵의 존재는 급성 속립성 폐결핵의 발병을 배제한다

Fig. 4. Sputum Cytology ($\times 400$) squamous cell carcinoma.

Table 1. Guide to Interpretation of Widely Disseminated Small Shadows

1. Widely disseminated 2–4 mm nodular shadows (like miliary tuberculosis)				
Miliary tuberculosis	—	—	—	Perhaps sputum T.B. + ve. Fever
Acute histoplasmosis	—	—	—	Histoplasmin test + ve. Lives in area
Acute viral pneumonia	—	—	—	Fever, prostration ; later viral studies + ve
Gaucher's disease in children	—	—	—	Splenomegaly. Bone lesions
Xanthomatosis (histiocytosis X)	—	—	—	Diabetes insipidus. Bone lesions
Some pneumoconioses	—	—	—	Industrial history (coal, beryllium)
Idiopathic haemosiderosis	—	—	—	Haemoptyses. Often young adult
Haemosiderosis in mitral stenosis	—	—	—	Heart lesion obvious
Periarthritis	—	—	—	Rare, perhaps eosinophilia
Tropical eosinophilia	—	—	—	High eosinophilia in white blood count
Some pituitary disorders	—	—	—	Endocrine lesion obvious
Some inhaled antigens	—	—	—	Immunological tests + ve. Bird contact, mouldy hay
2. Discrete 5–8 mm well-defined shadows				
Secondary deposits	—	—	—	Perhaps known primary neoplasm
3. Discrete 5–8 mm poorly defined shadows				
Sarcoidosis	—	—	—	Often not ill. Iridocyclitis. Perhaps skin nodule
Acino-nodular tuberculosis	—	—	—	Sputum T.B. + ve
Pulmonary oedema	—	—	—	Cardiac or renal lesion. Water overload
Aspiration	—	—	—	Drowning, blood (haemoptysis)
Fungi	—	—	—	Perhaps sputum + ve
Viral	—	—	—	Obvious chicken pox. Fever
4. Pin-point shadows				
Idiopathic haemosiderosis	—	—	—	Haemoptyses, often young adult
Microlithiasis alveolaris	—	—	—	Very radio-opaque
Respiratory distress of newborn	—	—	—	First few days of infancy
5. Ground-glass haze and pin-point shadows				
Respiratory distress of newborn	—	—	—	First few days of infancy
Fibrosing alveolitis	—	—	—	Dyspnoea and clubbing. Low DLco
6. Shadows of high radio-opacity (nodular 1–5 mm)				
Calcifications in healing lesions	—	—	—	Tuberculous, histoplasmosis. Chicken pox
Endogenous calcification	—	—	—	Microlithiasis alveolaris
Ectopic bone	—	—	—	Rheumatic fever and mitral stenosis
Inhaled material of high atomic weight	—	—	—	Iron, barium, tin and so on. Iodized oil
Nodular shadows associated with other shadows (like fibrosing alveolitis)				
7. Associated with short line shadows				
Fibrosing alveolitis	—	—	—	Dyspnoea and clubbing. Low DLco
Some pneumoconioses	—	—	—	Industrial history
8. Associated with long line and short line shadows				
Lymphangitis carcinomatosa	—	—	—	Perhaps known primary neoplasm
9. Associated with small ring (honeycomb) shadows				
Fibrosing alveolitis	—	—	—	Dyspnoea and clubbing. Evidence of xanthomatosis, bird contact
10. Associated with shrunken upper lobes				
Tuberculosis	—	—	—	Sputum T.B. + ve
Sarcoidosis	—	—	—	Clinical course
Bird fanciers' lung	—	—	—	Immunological tests + ve
Farmers' lung	—	—	—	Contact with mouldy hay
Fibrosing alveolitis	—	—	—	Cryptogenic. Dyspnoea and clubbing

고 믿어왔다. 그러나 1940년대 이후에 계속되는 보고에 따르면 두가지 병변이 동시에 발견되는예가 적지 않다고 알려져 왔다. 이런 공존에는 효과적인 화학치료제의 보편화로 크게 줄긴 하였지만 1980년대에도 20% 내외에서 보고되어 있다.

본 증례는 처음에는 결핵균에 의한 폐결핵, 속립성 폐결핵으로 생각하였으나, 공동이 폐하부 위치한 점, 흡연력 등으로 기관지 폐염 혹은 다른 장기의 종양전이를 완전히 배제할 수 없었다.

이어서 시행한 객담 세포진 검사에서 악성세포가 여러 차례 발견되고 결핵치료후 속립성 음영은 호전되고, 객담균은 음전화되었고, 공동병변은 악화되어 두가지 병이 공존하였음을 확인하였다.

방사선학적 검사가 폐질환의 진단에는 많은 도움을 주지만, 임상적, 미생물학적 세포학적 검사로 확진해야 한다는 것을 극명하게 보여준 증례였다

REFERENCES

- 1) Chapman DB: Acute generalized miliary tuberculosis in adults. N Engl J Med 235:239, 1946
- 2) Grieco MH: Acute disseminated tuberculosis as a diagnostic problem a clinical study based on 28 cases. Am Rev Respir Dis 109:554, 1974
- 3) Munt PW: Miliary tuberculosis in the chemotherapy era with a clinical review in 69 American adults. Medicine 51:139, 1972
- 4) Proudfoot AT: Miliary tuberculosis in adults. Br Med J 2:273, 1969
- 5) Simon G: Principles of chest X-ray Diagnosis. 3rd ed, London, Butterworths, 1971
- 6) Slavin RE: Late generalized tuberculosis. Medicine 59:352, 1980

— Abstract —

A Large Cavity Associated with Diffuse Nodular Shadows

Se Hwa Yoo, M.D.

Department of Internal Medicine, College of Medicine, Korea University, Seoul, Korea

Diffuse nodular shadows may be found in a great variety of conditions. But diagnostic possibilities may be much reduced partly by clinical findings and partly by radiological appearances.

A moderately large ring shadow or cavity may also develop in a variety of conditions.

Association of both conspicuous pulmonary abnormalities may coexist in certain conditions with much reduced diagnostic possibilities.

A 69-year-old woman who developed these abnormalities was presented and differential diagnosis was discussed.